

Grond Heat, Halbeld and

GOOS & KOENEMANN NIEDERWALLUF

HERBST 1911

FROHJAHR 1912

DAS BUCH :
STRUDEN
OBSTBRUME
ZIERSTRRUCHER
KOMFEREN

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

DAS BUCH

ÜBER

STAUDEN UND FELSPFLANZEN - ZIERGRÄSER ERICA - FARNE - WASSERPFLANZEN - CLEMATIS AMPELOPSIS UND GLYCINEN

OBSTBÄUME - ZIERBÄUME UND STRÄUCHER KONIFEREN - ROSEN UND SCHLINGROSEN

ÜBERSICHT

I. ABTEILUNG, STAUDEN:

Seite	Seite							
NEUHEITEN	Primeln	50						
Anemonen	Pyrethrum	52						
Aquilegien (Akelei)	Rudbeckien							
Astern (Frühjahr- und Herbst-) 16—18	Saxifraga (Steinbrech)							
Astilben	Trollius (Trollblumen)							
Campanula (Glockenblume)	Felspflanzen sind mit einem F bezeichnet.							
Chrysanthemum	$\nabla \nabla \nabla$							
Delphinium (Rittersporn)								
Dianthus (Nelken)	Ziergräser							
Gaillardien (Kokardenblume) 29	Erica							
Helianthus (Sonnenblume)	Farne	61						
Iris (Schwertlilie)	Wasserpflanzen 62	63						
Lilien	Clematis ,	77						
Paeonia (Pfingstrose) 40—44	Ampelopsis							
Papaver (Mohn)								
Phlox (Flammenblume) Frühjahr- und Herbst 46-48	Bignonien und Glycinen 80							
Canna, Dahlien, Gladiolen, Begonien Seite 64-70								
	, 71—75							
	, 11–12							

II. ABTEILUNG, BAUMSCHULE

as sind denn Stauder

Stauden sind krautartige, jahrelang ausdauernde, im Freien ohne, oder - in wenigen Fällen - unter ganz geringer Decke überwinternde Blütenpflanzen, die durch die Schönheit, den Reichtum und die Mannigfaltigkeit ihrer Blüten jedem Garten den schönsten Schmuck geben.

Ueber das Pflanzen der Stauden.

Der Boden sei vorher tief und gut bearbeitet. Man mische den Boden mit Dünger, bringe solchen aber nicht direkt an die Wurzel beim Pflanzen.

Ein Ueberdecken des Bodens nach dem Pflanzen mit verrottetem Dünger ist anzuraten.
Niemals pflanze man eine Staude tiefer in die Erde, als dass der Wurzelhals oder die oberen Augen der Wurzelkrone sich dicht unter der Erdoberfläche befinden.

Im ersten Winter — oder bei empfindlicheren Arten in jedem Winter — schützt man die Stauden durch eine Decke von Tannenreisig, Torf oder Laub, letzteres aber lege man niemals auf das Herz der Pflanze, da dieses dann verfaulen würde.

Der Standort sei tunlichst frei, also bei Gehölzgruppen vor denselben, nicht unter den Sträuchern.

Wir legen durchaus keinen Wert darauf, eine grosse Sammlung perennierender Pflanzen zu führen, sondern nur eine Elite-Auswahl der vollkommensten Züchtungen, die zum Schmuck der Gärten in Gruppen oder einzeln, oder zum Blumenschnitt grossen

Die Wirkung der Stauden besteht in der Landschaft und wird niemals durch eine grosse Anzahl Sorten, sondern durch eine weise beschränkte Farbenwahl, also durch grössere Anzahl ein und derselben Farben-Sorte erreicht.

Wir müssen audrücklich bitten, den Stauden einen guten Standort im Garten zu geben und durch Bodenbearbeitung usw. zu pflegen; der Erfolg wird dann für sich sprechen.

Die Haupt-Versandzeit der Stauden ist im September-November und im Frühjahr, doch bitten wir um frühzeitige Be-

stellung, um allen Bedingungen besser gerecht werden zu können.

Zur Beachtung!

Verkaufs= und Versand=Bedingungen.

Unser Hauptkatalog erscheint alljährlich Ende August, ausserdem kommt noch eine Frühjahrs-Auszugsliste, die Ende Februar erscheint, zum Versand. Für diese und für alle anderen eventl. Nebenlisten ist bezüglich der Versand- und Verkaufsbedingungen immer der letzterschienene Hauptkatalog massgebend.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.

2. Der Zehnerpreis beginnt bei Entnahme von 5 Stück, der Hundertpreis bei Entnahme von 25 Stück und der Tausendpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Art.

Zahlungen erbitten wir auf unser Postscheckkonto Nr. 977 Frankfurt a. Main. Diese Zahlungen sind für den Absender kostenlos.

Portoabzüge sind daher unstatthaft.

4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Niederwalluf.

5. Beträge unter 20 M bitten wir stets nachnehmen zu dürfen, um zeitraubende Buchungen zu vermeiden. Versand an uns unbekannte Besteller nur durch Nachnahme. Ueber nicht bezahlte Beträge verfügen wir 3 Monate nach Ausstellung der Rechnung, nach vorheriger Erinnerung, durch Postauftrag oder Wechsel.

Versand.

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
 Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet.

3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. Packmaterial wird nicht zurückgenommen, da dasselbe durch den erlittenen Schaden auf der Reise untauglich wird.

Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn und zum Schiff trägt der Besteller und wird dasselbe als Barvorschuss nachgenommen.

Bürgschaft.

Bürgschaft für das Anwachsen muss abgelehnt werden.

2. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.

Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen; die Mängel sind genau anzugeben.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ausnahmepreise.

Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren tritt, wo nicht bereits im Katalog angegeben, eine entsprechende Preiserhöhung ein. Ebenso behalten wir uns eine Preiserhöhung bei persönlicher Auswahl in der Gärtnerei vor.

Wir bitten um deutliche Angabe des Namens, des Wohnortes und der nächsten Bahn- oder Poststation. Bankkonto: Vorschussverein, E. G. m. b. H., Wiesbaden. — Telephon: Amt Eltville, No. 23.

Postscheckkonto: No. 977 Frankfurt a. Main.

Neuheiten und seltene Pflanzen

d. h. nur solche, die durch ihre Schönheit einen besonderen Wert haben.

Von der grossen Anzahl jährlich neu aufkommender Neuheiten, die wir zur Bereicherung unserer Auswahlen anschaffen, scheiden wir nach Prüfung alles wieder aus, was minderwertig ist oder doch keinen Vorzug vor schon Bestehendem hat. Wir halten dann nur zur Vermehrung fest und bieten unseren geschätzten Kunden zum Kaufe an, was wir als wirklich schön und gut erkannt haben. Durch solche Prüfungen mag Zeit versloren gehen, aber sie ersparen manche Enttäuschungen und gewinnen Vertrauen.

Aster Amellus "Schöne von Ronsdorf" (G. A.).

Diese edle sommerblühende Aster trägt in 40—50 cm hohen reichverzweigten Sträussen grosse Blüten von etwa 6 cm Durchmesser. Dieselben sind von vollendeter Form und einer wunderbaren lilarosa Färbung, wie sie bis heute in Staudenastern überhaupt noch nicht vorhanden war. Gleich wertvoll

für den Schnittblumenzüchter wie für den Landschaftsgärtner.

1 St. M 2,—, 10 St. M 17,50

Aster Amellus rubellus (G. A.). Auf 40—50 cm hohen Büschen bringen die reichverzweigten Sträusse eine Fülle strahliger Blüten von eigenartig leuchtend lilarosa Färbung.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Amellus "Perle rose". Aehnlich der beliebten Sorte "Perrys Favourite", jedoch viel grossblumiger als diese, reiner in der Farbe und kompakter im Wuchs. Als Gruppensorte ausserordentlich wertvoll. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Neue Astilbe Arendsi-Varietäten.

"Brunhilde", hat prächtige fedrige Rispen von 1 bis 1,20 m Höhe und schöner cremerosa Farbe mit licht-lila Schein.

"Gunther". Langfedrige, schmal pyramidale Rispen von leuchtender heller reinrosa Farbe. Blütezeit Ende Juli bis Anfang August.

"Siegfried". Reichverzweigte geperlte Blütenrispen von leuchtend dunkelkarminrosa Färbung. Blütezeit Ende Juli bis Anfang August.

Obige 3 Sorten kosten 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,-

"Kriemhilde". Von herrlicher lachsrosa Farbe in schönen fedrigen Rispen. Blütezeit Ende Juli bis Anfang August. Wertvoll für alle Zwecke.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Wir machen weiter aufmerksam auf die vorjährigen Neuheiten

"Juno", "Lachskönigin", "Rosa Perle" und "Vesta".

Beschreibung dieser Sorten siehe Seite 19.

Preis obiger 4 Sorten 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-.



Astilbe Arendsi.

Anchusa myosotidiflora. Aus dem Kaukasus stammend, mit herzförmigen Blättern, die einen 25 cm hohen Busch bilden. Aus diesem erheben sich von April bis Mai auf kräftigen Stielen schöne Sträusse vergissmeinnichtartiger Blumen von herrlichster blauer Farbe. Völlig winterhart und wegen ihres Gedeihens in halbschattiger Lage besonders wertvoll.

1 St. M 2,—, 10 St. M 17,50

Adonis amurensis fl. pl. Die gefüllte, sehr empfehlenswerte Abart der bekannten schönen Adonis amurensis, mit farnartig geschlitztem Laube und grossen leuchtend goldgelben Blüten auf starken Stielen. Blütezeit Februar-März.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Anchusa italica "Opal". Von gleicher Haltung und Schönheit der bekannten "Dropmore var." Nur zeigt diese Neuheit eine klare himmelblaue Farbe. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Campanula persicifolia alba coronata (G. A.).

Eine gleich schöne, aber kräftig wachsende und völlig winterfeste Form der altbekannten Sorte dieses Namens. Die Kelchblätter sind blumenblattartig ausgebildet und wie die Korolle von reinweisser Farbe, im Gesamtaussehen an kleine Campanula Medium erinnernd. 1 St. M1,—, 10 St. M9,—

Campanula persicifolia coerulea coronata (G. A.). Ein Gegenstück zur vorigen, unterscheidet sich dieselbe nur durch ihre klarblaue Blütenfarbe. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Campanula glomerata superba (G. A.). Diese Neuzüchtung hat vor der so schönen und beliebten Camp. glom. dahurica die guten Eigenschaften viel festerer Stiele und eines straffen aufrechten Wuchses voraus. Die grossen runden Blütenbälle sind noch schöner in der Form und noch satter in ihrer dunkelvioletten Farbe als bei glomerata dahurica. Die Blütezeit ist um 8—10 Tage später als bei dieser; geeignet zur Bepflanzung ganzer Beete und zur Schnittblumengewinnung . . . 1 St. M. 1,—, 10 St. M. 8,—



Campanula glom. superba.

Dianthus plum. fl. pl. Nobel. Diese prächtige neue, zweimal blühende Federnelke zeichnet sich ganz besonders aus durch ihre starken, bis 30 cm langen, viel verzweigten Stiele, die grossen locker gefüllten, elegant gefransten, reinweissen Blumen in der Grösse von "Her Majesty" und durch ihre besondere Reichblütigkeit. Sie kommt im August bis September nochmals zur Blüte. Sie reiht sich den bekannten Sorten Gloriosa und Delicata in Schönheit und vorzüglicher Form der Blumen würdig an.

1 St. M.—,50, 10 St. M 4.—, 100 St. M 35,—

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Almansor (G. & K.). Neuheit 'eigener Züchtung. Wie die in natürlicher Grösse abgebildete Blüte zeigt, ist die Form eine durchaus vollendete. Die auf festen Stielen getragenen kreisrunden Blüten zeigen voll nach oben. Die Farbe ist ein schönes Cremegelb. Zu unseren bekannten Sorten Titania, Oberon, Rezia bietet diese Neuheit ein vortreffliches Gegenstück. Ganz besonders ist dieselbe durch ihren kräftigen, gesunden Wuchs ausgezeichnet. 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—



Delphinium Belladonna "Nassau".

Delphin. Belladonna "Nassau" (G. & K.).

Die in ununterbrochener Folge erscheinenden reichverzweigten mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Blütenrispen von klar himmelblauer Färbung. Die Einzelblüte ist besonders gross, von $4^{1/2}$ cm Durchmesser. Die Pflanze erreicht, wenn vollständig angewachsen, eine Höhe von 1,30 m . 1 St. \mathcal{M} 1,50, 10 St. \mathcal{M} 14,—



Einzelblüte der Almansornelke in natürlicher Grösse,



Iris "floribunda".

Iris pum. hybr. "floribunda" (G. & K.).

Wie der Name besagt, zeichnet sich diese neue Hybride durch
ungemeine Reichblütigkeit aus. Da ferner jede der grossen Einzelblumen auf 35 cm langen Stielen sich vollkommen ausbildet und eine tadellose Form zeigt, so ist diese Sorte als Gruppensorte für Fernwirkung und ganz besonders auch für den Blumenschnitt sehr geeignet. Die Domblätter sind cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler gefärbt, letztere grünlich geadert.

St. M 1,50, 10 St. M 14.



Iris interregna in Blüte!



Iris "Schneekuppe".

Iris pum. hybr. "Schneekuppe" (G. &K.).

Unter den Pumila-Hybriden fehlte uns noch eine konstant blühende reinweisse Art. Nach mehreren Uebergangsformen bieten wir Iris "Schneekuppe" an, die bis heute dem Eindruck des "reinsten Weiss" am nächsten kommt. Auf 20 cm langen Stielen stehen die in grosser Menge erscheinenden edlen Blüten von echter germanica-Form und -Grösse. Die Domblätter sind reinweiss, die Hängeblätter desgleichen, am Grunde grünlichgelb geadert.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Interregna=Iris "Gerda"

(G. & K. 1910).

In Färbung zwischen Halfdan und Helge stehend, bildet diese neue Interregna-Iris eine wertvolle Ergänzung zu den schon bekannten Sorten. Die Domblätter sind leicht cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler in der Farbe mit goldgelber Aderung; in der Erscheinung Prachtblüten auf 40—45 cm langen Stielen; Petalenbreite 4½ cm . . . 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Wir machen an dieser Stelle auf unsere vorjährigen Neuheiten der Interregna-Iris Halfdan, Helge, Ingeborg, Walhalla besonders aufmerksam. (Beschreibung Seite 33.)

Neue und seltene Pflanzen. Eigene Iris germanica-Neuzüchtungen.

Seit Jahren unermüdlich dafür tätig, den schönsten architektonischen Blütenbau, wie er in der Irisblume verkörpert wird, durch Kreuzbefruchtung zu vervollkommnen und mit den anmutigsten Farbenzusammenstellungen zu verbinden, sind wir so glücklich, in den nachfolgenden 5 neuen Iris germanica-Züchtungen — der jahrelangen Auslese von vielen Hunderten — dem Schönheitsbedürfnisse unserer Blumenfreunde ganz besonders reizvolles zu bieten.



Iris germanica "Rheinnixe" auf unserer Schaurabatte.

,,Rhein=Nixe" (G. & K.). Die schlanken, bis 1 m hohen Stiele tragen reich verzweigt in lockerer Anordnung die prachtvollen Blumen, deren Domblätter reinweiss über den tiefveilchenblauen, weiss umränderten unteren Blumenblättern stehen. Ein einziger Stiel, reich mit Blüten besetzt, genügt zum Vasenschmuck, der noch den unschätzbaren Vorteil besitzt, in abgeschnittenem Zustande über eine Woche seine Schönheit zu halten.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

"Fro" (G. & K.). Der obere Dom ist rein tief goldgelb, die unteren Blumenblätter kastanienbraun mit weiss leicht gerandet. Wir haben den grossen Wert dieser Sorte für weithin leuchtende grössere Gruppen erst später erkannt und bieten sie unserer verehrten Kundschaft als etwas in dieser Richtung vorzügliches an.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

"Lohengrin" (G. & K.). Von gigantischem Wuchs mit riesigem Blattwerk und auffallend grossen Blüten, die cattleyarosa gefärbt sind und an mächtigem Blütenstiel verteilt, oft zu vielen gleichzeitig geöffnet, einen prachtvollen Strauss bilden. Höhe der Blüten 12—13 cm, Petalenbreite 5—5½ cm 1 St. M 2,50, 10 St. M 20,—

"Mithras" (G. & K.).

Mithras ist in seiner ganzen Erscheinung ähnlich den Sorten Gajus und Lord Beaconsfield; doch ist die Farbe so bedeutend viel intensiver und reiner und die Einzelblüte so viel edler, dass wir sie zu den besten der heutigen Iris germanica zählen dürfen. Die Domblätter sind lichtgelb; Hängeblätter: tief und klar weinrotviolett mit sehr scharf abgegrenztem gelben Saum; sehr reichblühend.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

"Prinzess Victoria Luise"

(G. & K.).

(Mit Allerhöchster Genehmigung Ihrer Majestät der Kaiserin benannt.) Die Domblätter sind klar lichtschwefelgelb, gestützt auf die tief pflaumfarbenen unteren Blumenblätter, die rahmgelb umrandet sind. In wunderbar klarer Farbenwirkung überraschend schön. Blütenhöhe 9 bis 10 cm, Petalenbreite 4½ cm.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-



Prinzess Victoria Luise.

Einfachblühende Neuheiten von Paeonia sinensis.

Die edle Schönheit dieser herrlichen neuen Paeonien kommt nicht nur in der Fülle der Blüten an der Pflanze zur Geltung, sondern noch viel mehr an den abgeschnittenen Blumen im Zimmer, die in uns geradezu die Vorstellung erwecken, als würde uns das reine Gold der Staubfäden in kostbaren Farbenschalen dargeboten. Die Blüten halten sich an der Pflanze, wie abgeschnitten im Zimmer länger als die gefüllte Paeonia sinensis.



Seit einigen Jahren hat sich die Abteilung "Horticultur" der Cornell University in Ithaca, New York in Amerika, in ausserordentlich dankenswerter Weise in Führung der neu gegründeten Paeonien-Gesellschaft, der äusserst schwierigen Aufgabe unterzogen, die sämtlichen im Handel befindlichen Sorten von Paeonia sinensis einheitlich richtig zu benennen und zu beschreiben.

Mit einigen anderen Firmen zusammen, sind auch wir aufgefordert worden, unser ganzes Sortiment zu obigem Zwecke der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, ebenso auch unsere eigenen Neuzüchtungen, die wir im nächsten und in den folgenden Jahren dem Handel zu übergeben gedenken.

Nachdem die Sortimentspflanzen dort vollkommen angewachsen sind und sich zur Vollkommenheit entwickelt haben, hörten wir zu unserer Freude, dass unsere eigenen Neuzüchtungen, und speziell die einfachblühenden Varietäten die allergrösste Anerkennung und Bewunderung gefunden haben.


Zu diesen gehören die nachstehend angebotenen Sorten.

,, Watteau" (G. & K.). Neuheit für 1911. Wie die Sorte Dürer sind die Blüten blendend die Knospen sind die regelmässigen Schalen weit grösser; teerosenartig lichtfleischfarben gefärbt. Der Farbenkontrast zu dem leuchtenden Gold der Staubfäden ist einzig 1 St. M 4,—, 10 St. M 35,—

"Holbein" (G. & K.). Die flache Schalenform ist hellseidenrosa, die die goldenen Staubfäden "Schwindt" (G. & K.). Sehr reichblühend, seidenrosa mit Silberrand in flacher Schalen-

"Dürer" (G. & K.). Einfache Kugelform, reinweiss, die goldenen Staubfäden umschliessend. In Büscheln sehr reichblühend.

"Murillo" (G. & K.). Die Knospe ist rosenartig, die Blume fleischfarben rosa mit goldenen Staubfäden.



Paeonia sinensis fl. pl. "Gretchen".

Paeonia sinensis fl. pl. "Gretchen" (G. & K.).

In dieser Sorte verkörpert sich die vollendete Schönheit einer edelsten Paeonie, und wir sind überzeugt, dass dieselbe überall ungeteilte Anerkennung finden wird. Die Pflanze selbst wächst niedrig und gedrungen und bedarf keiner Stütze. Die Blüten auf straffen, festen Stielen sind elfenbeinweiss, die Knospen zeigen lichtfleischfarbenen Hauch. Für Anpflanzung in Gruppen an landschaftlich bevorzugtem Platz eignet sich diese Sorte ihrer Reichblütigkeit und ihres vorzüglichen Wuchses wegen ganz besonders.

1 St. M 5,-, 10 St. M 45,-

Paeonia sinensis fl.pl.,,Strassburg"(G.&K.)

Die mächtigen, ca. 22 cm Durchmesser haltenden Blüten in lockerer Phantasieform sind von gleichmässig leuchtend silbrig lilarosa Farbe, stofflich fest und tadellos gebaut. In unserem grossen, ca. 300 Nummern fassenden Sortiment bringt "Strassburg" stets die grössten Blüten.

1 St. M 4,-, 10 St. M 35,-

Paeonia sinensis fl.pl.,,Wiesbaden"(G.&K.).

Durch wunderbar abwechselnde Farbenwirkung von weiss, fleischfarben und hellrosa, gehoben durch die durchschimmernden, goldnen Staubfäden, leuchtet diese Sorte weithin; dabei ist sie wunderbar reichblühend und für grössere Gruppen in grossen Anlagen wie geschaffen.

1 St. M 4,-, 10 St. M 35,-

Heuchera sanguinea "Morgenröte" (N. & H.).

Dieselbe zeichnet sich durch lang andauernden Flor der zahlreichen bis zu 50 cm langen festen Blütenrispen aus. Diese sind reichverzweigt und mit lieblichen, weisslichrosa Blütenglöcken voll besetzt. 1 St. 1,25, 10 St. 11,0—

Primula Bulleyana. Aus China eingeführt, mit orangegelben Blüten in dem gleichen etagenförmigen Aufbau der Primula japonica.

1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Primula Littoniana. Diese schöne Neueinführung aus China weicht in ihrer ganzen Erscheinung von den übrigen Primeln ab. Dieselbe hat spitze kegelförmige violette Aehren. Die Blütezeit fällt in den Juni.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

Saxifraga hybrida "Blütenteppich" (G. A.). Wie der Name schon sagt, bildet diese Neuheit dichte Polster, die im April und Mai, zur Blütezeit, einen Blumenteppich darstellen. Die Blütchen erscheinen auf niedrigen, verzweigten Stielen in ganz ausserordentlicher Fülle, sind im Aufblühen leuchtend rosa und werden später etwas heller. In Felspartien, zu Einfassungen oder auch zu ganzen Gruppen sind sie von hervorragender Wirkung.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Saxifraga hybrida "Purpurmantel" (G. A.).

Etwas kräftiger wachsend und höher werdend wie die vorhergehende, sind die mittelgrossen Blumen von einer ganz eigenartig schönen karminrosa Färbung mit purpurnem Schein. Gleich gut für alle Zwecke.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7.—

Thalictrum dipterocarpum. Eine reizende Pflanze, welche eine Höhe von 120—150 cm erreicht. Die zierlichen Einzelblütchen sind von einer schönen rosa-purpurnen Farbe, die durch das Citronengelb der zahlreichen Staubfäden noch gehoben wird. Für Schnittblumengewinnung besonders wertvoll. Die Pflanze liebt einen sonnigen Standort.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

Trollius pumilus yunnanensis. Eine neue Trolliusart, wie noch keine dieser Art im Handel. Die wachsartigen, goldgelben, becherförmigen Blumen heben sich von der dunkelgrünen Belaubung prächtig ab. Eine neue vorzügliche, winterharte Staude. Blütezeit im Juni.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-



Grossblumige Phlox decussata.

Eigene Phlox-Neuheiten für 1911-12.

Phlox decussata "Wanadis" (G. & K.) Seit 4 Jahren beobachten wir diesen neuen Phlox, und der

grosse Anklang, den diese Sorte einstimmig gefunden, veranlasst uns zu dessen Herausgabe. — Die Farbe ist am besten zu vergleichen mit dem weichen Blau des bekannten Phlox divaricata canadensis mit karmin violettrotem Auge. Die Sorte ist hochwachsend und bringt prachtvolle Dolden, ist vorzüglich geeignet für grosse Gruppen in Fernwirkung. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Phlox decussata "Gefion" (G. & K.)

Der nur mittelhohe Wuchs und die grossen Blütendolden machen diese Sorte für Gruppenpflanzung besonders geeignet. Die ganz besonders zarte, weich lachsrosa Färbung macht diesen Phlox zu einer auffallend anmutigen Erscheinung.

1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-

Phlox-Neuheiten von 1910.

Phlox decussata "Astrild" (G. & K.) Die stark verzweigten hochgebauten Blütendolden haben

eine weithin leuchtende karminrosa mit zinnoberrot untermischte Farbe. — Der Hauptwert dieser Neuheit aber besteht darin, dass sie in der Sonne die Farbe nicht verliert, ebenso bei andauernder Nässe nicht abblasst. Für grosse Gruppen daher besonders geeignet.

decussata "Braga" (G. & K.)
Die kräftig lilarosa Färbung der grossen Blütendolde, gehoben durch den weichen Mittelspiegel der Einzelblüte, ist von ausserordentlicher Klarheit und Reinheit, wie man sie an den Phlox so sehr schätzt.

Phlox decussata "Hervor" (G. & K.)

Karminrosa mit lachsfarbenem Anflug und klarer weisser Mitte, hochgebaute stattliche Dolden bildend bei mittelhohem Wuchs.

" decussata "Widar" (G. & K.)

Violettblau mit reinweisser Mitte, in tadellosen grossen Dolden, frei über den mit Blättern bis zum Grunde dichtbesetzten Stielen blühend, mittelhoch werdend. Eine vorzügliche Gruppensorte mit denselben guten Eigenschaften der schönen Antonie Mercié, von der sie entsprungen.

Obige 4 Sorten kosten 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,- 100 St. M 50,-.

Eigene Pyrethrum-Neuheiten von 1910-11.

Pyrethrum hybridum "Corona" (G. & K.)
Eine der schönsten einfachblühenden dunkelroten Pyrethrum.
Die mittelgrossen Blumen von leuchtend samtig karmoisinroter Farbe, in der Knospe fast schwarz erscheinend, stehen auf Jangen feeten Stielen, deber und auch wegen ihrer Beich roter Farbe, in der Knospe fast schwarz erscheinend, stehen auf langen festen Stielen, daher und auch wegen ihrer Reichblütigkeit für den Schnitt besonders geeignet.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Füllung. Wegen der sehr zarten Färbung ist diese Neuheit namentlich zur Binderei sehr geeignet und bestens zu empfehlen.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Canna indica "Rheinstein" (G. & K.) | Clematis viticella "Abendstern".

Neuheit für 1911.

Das die Anzucht und Kultur des edlen Canna-Geschlechts so ausserordentlich begünstigende Klima unseres sonnigen Rheingaus hat uns auch schöne Erfolge in der Zucht neuer Sorten gebracht. als deren beste wir Canna "Rheinstein" in den deutschen Garten einführen möchten.

"Rheinstein"

ist eine nach jeder Richtung vervollkommnete "Professor Hugo de Vries*, diejenige Sorte, die uns von allen in den Handel gebrachten karminfarbenen Sorten stets am besten getiel.

Sie hat ein auffallend breites, saftig frischgrünes Blatt, über welchem sich die rundgebauten festen Blütendolden in reicher Zahl und schneller Aufeinanderfolge frei, weithin leuchtend, erheben.

Die Farbe ist die der "Begonia Bavaria", ein reines, leu htendes Rosakarmin; dab i ist die Sorte frühblühend und putzt

Wir liefern Anfang Mai 1912 in Töpfen, fest durchwurzelt, in starken Pflanzen 1 St. M 4,—, 10 St. M 37,50

(G. & K.)

Das Resultat einer Kreuzung der alten Viticella kermesina mit grossblumigen Patens-Sorten.

Die Neuheit hat die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, das starke Wachstum und die Winterhärte von der Mutterpflanze geerbt, hat dieselbe Reichblutigkeit wie diese, unterscheidet sich aber durch ihre klare, frisch samtig=weinrote Farbe, von welcher sich die zuerst gremeweissen, im Verblühen reinweissen Staubgefässbündel in leuchtendem Kontrast abheben.

1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50

Clematis "Lasurstern" (G. & K.)

Prachtvoll rein tiefblau ist der 6-8blättrige Blütenstern, in dessen Mitte sich ein weisses Strahlenbündel von Staubfäden in leuchtend scharfer Farbenwirkung abhebt. Die zahlreichen Blumen haben selbst an jungen Pflanzen bis 16 cm Durchmesser. Die Neuheit gehört zur Patens-Klasse und eignet sich wegen ihrer frühen und reichen Blüte ganz besonders gut zum Treiben in Töpfen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Herbstanemonen.

Bestärkt durch die gute Aufnahme, die unsere beiden Anemonen-Neuheiten

Anemone jap. "Kriemhilde" (G. & K.) und Anemone jap. "Loreley" (G & K.)

gefunden haben, möchten wir nicht unterlassen, auf diese zwei Neueinführungen hiermit nochmals ganz besonders hinzuweisen.



Anemone japonica "Kriemhilde" (G. & K.)

Einzigfarbig unter den Anemonen, die prachtvollen, schalenförmig halbgefüllten Blumen sind rötlich fliederfarben in auffallend reiner, klarer Farbe, auf festen, starken Stielen blühend: Blumendurchmesser 9-10 cm.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Anemone japonica "Loreley" (G. & K.)

Hellfliederfarbig - rosa, um einen Ton dunkler als "Königin Charlotte". Halbgefüllte schalenförmig runde Blumen von 9 cm Durchmesser blühen auf festen Stielen. Ausserordentlich reich blüht diese Neuheit in Mengen gleichmässig guter Blumen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Stauden-Zusammenstellungen.

Um im Garten

anlockende Blütenbilder

vor Gehölzgruppen oder auf Rabatten vom Fühjahr bis zum Herbst abwechselnd zu schaffen, die - durch Umpflanzung nach mehreren dem Garten dauernd zum Schmuck gereichen, haben wir nachfolgend eine Zusammenstellung winterharter ausdauernder Stauden getroffen, die — in der Blüte folgend — in Gruppierung jeder Art für sich prächtig wirken. Die Auswahl der Sorten ist die beste in kräftigen Pflanzen.

Zu Gruppenpflanzungen:

10 Primeln in feinen Sorten	*
10 Teppich-Phlox	*
10 Trollius	**
10 Aquilegien (Akelei)	**
10 Iris (Schwertlilien)	+
10 Paeonien (Chinesische Pfingstrosen) " " "	\$
10 Papaver (Türkischer Mohn) , , ,	**
10 Campanula (Glockenblumen) , , ,	**
10 Pyrethrum	**
10 Delphinium (Rittersporn)	8
10 Scabiosen	**
10 Phlox dec. (Flammenblumen) , , , ,	**
10 Rudbeckien in zwei zusammenpassenden Sorten	. +
10 Anemone jap. (Japanische Anemonen) in feinen Sorten	**
10 Herbst-Astern	8
	*
* 20 cm Pflanzweite. † 30 cm Pflanzweite.	
** 25 cm Pflanzweite. § 50—100 cm Pflanzweite.	
Obige Zusammenstellung kostet	
Dieselbe je 5 St	- 1

Staudenrabatten.

Bei Anlegung von Staudenrabatten ist es vorteilhaft, wenn man die verschiedenen Arten von Stauden nicht einzeln anpflanzt, sondern zu mehreren truppartig je nach Grösse und Breite der Rabatte. Meistens genügen zu einem solchen Trupp 3—5 Stück einer Sorte. Dadurch erzielt man gleich in den ersten Jahren eine grössere Pflanze, deren Blütenpracht dann als grosser Einzelbusch besser wirkt, als wenn sie gleich verteilt angepflanzt sind. Ausserdem hat man mit dieser Truppflanzung den Vorteil, dass auf der Rabatte die verschiedenen Arbeiten besser ausgeführt werden

Hochwachsende Stauden bringe man mehr in die hintere Truppreihe, und zwar so, dass die schlank und straff wachsenden Sorten sich mit den mehr breitgehenden ergänzen. Mittelhohe Sorten stelle man ungleichmässig, da sie eben die Hauptmasse ausmachen und zu den niedrigen Sorten den Uebergang bilden. Aber auch auf Farbe und Blütezeit muss mit geachtet werden, wenn man eine schöne Rabatte haben will.

Wir haben hierfür ein gutes Stauden-Sortiment zusammengestellt, für grosse wie kleinere Rabatten und liefern wir 100 Stück in 3-5 Stück einer Sorte nach unserer Wahl ${\mathcal M}$ 30,-

Auf der Rückseite der Pflanzenschilder bemerken wir die Höhe in römischen Zahlen und bedeutet I. ganz hohe, II. mittelhohe und III. niedrig bleibende Stauden.

Wir bitten nur die Breite und Länge der zu bepflanzenden Fläche anzugeben und stellen daraufhin das Sortiment zusammen.

I. Zusammenstellung von Stauden am Rande von Gehölzgruppen, willkürlich verteilt, zu pflanzen.

25	St.	in	25	schönen	Sorten			M 8,50,	100	St.	M	30,—
25	22	"	25	feinsten	22			. 11.—				

Blumenliebhaber

wünschen in der ganzen Wachstumszeit täglich Blumen schneiden

zu können — möglichst langstielig für Zimmerschmuck. Um diesem Wunsche Rechnung zu tragen, haben wir in nachstehender Zusammenstellung eine ununterbrochene Reihenfolge winterharter, ausdauernder Stauden aufgestellt, die in der angegebenen Auzahl ein tägliches Schneiden der reizvollsten Blumen ermöglicht.

Diese, für den Blumenschnitt bestimmte Zusammenstellung sollte auf einer besonderen Rabatte angepflanzt werden.

Für den Blumenschnitt:

10 Doronicum	**
10 Phlox divaric. canadensis	. *
10 Trollius in feinen Sorter	1 **
10 Primula (Japanische Primeln)	*
10 Frühjahrs=Astern	**
10 Iris (Schwertlilien)	+
10 Paeonien (Chinesische Pfingstrosen)	+ \$ **
10 Pyrethrum	**
10 Federnelken	*
10 Centaurea (Ausdauernde Kornblumen) , "	+
10 Chrysanth. maximum	**
10 Delphinium (Rittersporn)	S
10 Edel-Disteln	\$
10 Scabiosen	**
10 Coreonsis	-}-
10 Helianthus (Ausdauernde Sonnenblumen)	8
10 Rudbeckien	1
10 Pyrethrum uliginosum	+5++
10 Anemone jap. (lananische Anemonen)	**
10 Herbst=Astern	Ş
The state of the s	2
* 20 cm Pflanzweite. † 30 cm Pflanzweite.	
** 25 cm Pflanzweite. § 50-100 cm Pflanzweite.	
Obige Zusammenstellung kostet	Parentee
Dieselbe je 5 St	
" je 25 "	

Für Einfassungen empfehlen wir folgende Stauden:

Achillea umbellata, Alyssum saxatile und Varietäten, Arabis alpina und Abarten, Armeria Laucheana, Aster alpinus albus, ruber, Nixe, superbus, Aster Fremonti und subcoeruleus, Aster caespitosus purpureus und de la Toussaint, Asperula odorata, sämtliche Aubrietien-Sorten; Campanula carpathica u. comp. alba, carpathica comp., carpathica alba grandifl., carpathica pelviformis, turbinata "Isabella" und glomerata acaulis, Epimedium (für Halbschatten), weissgefüllte und far-bige Federnelken, Funkien (für Schatten), besonders Funkia jap. aureo-variegata, chinensis, maculata und undulata vittata. Geum Heldreichi, Gypsophila repens und repens rosea, Hepatica in Sorten, Heuchera-Arten, Iberis alle Sorten; Iris pumila und pumila-Hybr., alle Frühjahrs-Phlox, besonders Phlox div. canadensis, div. Laphami, setacea G. F. Wilson, set. Sternteppich, set. Sprite, Phlox pilosa u. pilosa "Brillant", Pulmonaria saccharata, rubra und angustifol. azurea, alle (für Schatten) Primula acaulis Hybr., acaulis coerulea, Primula elatior gig. und in Farben gelb und weiss, Aurikeln, Saponaria ocymoides, Saxifraga, moosartige Sorten, Saxifraga umbrosa (für Schatten) Sedum-Arten, besonders S. kamtschaticum und spurium splend., Silene Schafta, Veronica alpina, incana, rupestris, saxatilis rosea, Vinca minor und minor variegata für Schatten, Viola cucullata grandiflora, Viola cornuta-Varietäten und G. Wermig; Viola odorata (Veilchen)-Sorten für Schatten; ni Gräsern: Glyceria spectabilis, Festuca glauca und punctoria, sowie sämtliche im alphabeth. Verzeichnis mit "F" bezeichneten Pflanzen.

II. Zusammenstellung für grosse Felspflanzungen in hohen und niederen Stauden mit Beigabe von dekorativen Halbsträuchern, Gräsern und Koniferen.

50	St.	in	25	auserlesenen	Sorten						M	27,50
100												50,—

Stauden-Zusammenstellungen.

III. Zusammenstellung für kleinere Steinpartien in höheren	VI. Zusammenstellung niederer Stauden von 15-45 cm Höhe
und niederen Sorten.	für die vordere Seite auf schattigen Rabatten.
25 St. in 25 schönen Sorten	25 St. in 25 besten Sorten M 10,-, 100 St. M 35,-
100 , , 25 , , , , 27,50	
25 25 feinsten	VII. Zusammenstellung von hohen Stauden für Rabatten.
25 , , , 25 feinsten , , 10,—	25 St. in 25 schönen Sorten
100 , , 25 , , ,	25 " 25 feinsten " " 11,—, 100 " " 40,—
IV. Zusammenstellung von Stauden und Schmuckgräsern	
200 Standen und Schillickgrasern	VIII. Zusammenstellung v. Stauden für Frühjahrsblütenflor.
für den Rand von Teichen und Springbrunnen.	25 St. in 25 besten Sorten
25 St. in 25 schönen Sorten M 9,50, 100 St. M 35,—	20 20 11 20 20000 20100 1 1 1 1 1 1 1 1
25 St. III 25 Scholler Conton	IX. Zusammenstellung von Stauden für Herbstblütenflor.
25 " 25 feinsten Sorten mit den	25 St. in 25 besten Sorten
besten Gräsern " " 12,50	
100 St. in 25 feinsten Sorten	100 , , 25 , , ,
	X. Zusammenstellung der besten Stauden für Blumenschnittt
V. Zusammenstellung niederer Stauden von 15-45 cm Höhe	
für die vordere Seite auf sonnigen Rabatten.	zum Straussbinden.
	25 St. in 25 besten Sorten
25 St. in 25 besten Sorten	100 , , 25 , ,
	,,,
Einima Panflanza	tong Vangalal"
Linige Dephanzi	ings=Vorschläge.

Wir möchten durch die folgenden, kurzen Hinweise auf dankbare Ausschmückung der Gärten durch Blüten nur einige Anregung zur praktischen Anwendung geben.

In Rosenhochstamm-Gruppen

oder zwischen Rosenhochstamm - Reihen Unterpflanzung von Paeonia sinensis, die den Rosen in der Blüte vorangehen.

Vor Rododendron

Gruppen von Paeonia sinensis, die den ersteren sofort in der Blüte folgen und somit eine Fortsetzung derselben bieten.

In Rhododendron - Gruppen

Lilien als Zwischenpflanzung, die über dem Rhododendron-Laube die Gruppe im Herbst beleben. Auch Gladiolen statt der Lilien eignen sich hierzu. Ebenfalls Halbstämmehen von **Hydrangea** paniculata und Rosen, die man in Töpfen heranzieht und während der Blüte dazwischen setzt. Passende Einfassungen: bunte Funkien, Epimedium, Astilbe Queen Alexandra, Erica carnea, Vierländer Primeln und Saxifraga umbrosa.

Farben=Wirkungen

von Gehölzblüte mit davor gelagerten Stauden.

Ausser der wechselnden gemischten Staudengruppierung vor Gehölzgruppen machen wir auf folgende, prächtig wirkende, bestimmte Farbenzusammenstellungen der gleichzeitigen Blüte aufmerksam. Wir denken hierbei weniger an eine Einfassung, als vielmehr an eine zwanglose Voreinander-Gruppierung.

Anfang=Ende April:

Forsythien, goldgelb, mit einfachen und gefüllten Arabis, schneeweiss.

Ende April-Mitte Mai:

Spiraca arguta, reinweiss mit Doronicum, goldgelb oder Phlox divar. canad., lilablau oder Iris pum. hybr. cyanea, dunkelblau. Prunus sinensis, rosa oder weissgefüllt mit Vierländer-Primeln, goldgelb.

Mitte=Ende Mai:

Spiraea van Houttei, reinweiss mit Viola cucullata grandiflora, Grossbl. Pfingstveilchen, dunkelblau oder Wermigveilchen.

Ende Mai-Ende Juni:

Philadelphus niedere Lemoinei-Hybriden. besonders Manteau d'hermine, schneeweiss mit Aster alpinus superbus, hellblau oder Heuchera sanguinea, zierlich, rot oder Delphinium Belladonna, himmelblau,

Philadelphus hohe Lem.=Hybriden "erectus" und "Mont blanc" mit Papaver orientale, rot oder Lupinus polyph. roseus, rosa.

Mitte Juni-Mitte Juli:

Deutzia crenata candidissima plena, weiss mit Delphinum hybr., blau.

Anfang Juli-August:

Ceanothus, blau oder rosa mit Solidago virgaurea nana, gelb.

Ende Juli-Mitte Sept.:

Hydrangea paniculata grandfl., weiss mit Veronica Hendersoni, blau.

Anfang August-Herbst:

Hibiscus, weiss, rosa rot und blau mit Phlox decussata, rot, weiss, rosa.

Mitte Sept.=Frost: Caryopteris mastacanthus, blau mit weissen Herbst-Anemonen.

Vor grünen Gehölzen:

Rudbeckia Neumanni mit lila Phlox. Astilben, rosa und weiss und pupur. Anchusa italica mit Coreopsis oder Helenium pumilum magnificum. Lupinus polyphyllus roseus.

Oenothera Youngii, mit Lychnis chalcedonica fl. pl.

Delphinium Belladonna und Varietäten mit Oenothera fruticosa major.

Viola cornuta G. Wermig mit Rudbeckia Neumanni oder Oenothera Youngii oder Trollius, orangefarbig, oder Gypsophila paniculata fl. pl. oder Malva moschata alba.

Einzelpflanzen

zu mehreren in einem Trupp, um gleich die Wirkung einer grossen Pflanze zu erzielen.

Acanthus Agapanthus, weiss und blau Aralia, alle Sorten Artemisia lactiflora Asphodelus luteus Bocconia japonica Cephalaria transsylvanica Crambe cordifolia Delphinium, hohe Sorten Echinops humilis

Echinops Ritro Eremurus mit Helenium pumilum magnificum Eupatorium purpureum Gypsophila paniculata fl. pl. Heracleum Mantegazzianum Helianthus salicifolius Hemerocallis citrina " flava major Paeonia arborea

Paeonia sinensis Rheum (Zierrhabarber) Solidago Shortii Spiraea Aruncus Telekia speciosa Tritoma, alle Sorten Veratrum nigrum Verbascum, alle Sorten Yucca filamentosa " karlsruhensis.

Alphabetisches Stauden=Verzeichnis.

Bei jeder Art der Verwendung der Stauden sollte — ausgenommen bei Einzelpflanzung auf Rasen oder auf kleineren Rabatten — eine gewisse Anzahl einer Art in zwangloser Gruppierung zusammengepflanzt werden, um stets volle Wirkung zu erzielen, das ist natürlicher und schöner als zuviel einzelnes durcheinander.

Die kurze Angabe der Monate bedeutet die Blütezeit, die Zentimeterzahl die Höhe der Blütenstände. Diejenigen Stauden, bei denen kein besonderer diesbezüglicher Vermerk, dürfen der vollen Sonne ausgesetzt sein.

Für alle Stauden, die man zur vollen Schönheitsentwicklung bringen will, beachte man folgende Bedingungen:

Standort: Frei und luftig.

Boden: Ob schwer oder leicht, die Pflanzen müssen Nahrung darin finden.

Bearbeitung: Lockerhaltung der Erdoberfläche durch

Wasser müssen die Stauden haben, sobald die Sommerwitterung zu trocken wird.

Winterschutz ist im ersten Winter nach der Pflanzung nötig; am besten durch Tannenreisig, sonst durch Laub, letzteres aber nicht auf das Herz der Pflanze, nur über die Wurzeln.

Keine botanische, nur Schönheits-Sammlung winterharter Stauden.

Die mit einem F bezeichneten Pflanzen sind niedrigbleibende, für Felspartien besonders geeignete Stauden, die auch für Einfassungen gut zu verwenden sind.

- Acanthus. (Bärenklau.) Die Acanthus sind sehr dekorative I Schmuckstauden ihrer edelgeformten Blätter wegen, die im Altertum die klassischen Vorbilder für plastische Verzierungen waren. Die Pflanzen verlangen guten Winterschutz, insbesondere auch gegen Fäulnis.
 - latifolius Topfpflanzen . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- Achillea Millefolium Cerise Queen (Schafgarbe). Eine neue prächtige kirschrotblühende Schafgarben-Abart, die fast den ganzen Sommer hindurch blüht. Hauptblütezeit Juni-August. Anspruchslos für trockene Orte. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
 - Eupatorium Parkers Var. Die leuchtend goldgelben gewölbten Blütendolden werden, straff nach oben zeigend, von kräftigen Stielen getragen. Die Pflanzen, zu grösseren Trupps vereinigt, sind sehr dekorativ. Juli-August.

ptarmica,, The Pearl". Eine grossblumige, reinweissgefüllte Schafgarben-Abart, die sehr ergiebig für den Blumenschnitt ist. Juli 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

umbellata ist eine reizende niedere Staude für Felspartien mit einem Busche weissfilziger feinzerschnittener Blätter und grossen, weissen Blütendolden. August.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Aconitum (Eisenhut)

gedeihen auch im Halbschatten.

Aconitum Fisherl blüht später als die folgenden Napellus-Sorten, dunkelblau über glänzend grünem Laube. 60 bis 70 cm. September 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Lycoctonum pyrenaicum. Starke dichte Rispen mit Blüten von reingelber Farbe. 100-120 cm.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Napellus. Die kräftigen Blütenschäfte tragen schlanke Rispen dunkelblauer Blüten in Helmform, wodurch der Name "Eisenhut" entstanden ist. Juni-August. 1,20 bis 1,50 m hoch 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Napellus albus, mit weissen Blütenrispen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- Napellus bicolor. Der zweifarbige Eisenhut mit blau und weissen Blüten, wodurch diese Spielart auffallend zierend wirkt. Juni-August 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- praecox. Die Pflanze bildet schlanke, lockergestellte Blütenrispen von leuchtend dunkelblauer Farbe über dem glänzenden, feingefiederten Laubwerk. 1 m. Juni-Juli.
- 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Sparks Var. Die dunkelste aller blauen Sorten, bildet diese seltene Art ca. 150 cm hohe Blütenstiele, die reich verzweigt sind. Juli-August 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Aconitum tauricum. Die kräftigen Blütenrispen fallen durch ihre gesättigt tiefblaue Farbe auf, die durch den Blütenreichtum zu voller Wirkung gehoben wird. 1,50 m. Juni-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Wilsoni. Ein spätblühender, von Sept. bis Anfang Oktober lange Rispen lichtblauer Blumen tragender Eisenhut; aus China stammend, $1-1^{1}/_{2}$ m hoehwerdend.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Actaea siehe Cimicifuga, Seite 23.

Agapanthus umbellatus, blau Dieselben sind prächtige Schmuckpflanzen mit hohen blauen oder weissen Blumendolden über glänzend grünem, breitbändrigem Blattwerk. Die Agapanthus halten unter leichter Decke an trockenen Stellen im Freien aus. Sicherer überwintert man dieselben im kalten Kasten

Starke Pflanzen 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Althaea rosea plena. (Malven oder Stockrosen.) Gefüllte Malven.

Für wirkungsvolle Ausschmückung an allen Stellen im Garten, wo hohe Pflanzen angebracht sind, sind die Malven die besten Stauden mit ihren mächtigen Blütensäulen, geformt aus dicht um

den Stengel stehenden grossen, gefüllten Blumen in reinen Farben, von reinem weiss durch gelb, kupfrig, lachsfarben, rosa bis zum rot. Die Malven verlangen kräftigen Dünger und im Sommer viel Wasser 2 m. Juni-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

F Alyssum (Steinkraut).

Alle Arten sind mit wenigen Ausnahmen herrliche Frühlingsblüher.

Alyssum idaeum (Steinkraut). Von kriechendem Wuchse und graublauer Belaubung mit kleinen gelben Blüten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

alpestre. Dichte gelbe Blütendolden im Juli. 10-20 cm.

saxatile compactum. Die tiefgoldgelben Blüten auf silbergrauer Belaubung schmücken im Frühling die sonnig gelegenen Beete und Felspartien. Höhe 25-30 cm.
1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

saxatile citrinum. Eine Abart der vorigen mit hellgelben Blütenrispen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

saxatile fl. pl. Dieses neue, in grossen Sträussen goldgelb gefüllt blühende Alyssum ist eine vorzügliche, niedrig bleibende Staude für sonnige Lagen und Felspartien.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Anchusa siehe Seite 15.

Herbst=Anemonen.

Anemone japonica.



Unser Anemonenfeld in Blüte.

- *,,Auréole". Die mittelgrossen Blumen sind gefüllt, weiss mit leichtem rosa Hauch, auf der Rückseite lebhafter rosa.
- *, Beauté parfaite". Auf hohen Stielen vollkommene, grosse, runde Blumen, leicht halbgefüllt, weiss mit zartfleischfarbenem Anhauch. 70—90 cm.
- "Brillant" (die alte japanische Stammform), hell-magentarot, 40 cm hoch.
- "Coupe d'argent". Die weissen halbgefüllten Blumen haben zuweilen einen leichten fleischfarbenen Hauch.
- *,,Couronne virginale". Hochwachsend, mit mehrreihig gefüllten Blumen, weiss mit rosa Schein. 70-90 cm.
- *,,Couronnement". Die halbgefüllt offene Blume in grosser, flacher Form ist innen weiss, nach dem Rande zu lila auslaufend, mit lila Rückseite. 8 cm Durchmesser, 60-80 cm.
- *, Diadème". Der Wuchs ist niedrig mit schlankgestielten, kreisrund-schalenförmigen, karmin-rosafarbenen Blumen, die straff nach oben zeigen. Gute Gruppensorte. 40-60 cm.
- "Elegantissima". Schlank und hochwachsend, sehr reichblühend auf langen Stielen. Die weisslich-malvenfarbige Blume ist aus schmalen, doppelreihigen Blumenblättern rund gebaut. 60–80 cm.
- *, Géante blanche". Von allen weissen Anemonen ist diese bis jetzt die schönste und grösste. Die prachtvollen grossen Blumen sind flach schalenförmig, silberweiss und stofflich fest und werden von hohen, starken Stielen getragen.
- "Honorine Jobert" (oder japonica alba) beals eine der schönsten, herbstblühenden Stauden mit ihrem unermüdlichen Reichtum der schneeweissen Blütendolden.

- ,,Königin Charlotte" vereinigt alle Vortigen Schnittblume in sich. Die grossen, halbgefüllten Blüten sind edel geformt, seidenartig, fleischfarbig rosa mit dunklerer Rückseite und blühen in reicher Menge auf festen, langen Stielen. 70–90 cm.
- ,,Kriemhilde" (G. & K.). Einzigfarbig unter den Anemonen, die prachtvollen, schalenförmig halbgefüllten Blumen sind rötlich fliederfarben in auffallend reiner, klarer Farbe, auf festen, starken Stielen blühend, Blumendurchmesser 9—10 cm. . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- *,,Lenain rose". Die nur 40 cm hohen Pflanzen bilden einen gedrungenen Busch, bedeckt mit grossen, gefüllten Blumen von abgeplatteter Form und hell amarantroter Farbe.
- ,,Loreley. (G. & K.). Hellfliederfarbig-rosa, um einen Ton dunkler als "Königin Charlotte". Halbgefüllte schalenförmig runde Blumen von 9 cm Durchmesser blühen auf festen Stielen. Ausserordentlich reich blüht diese Neuheit in Mengen gleichmässig guter Blumen.

 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- *,,Mont Rose" trägt bei kurz gedrungenem Wuchse halbgeschlossene, kräuselig halbgefüllte Blumen, weisslich-lila mit violettrosa. 40–50 cm.
- "Prinz Heinrich" ist eine prächtige Anemone für Gruppenpflanzung, da sie niedrig gedrungen wächst und magentarote halbgefüllte Blumen hat. 40 cm.
- *, Rosa Zwerg". Niedrig wachsend, mit halbgefüllten lilarosa Blumen.
- *, Turban". Die vierreihigen, schalenförmig rundgebauten Blumen auf festen, starken Stielen sind amarantrosa und erreichen einen Durchmesser von 9–10 cm. 60–80 cm.
- *,,Vase d'argent". Schlank und hochwachsend, dabei reichblühend, reinweiss, grossblumig und leicht halbgefüllt. 70—90 cm.

Anchusa italica superba.

Die echte sogenannte Dropmore-Varietät. Die mächtigen Pyramidenrispen der Anchusa sind bei dieser Varietät tief leuchtend gentianenblau und bilden etwa mit Corcopsis in Farbenkontrast zusammengepflanzt einen auffallenden Gartenschmuck. Juni-Aug. Höhe 1,50-2,00 m. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 30,-

Anchusa italica "Opal"

" myosotidiflora

siehe unter Neuheiten Seite 3.

F Androsace Chumbyi. Klein silberblättrig, rosablühend. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- F Anemone sylvestris. Der zierliche Aufbau der grossen, reinweissen Blüte und der Gegensatz derselben zum dunkelgrünen Laube verleiht der Pflanze einen allerliebsten Anblick. 50 cm. März-Mai . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Pulsatilla (Küchenschelle). Bekannte Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten. Für Halbschatten. März-April. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Pulsatilla alba. Dieselbe Form mit weissen Blumen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

F Antennaria tomentosa (Katzenpfötchen). Eine niedrige, teppichartige Fel-pflanze mit dichtstehenden, weissfilzigen, glänzenden Blättern 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 18,-

Anthemis Kelwayi (Hunds-Kamille) blüht ganz ausserordentlich reich als winterharte, gelbe Marguerite von Juli bis zum Eintritt der Fröste. 50 cm.
1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- Kelwayi alba, eine weisse Form dieser wertvollen Schnittblumenstaude. Für grössere Felspartien, Abhänge und Böschungen sind die beiden Margueriten besonders wertvoll. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- Anthericum Liliastrum major (Gras-Lilie) hat Trauben von grossen, reinweissen Blüten in zierlicher Glockenform und von sehr feinem Duft. 50 cm. Mai-Juni. 1 St. *M* 0,40, 10 St. *M* 3,50

Liliastrum giganteum (St. Bruno-Lilie). Diese prächtige grossblumige Graslilienart ist selten, da sie niemals Samen ansetzt. Die hohen, s raffen Blütenstiele mit der grossglockigen, schneeweissen Aehre erinnern an eine verkleinerte, weisse Madonnenlille. 75 cm Mai-Juni. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-, 100 St. M 75,-

Aquilegien (Akelei).

Die Aquilegien gehören durch ihren eleganten Wuchs, ihr schönschmückendes Laub, ihre zierlich prächtigen langgespornten Blumen, die in überaus grossen Mengen auf schlanken Blütenstengeln schweben, mit zu den zur Ausschmückung der Gärten wertvollsten Stauden, zumal sie auch noch in halbschattiger Lage gut gedeihen.



Aquilegia coerulea hybrida.

Aquilegia baicalensis, dunkelblau mit weisser Blumenkrone, kräftig wachsend und frühblühend. 90-100 cm. Mai.

- canadensis, hängende Blüten, gelb mit scharlachroten Sporen. 50 cm. Mai-Juni.
- chrysantha, goldgelbe, sehr grosse Blumen mit langen Sporen. 60 cm. Juni-Juli.
- coerulea (species). Eine herrl'che Sorte für Felspartien. Ueber den zierlichen Blättern stehen die lachend blauen Blüten, die innen reinweiss sind, in reicher Menge. Mai-Juni.

Aquilegia coerulea hybrida.

Unsere Zucht dieser herrlichen Hybriden ist in den prächtigen zartrosa und lilafarbigen Tönen der langgespornten Blumen besonders schön. 70 cm. Mai-Juni.

- flabellata nana alba, eine weissblühende niedere Akelei-Sorte, die sich durch ihren gedrungenen Wuchs und ihre ausserordentliche Reichblütigkeit auszeichnet.
- glandulosa. An den grossen Blumen umrahmen gesättigt tiefblaue Kelchblätter die reinweissen inneren Blumenblätter; dieser scharfe Farbengegensatz ist von vorzüglicher Wirkung. Muss vor zu grosser Winternässe geschützt werden. 50 cm. Mai-Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- Helenae. Eine durch Kreuzung der flabellata nana alba mit coerulea entstandene Hybride. Die Pflanzen sind ge-drungen und straff wachsend und ihre Blüten sind innen tiefblau, umgeben von den weissen Hüllblättern.
- nivea grandiflora mit hohen, weissen Blütenständen, 80 bis
- olympica. Die weisse Mitte ist hellblau umrahmt.
- stellata. Eigenartig gefüllte Blüten, in allen Farbenschattierungen. Dieser Sorte fehlt der schöne Sporn.
- truncata, lebhaft orange-scharlach mit gelb.
- vulgaris-Hybriden, die hohen, starkwachsenden Akelei in der feinsten Mischung der Farben. 120 cm. Juni.

Alle nicht mit besonderen Preisen bezeichneten Sorten kosten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Die Akelei-Arten, besonders Aquilegia coerulea, chrysantha und vulg.-Hybriden, also die starkwachsenden Sorten, eignen sich besonders für lockere Partien am Waldesrand.

F Arabis (Gänsekraut).

Alle Arabis-Arten sind trockenliebende Pflanzen, daher für Mauern und Felspartien in erster Linie zu berücksichtigen, wo sie bald zu dichten Polstern heranwachsen, die im Frühjahre mit weithin leuchtendem Blütenschnee bedeckt sind.

Arabis alpina compacta, bildet als erster Frühjahrsblüher schneeweisse, dichtgeschlossene Blütenkissen, die in grösserer Gruppe wie Schneeteppich wirken. 20 cm. März.

- alpina flore pleno. Die gefülltblühende Arabis ist eine wertvolle Bereicherung unseres Frühjahrsflors. Die starkduftenden, schöngebauten, reinweissen Rispen erinnern an Levkojen. 30 cm. März-April.
- alpina fl. pl. fol. varieg. ist eine Form der gefülltblühenden Arabis mit weissbunten Blättern.
- alpina fol. var. mit leuchtend weissbunten Blättern, einfach
- carduchorum, niedrig, rasenbildend, mit weissen Blütchen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- grandiflora superba wächst zwar nicht so gedrungen wie compacta, hat aber den Vorteil der grösseren, besonders schönen Blüte.

Alle ohne Preis versehenen Sorten kosten: 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

Sturii. Weiss über dem dunkelgrünen Polster blühend, für sonnige Felsen besonders geeignet.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

F Arenaria tetraquetra, bildet niedere, flache, grüne Polster mit weissen Blütchen 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 F Armeria Laucheana (Grasnelke) bildet ein festes, polsterartiges Laubkissen, aus dem sich zahlreiche, rosenrote Blütenköpfchen erheben. 15 cm. Für Einfassungen geeignet.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-

Aralia californica, ebenso wertvolle Einzelpflanze wie die nachfolgenden.

- Cashmeriana. Zierlicher und von mehr strauchartigem Wuchs als die vorhergehende; ebenfalls zur Einzelstellung
- edulis. Hohe Blattpflanze mit grossen fiederteiligen Blättern, die einen prächtigen Rasenschmuck bildet. 1,50 m.

Jede Sorte: 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Artemisia lactiflora. Neu! Im Schmuck einer sehr zierlichen dunkelsaftiggrünen Belaubung wirkt diese neue aus China stammende Edelraute an sich schon sehr zierend, ganz besonders aber erst in den Monaten August-September nach Erscheinen der zahlreichen weissen, wohlriechenden Blütchen, 160 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Asclepias tuberosa (Seidenpflanze) trägt auf starken blattbesetzten Stielen senkrecht nach oben gerichtete, leuchtend orangegelbe Blütendolden, dreiteilig verzweigt, aus zierlichen, in der Mitte zusammengeschnürten Blüten gebildet. Eine eigenartig schöne Pflanze, auch zum Blumenschnitt. Verlangt Winterschutz. 50 cm. Juli-Aug. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Asperula odorata. (Waldmeister.) Unser allbeliebter duftiger Waldmeister eignet sich vorzüglich zur Unterpflanzung von lichten Gehölzgruppen; die zierlichen weissen Blütchen erscheinen im Mai 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-

Asphodelus luteus. Die sternförmigen gelben Blumen sind traubig an den hohen Stengeln geordnet. 75 cm. Eine Zwischenpflanzung mit späten, hohen roten Tulpen sehr vorteilhaft

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Frühjahrs-Astern oder Frühjahrs-Sternblumen.

Aster alpinus "Nixe".

Aster alpinus (Alpenaster).

Sämtliche angeführten Aster-alpinus-Varietäten eignen sich zur Ausschmückung für Felspartien wie auch zur Einfassung von Rabatten.

F Aster alpinus albus ist die weisse Form der Alpenaster. 20 cm. Mai.

"Nixe". Eine wunderhübsche, wertvolle neue Spielart mit spitz gedrehten u. sternförmig ausstrahlenden, hellblauen Randblumen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

" ruber, mit weinroten Scheibenblumen.

" superbus. Aus dem grünen, buschigen Polster der lanzettlichen Blätter erheben sich an straffen, langen Stielen die prächtig grossblumigen, blassblauen Scheibenblumen mit mattgelber Mitte in solcher Menge, dass sie eine dichte Farbenmasse bilden. 30 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-



Aster alpinus superbus.

Aster Fremonti mit halbhohen, lilarosafarbenen Blumen, die sehr ergiebig für den Blumenschnitt sind. 30 cm. Mai-Juni.

- peregrinus ist eine der zartesten Frühjahrsblumen mit lockeren lilafarbenen Blütchen. 25-30 cm. Mai-Juni.
- subcoeruleus blüht von Mai bis Juni mit leuchtend hellviolettblauen Randblüten um braungelber Scheibenmitte auf 40-50 cm hohen, schlanken Stielen.

Herbst=Astern.

In den ausgesucht feinen Sorten der Herbststauden-Astern wird ein Blütenreichtum für den Blumenschnitt u. Gartenschmuck geboten, wie er in solcher Fülle und Schönheit in der späten Jahreszelt nicht übertroffen werden kann.

Der besseren Uebersicht wegen haben wir die Herbst-Astern in folgende Gruppen eingeteilt.

Die Zahlen hinter den Sorten geben \ 1 Blütezeit: August-Mitte September. 3 Blütezeit: Anfang—Ende Oktober. die Blütezeit an und bedeuten: Mitte September—Anfang Oktober. 4 Mitte Oktober - Anfang Novbr.

Neuere Sorten.

Aster hybr. Abendröte. Früh- und reichblühende Sorte mit mittelgrossen, lebhaft rosa Blumen, Rispen locker und gut verzweigt. 2 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

hybr. Beauty of Colwall. Die gefüllten klar lavendelblauen Blumen blühen in reicher Verzweigung an straff aufrechtstehenden 1,20 m hohen Trieben. Diese schöne neue Varietät ist sehr empfehlenswert.

1 St. M 1, -, 10 St. M 9,hybr. Boule de Neige. Die äusserst voll- u. reichblühende Sorte hat schneeweisse Blumen mit kleiner gelber Mitte von mittler Grösse. Für den Blumenschnitt sehr empfehlenswert. [3] 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

hybr. Dornröschen. Eine sehr schöne Varietät mit zierlicher Belaubung und feinstrahligen, kräftig rosa-farbenen Blüten dicht besetzt. 1 m hoch. 2

1 St. M 0,75, 10 St. 6,-

Nov. Belg. Esme. Die nur 50-60 cm hoch werdende Pflanze trägt mittelgrosse, klar weisse Blumen. Sehr reichblühend und für Gruppenpflanzung vorzüglich geeignet. 2

1 St. 1, -, 10 St. 1, 9, -

hybr. Glühwürmchen. Sehr reichblühend und dichte, kompakte 1 m hohe Blütenbüsche bildend. Die Farbe ist weiss mit gelber Mitte. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,

hybr. Keston Star. Diese besonders scholle Varietät wird bis 140 cm hoch. Die eleganten, locker gestellten Rispen tragen grosse, feinstrahlige Blumen von schöner lilarosa Farbe. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

hybr. Lavendel. Die bis 1,50 in noch wei-dende Pflanze hat grosse, wohlgeformte, lavendelblaue Blumen. Mit spätblüh. Harpalium zusammengepflanzt von guter Wirkung. 2 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

hybr. Loreley. Eine der besten unserer weissen Asternsorten. Die etwa 1 m hohe Pflanze trägt sehr grosse reinweisse Blumen mit kleiner gelber Mitte. (2-5) 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Nov. Belg. Mrs. Frank Brazier. strahlige lilablaue Blumen an lockeren stark verzweigten Rispen. Sehr voll und reichblühend, 120-130 cm hoch. [2] -5 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Aster hybr. Schön Rottraut. Die Blüten dieser auffallenden Varietät erscheinen Ende Sept., sie sind am Rande feurigrosa, nach der Mitte in licht- bis weisslichrosa abgetönt. 2-3 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

hybr. Schneelawine. Die über 1 m hochwachsende Pflanze trägt schneeweisse Blüten mit hellgoldgelber Mitte. Vorzüglich zum Blumen-



Unter dieser Bezeichnung führen wir die niedrig- u. reichblühenden, buschartigen Sorten an, die sich ohne Hilfe eines Stabes tragen u. zur Gruppenpflanzung besonders geeignet sind u. auch im Knospenzustande verpflanzt werden können.

Aster Amellus Beauté parfaite. Ende Aug. erscheinen auf 40-50 cm hohen Stielen die sehr grossen, klarblauen Blumen von 6-7 cm Durchmesser.

Amellus Framfieldi, frühblühend mit grossen dunkelblauen Blütendold., grösser und schöner als die ältere bessarabicus. 40 cm. II

Amellus Perle rose, siehe Neuheiten.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Amellus Perrys Favourite. Eine vorneuere Varietät der Aster Amellus. Die schönen grossen Blüten stehen auf 50-60 cm hohen Stielen und sind zart malvenrosa mit kleiner gelber Mitte. Ausserordentlich reichblühend. 1 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Amellus Phoebus hat mittelgrosse, wohlgeformte Blumen

von dunkellila Färbung. [1]

Aster Amellus Preziosa hat eine prachtvolle ultramarinblaue Blütenfarbe u. ist sehr reichblühend. II 1 St. M-0,80, 10 St. M 7,—

caespitosus purpureus. Die nur 30-40 cm hohen Büsche sind mit hellrosafarbenen Blüten dicht bedeckt. [3]-41

de la Toussaint besitzt dieselben Eigenschaften wie die vorhergehende. Beide Sorten blühen zu Allerheiligen und dürften ihres niedrigen Wuchses wegen für die Topfkultur sehr geeignet sein. [3–4]

ibericus "Ultramarin" (G. & K.). Die schönste u. leuchtendste aller Astern in tiefblauer

Färbung. Gedrungen wachsend sind die gleichmässig hohen, breiten Dolden der grossen Blumen dieser Neuheit gesättigt tiefultramarinblau und von auffallender Schönheit. Für leuchtend blaue Herbstblütengruppen ist diese Aster unübertroffen. 50 cm.

pyrenaicus, grossblumig lila auf niedrig-gedrungenem Busche. 30—40 cm; blüht von Anfang Juli bis Anfang Septbr.

Obige Sorten kosten, wenn kein Sonderpreis angegeben,

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

Die empfehlenswertesten Herbst-Astern für Blumenschnitt und Gartenschmuck.

Aster cordifolius=Sorten.

Zierlich feinblumige, halbhohe Sorten, deren Seitentriebe in Doppelverästelung zu zwei Drittel ihrer Länge dicht mit Blütchen wie mit kleinen Sternchen überschüttet sind.

Cordifolius ,,Blütenregen". Auffallend dicht und reichblühend in lichtlila Farbe. 100 cm. [3]

elegans. "Die Vergissmeinnicht-Aster" trägt die weichlilablauen Blütchen an langen, zarten, aber dennoch harten und haltbaren Zweigen in Ueberfülle. 130 cm. [3]
"Hon. Edith Gibbs". Schleierartig dicht fallend, lichtlila.

100—120 cm. Mitte September bis Anfang Oktober. 2 major. Weit grossblumiger als cord. elegans, mit grossen, weitverzweigten, hellilafarbigen Rispen blühend. 120 cm. 2

"Sprühlicht". Gedrungen, halbhoch wachsend mit breit ausladenden Blütenrispen, schleierartig, von licht bläulich weisser Färbung. 100 cm. 4

Sternartig kleinblumige weisse Aster-Sorten.

Diffusus Datschi ist die spätestblühende weisse Herbstaster, die an schlanken, hellgrünen Trieben mit unendlich vielen zierlich weissen Blütchen blüht. 120 cm. 4

Emlens. Von niedrigem Wuchs und mit kleinen Blütchen von

lilablauer Farbe bedeckt. 40 cm hoch.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— Ericoides (multiflorus) hat Erica-ähnliches Laub und ist dicht besetzt mit zierlichen, weissen Blüten. 100 cm. [3]

Vimineus mit sehr zierlichen Rispen unzähliger kleiner, weisser Blütchen, 100 cm. 2

Grossblumige weisse Aster-Sorten.

Laevis White Queen. Eine auffallend hohe, lockere Blütenpyramide bildend mit reinweissen Strahlenblüten. 150 cm. 🗵

Nov. Belg. lanceolatus. Breite lockere Rispe mit feinstrahligen, weissen Blüten mit wenig merkbarer, gelber Mitte.

Weitere grossblumige weisse Sorten siehe unter "Neuere Sorten" auf vorhergehender Seite!

Grossblumige lila u. blaue Herbst-Aster-Sorten

in der Art der Novi Belgii-Klasse.

Die langen Nebentriebe sind aufwärts gerichtet und blühen bei Novi Belgii-Sorten von der Hälfte ihrer Länge an in Traubenoder Doldenrispenform; bei laevis-Sorten an der oberen Spitze der Einzeltriebe kopfartig.

Hybrid. Shortii ist mit ihren prachtvoll geformten, grossen Blütenständen, dicht gefügt aus weichlilafarbenen Blüten, eine der edelsten Herbst-Astern. 130 cm. [2]

Laevis "D. B. Crane", neu! Frühblühend, mittelhoch, über-

schüttet mit ziemlich grossen, lila Blüten. 120 cm. [1]
"Robert Parker", lange Zweige voll grosser, lavendelblauer
Blumen mit gelber Scheibe. 170 cm. [2]

Nov. Belg. "Archer Hind" ist eine unserer schönsten Astern, deren Blumen unter allen später blühenden Sorten das klarste und schärfste Blau haben. Anfang bis Ende Oktober. 130 cm. 🗵

Belg. "J. W. Burbidge", grosse, weichheliotropfarb. Blumen in dichten Rispen. Extra! 130 cm. 2 Belg. "Maidenblush", hellila, sehr dicht blühend. 160 cm. 3

Belg. "Nancy" bildet einen dichten, 1 m-hohen Busch klarblauer Blumen.

Belg. "Thirza". Die dichten Blütenrispen bilden einen duftenden Mantel aus milchig lilafarbenen Blumen. Anfang bis Ende Oktober. 120–130 cm. 3 Nov. Belg. "Triumph" mit herrlichen, dichten, hellilablauen Rispen. 130—140 cm. [3]

- puniceus pulcherrimus. Schon der Name macht auf die Schönheit dieser herrlichen Aster aufmerksam. Pyramidendolden zartlilafarbener, grosser Blumen mit gelber Mitte.
- hybr. Venus. Die äusserst reichblühende Sorte wächst pyramidal, 1 m hochwerdend, und trägt Rispen lilablauer Blumen mit kleiner gelber Mitte. [3] . . 1 St. \mathcal{M} 0,60, 10 St. \mathcal{M} 5,—

Rosafarbene Aster = Sorten

in der Art der Novi Belgii-Klasse.

"Admiration". Frisch karminrosa, einen dichten, gedrungenen Busch bildend. 50—60 cm. Neu!

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Laevis "Eos" (G. & K.) ist eine reichblühende und grossblumige rosafarbene neue Aster, die 120–130 cm hoch wird und von Anfang bis gegen Ende September blüht. I "Esther" ist eine zierlich belaubte Aster mit reichem Schmuck

zartrosafarbener, mittelgrosser Blütchen. Mitte September.

50-60 cm. 2

Novi Belgii "Mrs. H. Morris". Eine sehr reichblühende, schön rosafarbene Neuheit mit mittelgrossen Blumen. Mitte September bis Mitte Oktober. 100-120 cm. 2 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Belgii "Pleiad" mit kleinen, hellilarosa Blütchen überschüttet.

30-40 cm. 2

hybr. Rosalinde. Von leuchtender reinrosa Farbe, mittelgross, sehr reichblühend. 2 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Grossblumige Aster Novae Angliae-Sorten.

Diese Sorten halten abgeschnitten nicht so gut wie alle andern; Blätter und Triebe sind wollig. — Die Nebentriebe blühen nur an der Spitze mit einer Blume oder zu mehreren kopfartig, während die Einzelblumen in dieser Klasse besonders gross werden.

Blaue Sorten:

Nov. Angl. "W. Bowmann" mit grossen violettblauen Blumen. 2 "Treasure" hat auffallend grosse violettblaue Blumen. September bis Oktober. 130—150 cm. [3]

Rosa- und rotblühend:
Nov. Angl. "Lil Fardell", grossblumig, karminrosa. 120-130 cm. 2
""Mrs. J. F. Raynor" ist wie Lil Fardell besonders schön von frischkarminroter Farbe in den grossen Blumen, 120—130 cm. 2

"Ryecroft Pink", glänzend karminrosa, sehr grossblumig. 130—140 cm. [1] "ruber", weinrot, 130—140 cm. [3]

Aster-Sorten, die nicht in vorgenannte Einteilungen passen.

Diffusus "Coombe Fishacre". Breite, einseitige Rispen von bläulich rosafarbenen Blüten mit fleischfarbenem Hauch. 130 cm. [5]

horizontalis. Die schlanken Zweige wachsen horizontal abstehend und tragen feine Blütchen von brauner Farbe mit weissen Staubfäden. 80 cm. 3

"Golden Spray", ericoidesartig, aber die grössere gelbe Blütenmitte

gibt dem ganzen Blütenschleier einen mehr goldgelben Schein. 2 "King Edward VII". An horizontal abstehenden Zweigen malvenfarbig blühend. 50-60 cm. Neu! 2 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Paniculatus "W. Grant". Der dichte Busch mit hängenden Rispen ist ganz überladen mit licht lilafarbenen, kleinen Blüten. 120 cm.

Der Preis obiger Herbstastern aus allen Abteilungen beträgt, wenn kein Sonderpreis angegeben ist: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-. Nach unserer Wahl 10 St. in 10 Sorten M 3,50, 100 St. in 10 Sorten M 30,-

Astilbe (Spierstaude).

Die verschiedenen Astilbensorten lassen sich mit Leichtigkeit auch während der Blütezeit verpflanzen, vorausgesetzt, dass man sie hierfür vorbereitet, indem man sie jedes Jahr verpflanzt. Ein vorübergehender Ersatz für abständige Blumengruppen besonders in halbschattiger Lage. Für grosse Anlagen, in Mengen angepflanzt, von bezaubernder Wirkung.

Astilbe Arendsi. (Deutsche Pracht-Spiraea.) Es sind dies prächtige neue Hybriden von Astilbe Davidii mit japonica compacta. astilboides und Thunbergi. Die reichverzweigten Rispen der 80 bis 100 cm hohen Pflanzen haben wunderbar schöne Farbentöne von weiss bis creme und von hell-lilarosa bis purpurrosa. Blütezeit Juli bis August.

Arendsi Brunhilde, Neuheit!

Gunther

Kriemhilde

Siegfried

Beschreibung und Preis dieser 4 Neuheiten auf Seite 3.

Vorjährige Neuheiten.

Astilbe Arendsi "Ceres". Die reichverzweigten 80-100 cm hohen Blütenrispen sind leuchtend lilarosa, zierlich und locker gebaut. Juli-August.

- Arendsi "Juno". Die kräftig pyramidal reichverzweigten fedrigen Rispen sind von leuchtend purpurrosa Farbe.
- Arendsi Lachskönigin. Die Einzelblüten sind reizenden Perlchen vergleichbar, die meistens zu mehreren in kleinen Knäulen vereinigt sind. Die zierlich reichverzweigten lockeren Rispen sind von hell-lachsrosa Farbe. 80 cm.
- Arendsi "Rosa Perle". Die perlartig kleinen Blütchen sind von schöner zart rosa Farbe, in dichten pyramidalen Rispen stehend von 60 cm Höhe. August.
- Arendsi "Vesta". Von hellilarosa Färbung sind die sehr verzweigten Blütenrispen. Ende Juli.

Obige 5 neue Astilben kosten 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Astilbe chinensis. Ueber dunkelgrünem Laubbusch 80 cm hohe, rosafarbene Blütenrispen. Juli-August.


1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- Davidii (Chinesische Pracht Spiraee) ist eine prächtige Spiraeen - Art aus China. Die prächtigen Blütenrispen erlangen bei guter Kultur — Feuchtigkeit und Halbschatten — eine Höhe von über 1½ m mit zierlichen Blüten von lilapurpurrosa Färbung. Juli-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- grandis. Neu! Ist ebenfalls eine Neueinführung aus China und das Gegenstück zur vorigen. Die bis 2 m hoch werdenden Blütenstiele tragen schöne, pyramidal federige Rispen von cremeweisser Färbung. Juli. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
- hybrida Queen Alexandra. Neu! Erinnert im Wuchs und in Form der Blütenrispen an Astilbe japonica, die Farbe jedoch ist ein reines frisches Rosa. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-
- hybrida Peach Blossom, ist zart pfirsichblütenrosa gefärbt. Diese und die vorige Sorte lassen sich mit Leichtigkeit treiben 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
- Lemoinei Nuée rose, hat schöne Blütenrispen von reiner zartrosa Färbung. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- Thunbergi trägt reichverzweigte bis 80 cm hohe Blütenfahnen in fleischfarbig getöntem weiss. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- Thunbergi major bringt über üppig grüner Belaubung 80 bis 100 cm hohe cremeweisse Blütenfahnen. 1 St. M0,50, 10 St. M4,—

Astrantia major (Stern-Dolde), bringt weissliche Stern-blüten in überreicher Zahl. Eine Waldcharakterpflanze. Bis 80 cm 1 St. **M** 0,50, 10 St. **M** 4,00

F Aubrietien (Blütenpolster).

Die Aubrietien und besonders die neueren grossblumigen Varietäten bilden unter den Frühjahrsblühern eine Hauptgruppe von niederen Stauden. Ihre rosa, rot, violett bis purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März und April in solcher Menge, dass die kleinen niederliegenden Polster vollständig überschüttet erscheinen. Besonders wirkungsvoll und zu grösseren Trupps gepflanzt auf Felspartien, Trockenmauern und an Böschungen, wo sie niemals ihren Zweck verfehlen werden.



Aubrietia.

FAubrietia Hendersoni, samtig-violettblau, grossblumig.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,hybr. Dr. Mules, hat leuchtend dunkelviolette Blüten, gross-. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

hybr. Fire King. Die leuchtendste von allen Aubrietien. Die Farbe ist karminrot. . . . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

hybr. Lavender, die prächtigen grossen Blüten sind wunderbar hellavendelblau 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
hybr. Pauls Lilac, zart rosalila, grossblumig.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
hybr. Prichards al, hat herrlich dunkelviolette Blüten. Eine

auffallende schöne Farbe . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

hybr. Purple Robe, schön purpurrosa, grossblumig.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Leichtlini Crimson, leuchtend karminrosa.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— tauricola, bildet ganz niedrige, dem Boden aufliegende dicht geschlossene Polster, die kleinen Blüten sind dunkelviolett.

Bellis perennis fl. pl. "Ruhm von Frankfurt". Ein neues Massliebchen, dessen dichtgefüllte, leuchtendrote Riesenblumen

grösser als ein Fünfmarkstück werden. Für ganze Beete oder zu Einfassungen geeignet. 10 St. M 1,20, 100 St. M 10,—

Betonica grandiflora superba, auf 30—40 cm hohen Stielen erscheinen im Juli die grossen hellpurpurnen Lippenblüten in dichter breiter Aehre . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

"nivea, eine blendendweisse Art mit mehr niedrigem Wuchs als die vorige, 25 cm. Juni. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Bocconia iaponica. Lieber den grossen blaugein gelagneten Plättern.

Bocconia japonica. Ueber den grossen blaugrün gelappten Blättern stehen die bis 3 m hohen weissen Blütenrispen. Eine vorzügliche Einzelpflanze auf Rasen in grossen Parks und Gärten. Anspruchslos . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Boltonia siehe Diplostephium.

F Calamintha alpina (Kölme), blauviolett blühende Labiate. 15 bis 30 cm. Mai—Aug. Für Felspartien und trockene Böden geeignet 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— Caltha palustris plena. Eine dichtgefüllt blühende Form unserer

bekannten einheimischen goldgelben Sumpfdotterblume 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Campanula siehe folgende Seite. F Carlina acaulis (Wetterdistel), die stengellose Silberdistel, wird

allerdings im Garten bis 30 cm hoch. Eignet sich für sonnige trockene Böden und Felspartien. Die Blüten schliessen sich bei Regen und in der Nacht und öffnen sich bei Sonnenschein wieder, daher Wetterdistel genannt. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 acanthifolia. Mit gelblichen Blütenköpfen, ähnlich, aber

grossblumiger als die vorige. 15 cm. 1St. M1,-, 10 St. M9,-

Centaurea montana.

(Ausdauernde Kornblumen.)

Die Pflanze ist ganz besonders schön, wenn sie in guter Kultur ist, d. h. reichen Boden und reichliche Bewässerung im Sommer hat, dann aber sind die Blumen, besonders von der roten Varietät, wundervoll in grossen kornblumenartigen Scheibenblüten in Schalenform

Centaurea montana, blau

" alba, weiss April-Mai, 40-50 cm

" rubra, rot

Diese 3 Sorten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

dealbata, sehr reichblühend mit rosafarbenen Blumen über

gefiedertem Blattwerk. 60 cm.
ruthenica, mit straff aufwachsenden hohen Blütenstielen, die je eine kugelige, federig-lockere, schwefelgelbe Blüte tragen. Centaurea Tourneforti, tief goldgelbe runde Blütenköpfe, einzeln auf langen, starren Stielen, verzweigen sich in reicher Menge vom Blütenschafte aufwärts. Haltbare und wirkungsvolle Schnittblume. 120 cm. Juli-August.
Vorhergehende 3 Sorten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,

Cephalaria transsylvanica. Bis 3 m hochwachsende scabiosen-blütige Solitärstaude. Nur für grosse Parks. Gelbblühend . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,

Chelone barbata coccinea (Schlangenkopf), eine herrlich blühende Staude. Die hohen, schlank verzweigten, pyramidalen Blütenrispen sind von unten bis oben bedeckt mit leuchtend scharlachroten Blüten mit weissem Schlund. Von grosser Wirkung als Gruppenpflanze auf Rasen und Rabatten. Juli-Sept.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Lyoni. Die hübschen rosa Lippenblüten erscheinen im Juli-Aug. Bis 50 cm hoch. Sehr widerstandsfähig.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Campanula (Glockenblumen).

Hochwachsende Glockenblumen.

Campanula alliariaefolia (Syn. cordifolia). Die hohen, schlanken Rispen sind in einseitiger Aehrenform mit weissen Glöckchen besetzt und für Vasensträusse sehr brauchbar. Juli-August.

grandis. Ist von kräftigem Wachstum mit grossen, flachen, blauen Blumen. 80 cm. Juli-August.

grandis alba. Eine Spielart der vorigen mit weissen Blumen,

glomerata dahurica. Die zahlreichen Blütenschäfte tragen in den Achseln der Blätter quirlständige Büschel von Blüten und endigen in eine Blütendolde von prachtvoller, tief gesättigt violett-blauer Farbe. 50 cm. Mai-Juni.

Obige Sorten kosten 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50.

glomerata dahurica superba. Neu.

1 St. M 1,00, 10 St. M 8,00.

Beschreibung unter Neuheiten Seite 4.

- pyramidalis, mit schlankgebauten, dichtgedrängten, blauen
- pyramidalis alba. Die schlanken, hoch wachsenden Blütenschäfte sind geformt aus dichtstehenden, flachen, reinweissen
- pyramidalis compacta und
- pyram. compacta alba sind beides gedrungen niedriger wachsende Formen der vorigen.

Alle 4 Sorten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,00.

Campanula-persicifolia-Varietäten.

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten, grossen Glockenblumen geben den Pflanzen ein sehr gefälliges Ausschen und sind wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang—Ende Juni.

Campanula pers. alba gig. pl. "Moerheimi" ist mit ihrem Reichtum der sehr grossen, lockergefüllten, edelgeformten Blüten auf straffen Stielen die beste, weissgefüllte Campanula für den Blummensheitt. panula für den Blumenschnitt. 50-60 cm.

pers. grandiplena "Capri" (G. & K.) ist eine prachtvolle riesenblumige, neue Glockenblume, glänzend dunkelblau und halbgefüllt bei grosser Reichblütigkeit. 50-60 cm.

persic. **multiflora** (G. & K.). Die weit geöffneten, grossglockigen Blumen, seidenartig glänzend blau, bilden gleichmässig hohe, geschlossene Blütenrispen, die in verschwenderischer Fülle dichtgedrängt stehen. 50—60 cm.

pers. "Seidenball" (G. & K.). Seidenglänzend fliederblau sind die gefüllten stofflich festen Blumen, die auf den auffallend straffen, hohen Stielen auch prächtige Schnittblumen liefern. 60-70 cm.

"Vineta" (G. & K.). Die riesigen, halbgefüllten dunkelblau glänzenden Glocken werden bis zu 8 cm im Durchmesser gross und sind in der Farbe noch dunkler als "Capri". 50–60 cm.

grandiflora, mit grossen, blauen Glocken.

alba grandifl. mit grossen, reinweissen Glocken.



Beete mit Campanula persicif. gig. pl. "Moerheimi" in unseren Anlagen aufgenommen.

Campanula pers. "Die Fee", eine reizende, neue Spielart mit hellilafarbenen Glocken. 80—90 cm.

Die verschiedenen Campanula persicifolia - Varietäten kosten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,— Campanula pers. Hybriden, grossglockig, in Mischung mit weissen

und blauen Blumen . . . 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

F Niedrig bleibende Glockenblumen.

Campanula carpathica, bildet einen niedrigen, gedrungenen Busch, der zur Blütezeit mit den aufrechten, blauen Glockenblumen dicht bedeckt ist. 20—30 cm. Juni—Sept. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—

carpathica alba, mit weissen Blüten.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,— " alba grandiflora. Die flach schalenförmigen grossen Glocken sind von reinstem Weiss. Zur Blütezeit sind die gedrungenen Pflanzen überschüttet mit Blumen. Eine vorzügliche Gruppen- und Einfassungspflanze, sehr geeignet für Felspartien. 20-30 cm. Juni-Sept. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4, -

F Niedrig bleibende Glockenblumen.



Campanula garganica breitet sich kriechend aus mit reizenden, sternartigen, blassblauen Blüten mit weisser Mitte.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

hirsuta. Die Blätter dieser Abart sind stark behaart. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

- glomerata acaulis. Dichtgedrängte Blütenköpfe leuchtend dunkelblauer Glockenblumen liegen wie ein Kissen eingebettet in niedriger Blattrosette.
- Portenschlagiana. Der kriechende Wurzelstock windet sich überall durch die Felsen und treibt im Mai aufrechtstehende klar blaue Glockenblüten.
 - Bavaria. Eine Abart der vorigen mit dunkelblauen Blüten. Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Camp. carpathica compacta,

eine reizende Form der Camp. carpathica, die in der Blütezeit ein gewölbtes Kissen dicht-stehender dunkelblauer Blüten bildet, die je eine grosse flach - schalen-förm. Glocke bilden. 20 bis 30 cm. Juni-September. Schöne Gruppenpflanze für regelmässige Beete oder auch auf Felspartien verwendbar.

Camp. carpathica pelviformis.

Diese reizende, auf-fallende Varietät hat hellblaue Glocken von flacher, offener Form

in lieblichem Farbengegensatz zu den dunkelblauen und weissen Arten

Campanula pulla. Die hängenden, tief dunkelblauen Glocken stehen auf dünnen, drahtartigen Stielen. 10 cm. Juni-Juli.

pusilla, reizende, niedere, alpine Glockenblume mit harten, beinahe klingenden hellblauen Glöckehen, sehr reichblühend und entzückende Gruppen auf Felspartien bildend.

" alba, reinweisse Abart der vorigen. Wilsoni gehört zu den reizendsten niedr. Glockenblumen, deren leucht, dunkelblaue Glocken das kleine Laubkissen überdecken.

turbinata Isabella ist eine der schönsten niederen Campanula-Varietäten. Die grossen, schalenförmigen Glocken sind von rein tiefblauer Farbe. Sehr reichblühend. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Obige Sorten kosten, wenn kein besonderer Preis angegeben: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-.

Chrysanthemum maximum=Varietäten.

In kurzer Zeit haben sich die Chrysanthemum (Wucherblumen) ungeteilten Beifall und Bewunderung erworben. Aus unserer einfachen Wiesenblume hervorgegangen ist es den Züchtern gelungen, Abarten zu schaffen, die an Grösse und Schönheit die alte Form weit hinter sich zurücklassen, dabei aber eben so anspruchslos und infolgedessen für alle Zwecke, Rabattenpflanzung, zur Einzelvorausgesetzt, noch ein zweites Mal zur Blüte kommen.



Chrysanthemum maximum.

Chrysanthemum maximum. Die Pflanze wird nur 50 bis 60 cm hoch und ist dicht bedeckt mit Blüten, deren Blätter von gutem Gehalt und reinweisser Farbe sind; die Blumenmitte ist gelb. Zum Blumenschnitt vorzüglich geeignet und von bewundernswerter Reichblütigkeit. Juni-Juli.

maximum Davisii blüht am frühesten und beginnt den Flor der Chrysanthemum max, Varietäten. Mai-Juni. maximumEtoile d'Anvers, neu, prachtvoll grossblumig,

mit nur kleiner gelber Mitte. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— maximum filiferum "Edelweiss". Die grossen, schneeweissen Blumen sind an den Endspitzen dreibis vierfach geschlitzt. Juli-August.

maximum Gräfin Anna, sehr schön grossblumig, auf langen Stielen. Sie blüht später als die anderen

Sorten. August.

Mrs. J. Tersteeg. Neu! Bis 1 m hochwachsende Sorte. Mit besonders grossen auffallend edlen Blüten. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

maximum plenum, der weisse Blütenkranz ist zweireihig und ist diese Sorte durch ihr fortgesetztes Blühen besonders wertvoll. Juli-September.

maximum "Polarstern", ist eine auffallend grossblumige, auf hohen straffen Stielen blühende Neuheit

und von edelster Form.

maximum "Triumph", eine Spielart von max. mit prächt. geformten, um die Hälfte gröss. Blumen. Juli-Aug.

Alle nicht mit Preisen versehenen Sorten kosten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-.

Winterharte Chrysanthemum indicum.



Chrysanthemum-indicum-Strauss.

Achievement. Karminrosa, reichblühend und sehr grossblumig. Mitte Oktober.

Beacon. Dunkelkarmesinrot, sehr grossblumig und reichblühend, mittelhoch wachsend.

Belle l'Isloise. Hellorange, grosse und vollkommene Blumen bildend, spätblühend.

Captivation. Dunkelkarminrot, leicht gebaute Blume, reichblühend. Mitte Oktober.

Crimson Marie Masse. Rotorange, im Verblühen gelb werdend. gute Gruppensorte.

Dainty. Silbrigkarminrosa, ausserordentlich reichblühend; vorzügliche Gruppensorte.

Etoile Blanche. Reinweiss. Mitte Oktober in Blüte kommend. Goachers Crimson. Dunkelbraunrot, Rückseite der Blumen schillern golden. Anfang Oktober.



Chrysanthemum uliginosum.

Beim Bezug der Pflanzen im Herbst tut man gut, sie im kalten Mistbeetkasten eingeschlagen zu überwintern und im Frühjahr auszupflanzen.

In rauhen Lagen raten wir der Vorsicht halber eine gute Winterdeckung mit Torf oder Tannenreisig an (unter Laub tritt leicht Fäulnis der aus dem flachen Wurzelstock treibenden Triebe ein).

Bei der wachsenden Vorliebe für farbenprächtige Blütenstauden im Garten wird der Zuwachs durch frühblühende, harte Chrysanthemum mit besonderem Interesse aufgenommen werden.

Die herrliche Blütenschönheit der Chrysanthemum stand bisher nur den glücklichen Besitzern eines Gewächshauses zu Gebote. während nunmehr durch unsere Auswahl erprobter Sorten für das freie Land der Garten einen besonders wirkungsvollen Schmuck für die Herbstmonate von Ende August bis in den November erhält und zugleich ein herrliches Blütenmaterial für Vasensträusse bietet.

Für die Kultur genügt jeder gute Gartenboden, der mit verrottetem Dünger gemischt wird; das hält dann die Wurzeln feucht und den Boden locker. Reichliches Begiessen bei trockenem Wetter ist notwendig.

Wir empfehlen die folgenden Sorten:

Hilda Mary Narris. Fleischfarbigrosa, sehr grossblumig. Ende Oktober blühend.

Holmes White. Reinweiss, nach der Mitte zu in lichtgrün übergehend. Mitte September blühend.

Horace Martin. Goldgelb, grossblumig und reichblühend. Anfang Oktober.

Mrs. A. Cookson. Karminrosa mit Silbermitte, grossblumig und strahlig blühend.

Mrs. Hawkins. Zitronengelb, mittelgross, reichblühend. Auf. Oktob.

Nain Blanc. Reinweiss, grossblumig. Mitte Oktober.
Nina Blick. Braunrot, im Verblühen goldbronze werdend, gute straffe Haltung, vorzügliche Gruppensorte.

Nina Williams. Kastanienrot mit goldbronze Mitte, straff aufrecht wachsend. Ende Oktober.

Perle Chatillonaise. Im Aufblühen cremeweiss mit lichtlila An-

flug, später reinweiss, gute Haltung. Sept.-Okt. **Pride of Hayes.** Dunkelkarminrosa, gute Haltung, vorzügliche Gruppensorte.

Ralph Curtis. Cremefarben mit dunklerer Mitte, äussere Blumenblätter mit rosa Schein, reichblühend.

Kräftige Freilandpflanzen obiger Sorten kosten:

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

Junge Stecklings-Topfpflanzen, lieferbar im Frühjahr von Mitte April an . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Pompon-Chrysanthemum.

Niedrig gedrungen wachsende, kugelig-kleinblumige Sorten, die dabei aber unendlich reichblühend sind und sich zu niedrigen Farbengruppen besonders eignen, auch winterhart sind.

Kräftige Freilandpflanzen in Farben und Sorten unserer Wahl 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 30,-

Junge Stecklings-Topfpflanzen, lieferbar im Frühjahr von Mitte April an . . 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

Chrysanthemum uliginosum (Pyrethrum), ist wohl die schönste weissblühende Herbststaude, da der über 1 m hohe Busch über dunkelgrünem, geschlitztem Laube dicht gedrängte Mengen langgestielter, margueritenartiger, grosser, weisser Blumen trägt. Sept.-Okt.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Cimicifuga (Silberkerzen).

Alle Cimicifugen (auch Actaeen genannt) sind mit ihren schlanken, hochaufstrebenden, weissen Blütenrispen besonders zierende Schmuckstauden und zum Blumenschnitt sehr empfehlenswert; gedeihen auch in Halbschatten vorzüglich bei etwas feuchtem Standort.

Cimicifuga americana ist eine herrliche Halb-schattenpflanze; bis 1,50 m hoch.

" cordifolia, mit schlanken, geraden, kerzenartigen, cremeweissen Blütenähren, 100--120 cm. August.

Cimicifuga japonica mit reinweissen Blütenkerzen und ahornartigen Blättern. 120 cm. Aug.-Sept. Erstere 3 Sort. kosten: 1 St. M 0,60, 10 St. M 5, dahurica, gross und breitblätterig, blüht im August; weiss. 100 cm. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Clematis recta (Steife Waldrebe), blüht im Juni-Juli in grossen weissen rispigen Trugdolden, dieselbe eignet sich besonders für grössere Parkanlagen, wo sie an trockenen Orten noch gut gedeiht.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Coreopsis grandifl. (Mädchenauge). Eine unendlich reich- und dankbranden Staude, die lang-

stielige, schalenförmige, goldgelbe Blumen trägt, Juli-Sept. 60 cm.

lanceolata. Die lang-drahtartig gestielten Blüten

sind von tief goldgelb glänzender Farbe und einer anmutig edlen, lockeren Form. Die Pflanzen blühen sehr reichlich von Juli-Sept. 60 cm. verticillata. Reichverzweigt in grosser Fülle mit kleinen festgestielten hellgelben Strahlenblüten, blühend über zierlich schmalblättrigem

Laubwerk, 60—75 cm, Juli-September. Alle 3 Sorten kosten:
1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,— Crambe cordifolia (Meerkohl), ist mit ihren grossen herzförmigen Blättern und 2 m hohen Blütenschäften mit zahlreichen, kleinen weissen Blütchen eine schöne Einzelschmuckstaude.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Cyclamen europaeum. Das echte Alpenveilchen. Die kleinen rosa Blüten kommen im Juni-Juli u. duften köstlich. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Cypripedium Calceolus (Frauenschuh), eine sehr hübsche, einheimische Orchidee, die Halb-schatten verlangt . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

spectabile ist eine herrliche winterharte, nordamerikanische Orchidee. Die grossen Blumen sind oben weiss, während der untere, schuhartige Teil rein rosenrot ist. Sie verlangt Schatten und Feuchtigkeit. 70–80 cm.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Cimicifuga.

Delphinium Belladonna=Sorten.

Die ausserordentliche Beliebtheit und der anerkannt grosse Wert des schönen Delphinium Belladonna haben den Wunsch erweckt, die ihm noch anhaftenden Mängel, die hauptsächlich in der

schlechten Haltung der Pflanze, sowie der verhältnismässig kleinen Blüte liegen, nach Möglichkeit zu beseitigen. Wir bieten hierunter eine Sorten-Kollektion an, die eine ausserordentliche Verbesserung der alten D. Belladonna bedeutet. Die Haltung der ganzen Pflanze, die Grösse der Einzelblüten in ihrem wunderbaren Farbenschmelz sind ein ganz bedeutender Fortschritt.

Delphinium Belladonna. Die Blütentrauben sind von reiner himmelblauer Farbe, stark remontierend.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

" Capri. Neu! Eine besonders schöne Varietät der beliebten Belladonna-Rasse. Die stark verzweigten Rispen tragen grosse Blumen von reiner himmelblauer Farbe mit gelblicher Mitte. 150-180 cm. 1 St. M 6,50, 10 St. M 60.-

" grandiflorum. Neu! In kristallklarer Färbung und Grösse der Blüte die alte Belladonna weit übertreffend, hat diese schöne Sorte leider den Nachteil, dass sie nur kleine oder mittelgrosse Rispen bildet.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

" Moerheimi. Neu! Die Farbe ist ein reines Weiss und die Einzelblüten besonders gross. Die Pflanze wird 150-180 cm hoch und hat lange von unten an verzweigte Seitentriebe. Diese Neuheit wird eine beliebte Sorte für den Blumenschnitt werden.

1 St. M 6,50, 10 St. M 60,-

" Mr. Brunton. Neu! Wie Belladonna stark remontierend, von leuchtend himmelblauer Farbe. 120 cm. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

" Nassau (G. & K.). Unter Neuheiten Seite 4. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

" Persimmon. Neu! Eine Belladonna von sehr zarter himmelblauer Farbe, remontierend. 120 cm. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

" semiplenum hat halbgefüllte Blumen an locker verzweigten Blütentrieben. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,_



Delphinium Belladonna "Nassau".

Delphinium chinense. Der chinesische Zwerg-Rittersporn hat gedrungenen, niederen Wuchs und lockere, zierliche Blütentrauben. Wir empfehlen denselben in weissen, hellblauen und dunkelblauen Farben.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 grandiflorum sibirlcum. Dieser schöne Rittersporn hat einen niedrigen Wuchs und sehr verzweigte locker gestellte zierliche Plütenzieren. Die Farbe ist ein tiefes leughtendes zierliche Blütenrispen. Die Farbe ist ein tiefes leuchtendes Blau 1 St. M 0,50, 10 St. N 4,-

Delphinium nudicaule, der niedrige Rittersporn ist knollenbildend mit zierlichen, granatroten Blütentrauben.

sulphureum (Zalil). Hochwachsend, mit schwefelgelben, 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 lockeren Blütenrispen. Knollenbildend.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Alle angeführten Sorten liefern ein sehr begehrtes Material I für alle Art Blumenbinderei.

Delphinium (Rittersporn).

Der wohlbekannte hohe Rittersporn ist mit seinen 1 bis 2 Meter hoch wachsenden, kräftigen Blütenähren in den verschiedenen, schönsten Farbenzusammenstellungen eine prächtig schmückende Ausstattungspflanze. Unsere Sortenauswahl umfasst die schönsten, grossblumigen, gefüllt- und einfachblühenden Sorten in prächtigen Farben mit dichtgeschlossenen Blütenähren.



Delphinium hybridum (2 jähr. Pilanze).

Neuheiten eigener Zucht (G. & K.)

"Hallgarten" (G. & K.). Halbgefüllt, äußere Blumenblätter himmelblau, innere lilarosa. Lange, stark verzweigte Blütenrispen bildend.

Nordborgeit 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

"Neroberg". Halbgefüllt, äussere Blumenblätter hellblau. Füll-

blätter lilarosa 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"Niederwald" (G. & K.). Einfach azurblau mit rosa Schein.

Mitte tiefschwarz, besonders grosse Einzelblüte.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"Taunus" (G. & K.). Die einfarbigen dunkelkobaltblauen mächtigen Blütenrispen stehen auf festen Stielen, als Gruppenpflanze für Fernwirkung von ganz hervorragendem Werte 1 St. M 2,—

Neuere Prachtsorten.

"Atropurpureum". Eine sehr frühblühende neue Einführung.
Die Blumen sind leuchtend purpurblau mit schwarzer Mitte. Stark 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

"Cikade". Einfach himmelblau, innere Blumenblätter lilarosa. Dichte 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

"Clarion". Gentianenblau mit rosa Füllung. Mitte weiss.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,— "Excelsior". Die prächtigen, pyramidalen Rispen sind leuchtend blau mit rosa gemischt in grossblumigen, gefüllten Blüten.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"Grille". Dichte kerzenartige Rispen, hellblau mit rosa Füllung, Mitte weiss 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

"Heimchen". Einfach klar gentianenblau mit schneeweisser Mitte, auffallend reich verzweigt 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

"Libelle". Weich himmelblau mit rosa und schwarzbrauner Mitte, sehr grossblumig 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

"Lize van Veen". Die locker gestellten gut verzweigten Blütenrispen tragen grosse einfache Blumen von klarer himmelblauer Farbe. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

"Sailor Prince". Tiefsamtig kobaltblau, innen violett mit schwarzer Mitte, extra grossblumig 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"Seidenspinner". Einfach, himmelblau mit rosa Schein und hervortretender reinweisser Mitte . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

"Roi des Delphiniums". Das schönste aller grossblumigen Delphinium. Die majestätische dichte Rispe trägt prächtig grosse, rundgeformte, flach ausgebreitete halbgefüllte Blumen. Die äusseren Blumenblätter sind ultramarinblau, die inneren weinrot, wovon sich die grosse weisse Mitte prächtig abhebt . 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Eine Auswahl älterer bewährter Sorten.

Diadème. Hellblau mit rosa Schein.

G. Genty. Aussen blau, innen purpurviolett, mit weiss- und blaugestreifter Mitte.

Ivanhoe. Lichtblau mit weisser Mitte.

Kaiserin Augusta Viktoria. Einfach, leuchtend himmelblau, innen zart violett. Starke dichte Rispen.

Lamartine. Einfach, dunkelblau, sehr dekorativ.

Mad. W. Schwartz. Hellblau mit rosa geadert.
Minerva. Halbgefüllt, aussen hell himmelblau, innen rosa, sehr

Moise. Himmelblau mit rosa gemischt, sehr grossblumig.

Mrs. James Helme. Zart silberblau, sehr reichblühend. Ramolo. Dunkelblau. Dichte Rispen bildend. Ranunculiflorum. Dicht violettgefüllt, starke Rispen.

Schwärmer. Einfach blau, untere Blumenblätter rosa, Mitte braun. Trauermantel. Einfach himmelblau mit schwarzer Mitte.

Ustane. Hellblau, innen rosa, halbgefüllt. Victor Lemoine. Blau, niedrig.

Obige Sorten kosten

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-, 100 St. M 55,-Mit Namen unserer Wahl

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—

Delphinium hybridum. Aus Samen gezogene, gemischte Rittersporn in mehrjährigen, kräftigen pflanzen kosten 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Freiland-Nelken.

Grossblumige, gefüllte, sogenannte Chornelken.

(Dianthus Caryophyllus flore pleno.)



"Titania",

Vier neue Prachtsorten eigener Zucht.

"Almansor" unter Neuheiten Seite 4.

1 St. M 1,75, 10 St. M 16,-

"Titania" (G. & K.) ist eine ideal schöne Freilandnelke, die bei gedrungenem Wuchse in einer Höhe von 35—40 cm ihre herrlichen, zart fleischfarbigen Blumen, gross, in vollkommener Form, in zahlreicher Menge straff nach oben trägt, bei kerngesundem Laubwerk. Sie ist bewunderswürdig schön und vollkommen in allen ihren Eigenschaften und wird neben ihrem Werte als Schnittblume eine Gruppensorte erster Klasse werden.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 65,-

"Oberon" (G. & K.). In Wuchs, Höhe und Reichblütigkeit bei gleich straffer Haltung der Blumen ist Oberon das genaue Gegenstück zu Titania, während die Farbe ihrer grossen vollkommenen Blumen dunkelkastanienbraunrot ist.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 65,-

,, Rezia (G. & K. 1910). In Blühwilligkeit und guter Haltung der Blumen unübertroffen, hat diese schöne Neuheit mit Oberon und Titania die ungemeine Reichblütigkeit gemein und ist daher wie diese zur Gruppensorte wie geschaffen. Die Farbe der Blüten ist blendend weiss, alle Blumen nach oben zeigend.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Feinste Neuheiten der letzten Jahre.

"Die Königin" (G. & K.). Auf stolzen, 80—90 cm hohen festen Stielen ragen die straff getragenen grossen Blumen mit je bis 20 cm langen Einzelstielen, vom Hauptstiel aufsteigend, zu 5—6 auf einmal offen blühend, hoch. Die edelund rundgebauten wachsartigen Blumen sind bis über 7 cm im Durchmesser gross, reinweiss, während jedes Blättchen scharf karminrosa umrandet und hier und da leicht gezeichnet ist.

"Droll" (G. & K.). Schneeweisse, mit klaren karminroten Strichen gezeichnete Blumen, auf gedrungen festen Stielen aufrecht nach oben getragen, decken in reicher Fülle bei einer Höhe von nur 35—40 cm die kerngesunden Pflanzen. "Elfe" (G. & K.). Reichverzweigte Stiele tragen in fester, aufrechter Haltung die vollkommenen Prachtblumen in klar lila-rosa.

"Märchen" (G. & K.) ist eine Vervollkommnung unserer früheren "Dornröschen". Die glühend rosafarbenen seidenglänzenden Blumen, in edler Form und Füllung, 7 cm im Durchmesser gross, werden auf 60 cm hohen Stielen aufrecht getragen.

Freiland=Nelken (Fortsetzung).

Grossblumige, gefüllte, sogenannte Chornelken.

(Dianthus Caryophyllus flore pleno.)

Ueber die Pflege der Nelken.

In leichtem Boden gedeihen die Nelken nicht so gut wie in lehmhaltigem Gartenboden, auch ist bei der Pflanzung jeder frische Dünger zu vermeiden und nur verrotteter zu nehmen. Die Oberfläche der Erde wird häufig gehackt und bei trockenem Wetter reichlich gegossen. Dass bei der Länge der Stiele und der Schwere der Blumen ein sorgfältiges Anbinden der Nelken notwendig ist, wit selbstverständlich.

Während oder kurz nach der Blüte hake man die diesjährigen Triebe in den Boden nieder, decke sie an der Krümmungsstelle leicht mit Erde und häufle, wenn nötig, die Mitte der Pflanze mit Erde etwas an. Man erzielt dann kräftige, gesunde und

reichblühende Büsche für das folgende Jahr.

Wir legen grossen Wert auf die Gesundheit der Nelkensorten, und da wir gefunden haben, dass ältere Sorten besonders von dem Nelkenpilze und von der Nelkenmade zu leiden haben, so führen wir unseren Nelkensortimenten stets neues Blut zu aus frischer Anzucht, die wir aus tausenden Sämlingen eigener Befruchtung zur Vermehrung aussuchen.

Die erstklassigen führen wir dann unter der ersten Abteilung, die guten unter der zweiten, und zwar in Nummern nach

Farben eingeteilt. Die allerfeinsten unter Namen.

1. Auswahl.

Freilandnelken nach unserer Wahl in verschiedenen Farben, in Farben sortiert 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55.—

Freilandnelken, ältere Züchtungen, in verschiedenen Farben sortiert . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—

2. Auswahl.

Wir liefern nur starke, dem freien Land entnommene Senkerpflanzen mit festen Topfballen.

Feder-Nelken (Dianthus plumarius fl. pl.).

Die Feder-Nelken sind besonders durch ihren gewürzigen Duft zum Blumenschnitt sehr beliebt und eignen sich auch gut zu Einfassungen.

Zwei hervorragend schöne, neuere Federnelken: "Delicata" und "Gloriosa".

"Delicata". Die grossen, gewölbt gefüllten Blumen sind zart seidenartig lila mit leichter creme Tönung am Grunde der Blumen und stehen auf festen, langen Stielen.

"Gloriosa". Die aussergewöhnlich grossen und gut gefüllten Blumen sind rein lilarosa ohne jede Zeichnung, in den Petalen zierlich gefranst, fast nie platzend und werden von festen, lang verästelten Stielen getragen.

Diese beiden Sorten kosten:

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

"Nobel", siehe unter Neuheiten Seite 4.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

Weissgefüllte Federnelken

in den Sorten "Kaiser Wilhelm", "Her Majesty" und "Diamant" 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 22,50

Farbige Federnelken

in verschiedenen Farben und Zeichnungen

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-



FNelken für Felsen= oder Steinpartien.

Dianthus deltoides, ist eine prachtvolle Pflanze für Felspartien und Einfassungen. Ueber dem niedrigen, lockeren Polster erscheinen im Juni-Juli eine Menge leuchtend roter, dunkler punktierter Blumen 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Dianthus integer, bildet dichte Rasenpolster. Die kleinen hübschen Blütchen sind weiss. Für Felspartien sehr empfehlenswert. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

neglectus. Eine sehr schöne, leuchtend karminrote Felspflanze 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Dictamnus Fraxinella (Diptam), eine der ausdauerndsten Stauden von kräftigem Wuchs. Aus dem dichten und doch so leicht aussehenden Busch der straff aufrechtstehenden lederartigen Blätter erheben sich die pyramidalen Blütentrauben. Die einzelnen Blüten haben eine eigentümliche, leichte Form, sind rosarot, dunkel gestrichelt und es entströmt ihnen bei warmem Wetter ein ätherisches, explosives Oel von starkem Geruch. 60 bis 70 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Fraxinella alba. Im Wuchs wie die vorige, mit weissen

Blüten. Beide für halbschattige Orte. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Dielytra eximia (Herzblume). Die 30 cm hoch werdende Pflanze bringt während des ganzen Sommers kleine rosafarbene Blütentrauben zum Vorschein. Hauptblüte: Mai-Juni. Prachtvoll zur Unterpflanzung in lockerem Gebüsch und an sonstigen halbschattigen Stellen im Garten. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

spectabilis (*Tränendes Herz*); die altbekannte Frühjahrsstaude, an deren hohen, gebogenen Blütentrieben die rosafarbenen Blütenherzchen herunterhängen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Digitalis ferruginea gigantea (Fingerhut). braunen straffen Aehren werden bis 150 cm lang. Juni-Juli.

gloxiniaeflora (Gloxinienblütiger Fingerhut). Die hohen Blütenschäfte sind mit den grossen Blüten in dichter Aehre bedeckt; die Blumen sind in verschiedenen reinen Farben mit grossen, dunklen Flecken im Schlunde geziert. Juni-August.

120 cm. Beide Arten sind für waldartige Partien wertvoll.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—

Diplostephium amygdalinum (Boltonia' latisquama). A'te bekannte Art mit hübschen herbstasterähnlichen Sternblumen im Sept.; bis 150 cm hoch. Die Blütenstiele sind mit blaugrünen lanzettlichen Blättern besetzt und verzweigen sich 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

n laevigatum. Nicht so hoch wachsend wie die vorige, mit lilarosafarbigen Blüten. . . . 1 St. M. 0,50, 10 St. M. 4,—

Doronicum cordifolium, eine frühblühende Staude mit zierlichen, goldgelben, margueritenförmigen Blüten. 25 cm. April . 1 St. M. 0,30, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,—

"Clusii (Gemswurz), grossbl. wie plantag. excels., aber gedrungener wachsend und in gleichmässiger Höhe blühend. 50—60 cm. April-Mai

50—60 cm. April-Mai.

Columnae blüht früh wie caucasicum, aber mit schöneren und grösseren Blüten, die alle in einer Höhe stehen. 40—50 cm. April.

plantagineum excelsum ist eine prächtige frühjahrsblühende Staude, deren hohe, schlanke Blütenstiele grosse, edelgeformte, leichtgewellte, gelbe Scheibenblumen tragen und, wie alle Doronicum, auch im Halbschatten wie in der Sonne gedeiht. 80 cm. April-Mai.

Obige 3 Sorten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Edeldisteln.

Cirsium Velenovskyi ist eine neue Riesendistel, über 2 m hoch, mit grossen Silberköpfen, gekrönt mit purpurner Blütenhaube. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

F Eryngium alpinum, von hellvioletter Farbe u. weichstacheligen, hochgebauten Blütenköpfen . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Bourgati ist eine prächtige Edeldistel mit dunkelblauen Blüten-

- ständen. Die blauen Blütenstiele wie auch die festen graugrünen Blätter sind weiss geadert. 1 St. \mathcal{M} 0,60, 10 St. \mathcal{M} 5,
 - giganteum. Die grosse Elfenbeindistel bildet mit ihren silberglänzenden, grossen Blütenständen ein prächtiges Vasenmaterial, das sich auch trocken den ganzen Winter durch hält. Juli 1 St. M 0.40, 10 St. M 3,50

maritimum (Mannstreu), hat silbrigweisse Blätter, ebensoi Blütenstiel und Scheindolde. 50 cm. . . . 1 St. M 1,—
Oliverianum. Die grossblumige blaue Edeldistel ist mit ihren bizarren, schönen Blumenständen als Vasenschmuck

- sehr beliebt. Die grossen, gezackten Blütenköpfe und ebenso die Blütenstengel sind mit amethystblauer Farbe übergossen. Juli-August 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- Oliverianum superb. Die schönen grossen Blütenstände sind intensiver wie bei voriger 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

planum, die kleinstblumige der blauen Eryngium. 100 cm. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50.

coelestinum (himmelbl. Blütenst.) 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Onopordon bracteatum ist eine prächtige neue Riesendistel mit silberweissen Blattrosetten und über 2 m hohen, straff verzweigten starken Blütenschäften, mit scharfen Stacheln bewehrt und mit prächtigen purpurlila Blütenköpfen gekrönt. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,- Kugeldisteln.

Echinops humilis hat intensiv dunkelblaue kugelrunde Blüten-köpfe. 100 cm. Juli-August . 1 St. M 0.50, 10 St. M 4, niveus mit leuchtend silberweissen Blütenköpfen einzeln auf 100—120 cm hohen, scalanken, zierlich beblätt rten, festen Stielen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— Die zahlreichen leuchtend blauen, kugelrunden Ritro. Blütenköpfe auf schlanken, mit silbrig scheinenden Blättern besetzten Stielen sind ein vorzügliche Material für Sträuße.

F Epimedium (Elfenblume).

1 St. M 0 50, 10 St. M 4,-

Die Epimedien haben alle eine leichte lede artige Belaubung und zierliche Blütenrispen mit annutig geformten Blumen, die bei einzelnen an kleine Orchideenblüten erinnern. Sie erregen immer Bewunderung durch ihre zierlichen Formen. Gedeihen am besten im Halbschatten. Blütezeit April-Mai.

Epimedium alpinum hat rötl. viol. Blütch. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 macranthum, das "Odontoglossum-Epimedium", dessen wachsartig weisse Blütenrispe mit den zierlich geformten Blumen und den lang und spitz auslaufenden Blütenblättchen einer edlen Orchideenrispe ähnl. sieht. 1St. M0,60,10St. N5,-Musschianum ist sehr dankbar blühend mit roten Blütchen.

1 St. \mathcal{M} 0,40, 10 St. \mathcal{M} 3,50 niveum ist für schattige Stellen — selbst in tiefem Schatten - die dankbarste Staude für Einfassungen und zur Bedeckung kahler Bodenfläche mit ihrem kurzgedrungenen Busche lederartigen Laubes, das im Monat Mai dicht mit den zierlichen reinweissen Blütenrispen bedeckt ist. 15 cm hoch.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 " sulphureum, schwefelgelb. 25 cm. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Epilobium angustifolium grandiflorum (Weidenröschen). Eine grossblumige Abart der Stammform mit violettroten Blüten. Sehr geeignet für Unterpflanzung von lichten Baumbeständen. Juni-Juli 1 St. M 0,35, 10 St. M 3, angustifolium album, weissblühend. Beide Sorten sind

sehr dekorativ. Juni—Juli . . 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— Erysimum pumilum (Schotendotter). Die kaum 10 cm hoch wachsende Pflanze bringt leuchtend gelbe Blüten im Mai. Nur für Fels-. . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-



Eremurus.

(Kleopatra-Nadel).

Die Eremurus sind in der Blüte Pracht-Schaustücke, die mit jedem Jahre an Schönheit gewinnen. Die Blütezeit ist im Mai. Man pflanzt die grossen, flach ausgebreiteten Wurzelkronen im Herbst, so dass die Spitze vielleicht noch 10 cm bedeckt ist, gibt aber in schwerem Boden sehr gute Drainage und Sandbeimischung unter die Wurzelkrone, deckt in strengen Wintern die Erdoberstäche mit Laub und schützt den frühen Austrieb gegen Frühjahrs-Nachtfröste.

Eremurus Bungel ist eine sehr seltene, spätblühende Art mit goldgelben Blütenschweifen. Diese Art bildet nicht so kräftige Wurzeln wie die folgenden Sorten

himalaicus mit weissen Blütenschweifen. Starke 6—7jährige blühbare Pflanzen.

St. M. 3,—, 10 St. M. 27,50

robustus mit riesigen, rosafarbenen Blütenkerzen. 2 m. Mai-Juni.

robustus superbus. Dieser neue Eremurus ist in der Blütezeit eine herrliche Erscheinung, da seine riesigen Blütenkerzen von hellrosa Farbe eine Höhe von $2^1/_2$ —3 m erreichen. Nebenstehende Abbildung ist bei uns von einer Standpflanze im dritten Jahre nach der Pflanzung gemacht worden. — Starke blühbare Pflanzen, 6—7jährig . . 1 St. M 3,50

Erigeron grandifl. elatior. Ein neues Erigeron aus Nordamerika, das schon im Mai in reicher Anzahl seine edelgeformten, mattlilafarbenen Strahlenblüten zu je 2-5 auf 30-40 cm hohen Blütenstielen trägt

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 macranthum mit sehr grossen, hellilafarbenen Strahlenblüten. 40 cm. Juni 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50


(Aster) Mesagrande speciosus grandifl., blüht von Ende Juni bis zum Herbst mit feinstrahligen, grossen tiefblauen Strahlenblüten in lockerer Scheindolde auf drahtharten Stielen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Eupatorium purpureum.

Diese 150 cm hohe Staude bildet grosse Blütensträusse von kleinen purpurrosa farbigen Blumen. Eine sehr wirkungsvolle Staude zur Einzelpflanzung wie für feuchte Stellen 1 St. \mathcal{M} 0,75, 10 St. \mathcal{M} 6,—

Euphorbia polychroma.

Eine wunderhübsche Wolfsmilchart. Die weithin leuchtenden goldgelben Blütensträusse, welche in Dolden auf 40 cm hohen festen Stielen stehen, erscheinen im Juni und behalten ihre Färbung bis August. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—



Eremurus robustus superbus.

Funkien.

Der schönen Blätter wegen sind die Funkien besonders zur Schmückung unserer Gärten, namentlich aber auch zu Dauereinfassungen grosser Beete, Rabatten und Springbrunnen wertvoll. Sie gedeihen bei reichlicher Bewässerung im Halbschatten wie auch in der Sonne gleich gut.

Funkia chinensis bildet einen Busch graugrüner Blätter mit hellilafarbenen Blütentrauben im Juli

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,cucullata albo-marginata. Die grünen Blätter sind mit schmalem weissen Rande geziert.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,— Fortunei hat blaugrünes dickes Laub 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

" glauca ist herrlich stahlblau in der Belaubung, eine sehr wirkungsvolle seltene Pflanze 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— " robusta. Neu! Durch Kreuzung von Funkia Sieboldi

mit Funkia Fortunei entstanden, vereinigt diese Neuheit den starken Wuchs der ersteren mit der schönen Blattform und Färbung der zweiten Sorte. Grossartige Einzelpflanze 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

japonica aurea variegata treibt im Frühjahr prächtig goldbunt aus und ist durch seine grossen Blätter vorzüglich zu Randpflanzungen zu verwenden, mit reichem Schmuck von lila Blütentrauben im Juli. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Funkia maculata bildet mit ihren zierlichen schmalen Blättern, deren lange Stielchen braun punktiert sind, einen dichten hellgrünen Busch, geschmückt mit lila Blütentrauben, und eignet sich vorzüglich zu Einfassungen. Juli.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,minor alba blüht reinweiss über dem Busche der kleinen

schmalen Blättchen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,subcordata alba grandifl. (liliiflora) hat ausser dem Schmuck der grossen hellgrünen Blätter grosse, wohlriechende, reinweisse Blüten und ist als Schnittblume sehr geschätzt. Sept.-Okt. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

undulata vittata ist mit ihren leuchtend weissbunten Blättern die schönste buntblättrige Funkie, die auch besonders zu Weg-Einfassungen zu empfehlen ist und häufig im Winter in Töpfen angetrieben wird.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Funkien in verschiedenen Sorten unserer Wahl 10 St. M 3,—, 100 St. Mk. 25,—.

Freiland-Fuchsien.

Fuchsia Riccartoniana-Hybriden, eine Gruppe von ausdauernden Fuchsien mit schlanken, leichten Trieben, sehr reichblühend. Vor den Herbstfrösten schneide man die Pflanzen 30 cm über dem Boden ab und schütte sie gut mit Laub zu. Die ersten Winter halten sie nur unter sorgsamem Schutz im Freien aus; als ältere, festgewurzelte Pflanzen sind sie dann nicht mehr so empfindlich. Wir empfehlen von den besten Lemoineschen Hybriden Pflanzen aus Töpfen. 1 St. 10,50, 10 St. in 5 Sorten 11,4

Rheingauer Gaillardien (Kokardenblumen).



Gaillardien: Da wir die Gaillardien zu den schönsten und dankbarsten Stauden zählen, so haben wir uns seit Jahren bemüht, durch grosse Aussaaten und sorgfältigste Zuchtwahl und Kreuzungen neue Farbenschattierungen in den tadellosesten Blütenformen zu züchten.

Die Blumen sind sehr langgestielt und haltbar und vorzüglich zum Blumenschnitt geeignet, von edler Form und leuchtender Farbe. Der Blütenreichtum ist auffallend von Juni bis Oktober und sind deshalb die Gaillardien Ausstattungspflanzen erster Klasse.

Kultur: Die Gaillardien verlangen nahrhaften Boden, volle Sonne und zur trockenen Zeit im Sommer Bewässerung. Sie sind als festgewurzelte Pflanzen im freien Lande winterhart, doch ist es stets ratsam, die Wurzeln durch Deckung zu schützen. Herbstpflanzung, die bei den meisten Stauden vorzuziehen, ist bei den Gaillardien nur ganz frühzeitig anzuraten, sonst Frühjahrspflanzung vorzuziehen. Bestellungen auf Gaillardien erbitten wir jedenfalls schon im Herbst, um der Nachfrage genügen zu können.

Wir raten dringend dazu, die Gaillardien in Vorbereitung zur Ueberwinterung gegen Ende September über dem Boden abzuschneiden, es bilden sich dann dichte Blattbüsche, die - mit leichter Schutzdecke - ein gutes Ueberwintern der Pflanze sicherstellen.

"Neudorfer" ist in der Farbe völlig abweichend von allen anderen und besonders widerstandsfähig und winterhart. Die Farbe ist kirschrosa in sandfarbenem Rand auslaufend.

"Engerweg", tiefblutrot mit mattgelben Spitzen.

"Gräfenberger", hell kirschrot mit hell zitronengelbem Rand.

"Klebrot", dunkelblutrot mit zitronengelbem Rändchen, regelmässig gebaut mit doppelreihigen Petalen.

"Marcobrunner". Gedrungen niedriger Wuchs; die straffgestielten Blumen sind purpurkirschrot mit gelbem Rande.

"Nussbrunner". Der Wuchs ist gedrungen fest und die Blumen sind tiefweinrot mit breitem, hellcremefarbenem Rande und tiefschwarzbrauner Scheibe.

"Rauenthaler". Prächtiges Kirschrosa mit zitronengelbem Rande.

"Rotland", leuchtend tieflackrot mit hellgelbem Rande.

"Rheingold". Ein breiter, tiefgoldgelber Aussenrand umrahmt

einen blutkarmesinfarbenen Mittelring.
"Rüdesheimer". Kirschrot mit breitem, durchsichtigem, gelbem
Aussenrand, auffallend leuchtend, eine der besten.

Wallufer". Von zartzitronengelber Farbe mit weinroter Mitte.

"Wallufer Kabinett". Frisches Hellkarmin mit breitem, hell-farbenem Rand. Gedrungener Wuchs, lange, straffe Blüten-

"Winkler". Die kerzengeraden, festen Blütenstiele tragen festgeschlossene, tadellose Blumen von einfarbig weich rosenroter Farbe. Lichtgelbe Spitzen.

Obige Sorten Rheingauer Gaillardien kosten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

"Maxima". Dunkelorangerot mit klarem goldgelbem Rand. Grossblumig und regelmässig gebaut.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

"Perfection". Der orangerote Mittelring ist von einem breiten, dunkelgelben Rand umgeben, gedrungen wachsend und reichblühend. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Gaillardien-Hybriden,

Pflanzen aus Samen gezogen, kosten in starken Freilandpflanzen 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Galega officinalis compacta, eine im Sommer reichblühende Schmuck- und Schnittblumen-Staude mit zahlreichen Rispen von lilafarbenen Schmetterlingsblumen, 80 cm

1 St. M 0,35, 10 St. M 3.-" officinalis compacta alba, eine weissblühende Form der vorig. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

F Gentiana acaulis (Enzian). Der Enzian ist eine beliebte Frühjahrsblume mit grosser, glockenförmiger Blüte von tief gesättigt blauer Farbe. Auf Felspartien und zu Einfassungen sehr zu empfehlen; 15 cm. April-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

F Geum atrosanguineum fl. pl. (Nelkenwurz). Eine sommerblühende Staude, deren zierlich lockere Blütenstände aus halbgefüllten, schöngeformten leuchtendroten Blumen gebildet sind. Leichte Winterdeckung.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4.— Heldreichi, die leuchtend ziegelroten Blüten erscheinen im Mai-Juni. Für Felspartien und als Einfassungspflanze. empfehlenswert 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Heldreichi magnificum. Die in grosser Zahl im Juni erscheinenden Blumen haben eine hellorange Färbung. Das grosse üppige Laub und die bis 4 cm im Durchmesser haltenden Blumen machen diese Sorte als Rabattenpflanze wertvoll 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Geranium (Storchschnabel).

Die Storchschnabelgewächse eignen sich besonders für halb-schattige Plätze und als Vorpflanzung vor Gesträuch.

Geranium Endrewsi, etwa 40 cm hoch werdend, blüht dieselbe überreich, rein violettrosa. Juni-Juli.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4. grandiflorum hat dunkelviolettblaue grosse Blumen, sehr reich- und frühblühend. Juni-Juli.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5.—
sanguineum album. Eine weisse Abart unseres wilden
Geranium sanguineum. Blüht fast den ganzen Sommer von Anfang Juni ab. Für Felspartien.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Gillenia trifoliata, eine zirka 75 cm hoch werdende Pilanze, an mit einzelnen Blättchen besetzten Blütenstielen schneeweisse Blütchen tragend. Juli . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Gunnera scabra wird 2-3 m hoch und ist dann mit ihren riesigen Blättern eine der wirkungsvollsten Blattpflanzen. Die Pflanze muss im Herbst abgeschnitten und gegen Frost und Nässe gut geschützt werden. 3-4jährige starke Pflanzen.

St. M 1,50-3,50 F Gypsophila cerastioides, niedrigbleibende Felsenpflanze mit . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 reinweissen Blüten . . .

paniculata (Schleierkraut), bildet einen ausgebreiteten, grossen Busch von feinen, weissen Blüten und zeichnet sich durch grosse Leichtigkeit des Wuchses aus. 75 cm. Juni-Juli. Wertvoll für Binderei 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

paniculata flore pleno. Das gefüllte Schleierkraut ist eine der wertvollsten Neuheiten seit langen Jahren. Die schier unglaubliche Fülle der reinweissen, dichtgefüllten Blütchen macht die Pflanze zu einem Bild anmutiger Schönheit. Auch als Schmuckstaude für Rabatten und in Parks 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,geeignet

repens. Das Schleierkraut der Berge. Lockere rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weissen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern,

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 repens monstrosa. Eine starkwachsende, auf dem Boden au liegende Abart. Die stark verzweigten Blütenstiele bringen im Mai-Juni eine Unmenge kleiner Blüten zum Vorschein und bilden dadurch einen duftigen Schleier. Wirkungs-voll zwischen grossen Felsen, wo si h die Blütenzweige ausbreiten können 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

repens rosea. Die zierlichen Blütchen dieses Schleierkrautes sind zartrosa. Ganz vorzüglich für Felspartien und Trockenmauern 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Helenium (Sonnenbraut).

Helenium autumnale "Gartensonne". Neu! Der Flor dieser neuen Abart beginnt schon 2 3 Wochen früher als die nachfolgenden von Ende August bis zum Herbst. Um die samtbraune Mitte leuchten die goldgelben Blütenblätter.

1 St. M 0,75 10 St. M 6,-



Helenium-Blüten.

Helenium autumnale ,,Riverton Beauty". Neu! Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terrakotta durchflossen, später in goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 1 m Höhe. Mitte August bis Oktober . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

autumnale "Riverton Gem". Neu! Ein Gegenstück zur vorstehenden, in rein zitronengelb mit schwarzpurpurner kegelförmiger Scheibe, aber höher wachsend von 1 m bis 1,50 m. August bis Oktober . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

autumnale superbum ist eine hohe, herbstblühende Staude mit Dolden goldgelber, grosser Blumen, $1-1^{1}/_{2}$ m August-September. . 1 St. \mathcal{M} 0,50, 10 St. \mathcal{M} 4,—, 100 St. \mathcal{M} 35,—

Bigelowi. In grosser Menge tragen die langen zierlichen Stiele je eine der edel- und weichgeformten Blumen von klar goldgelber Farbe und schwarzer Mitte. Eine vorzügliche Schnittblume für die Monate Juni-Juli, 60-80 cm 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

pumilum magnificum. Die Blüten sind blendend rein goldgelb in weicher, edler Form und ihre Ueberfülle macht die Pflanze besonders wertvoll. Auch lässt sie sich mit Leichtigkeit vor der Blüte verpflanzen. Für Fernwirkung etwa vor Koniferen-Gruppen von besonderem Wert. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

F Helianthemum (Felsröschen).

Die Spielarten umfassen eine reizende Zusammenstellung immergrüner, kriechender Felspflanzen in den verschiedenfarbigsten, Unschätzbar für trockene Lagen und teils gefüllten Blütchen. Felsgruppen.

Helianthemum amabile fl. pleno. Die dichtgefüllten roten Blumen erscheinen im Mai bis zum Herbst.

mutabile aurantiacum plenum, kupferfarbig braun gefüllt. " coccineum plenum, braunrot gefüllt.

rotundifolium, stumpfes karminrot.

Venus. Dichtgefüllt gelb.
Victory plenum, karminrosa gefüllt.

Obige Sorten: 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Heliopsis comp. floribunda (Sonnenauge). Der gedrungene Wuchs und die dunkelgoldgelben Blumen in reicher Zahl machen diese neuere Sorte besonders wertvoll Aug.-Sept. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

scabra major. Vom Spätsommer bis tief in den Herbst hinein erscheinen die schönen edelgeformten Blumen von orangegelber Farbe. Vorzüglich für Schnittzwecke..

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Helleborus niger (Christrose), die grosse weissblühende Christrose blüht im Freien bei etwas mildem Wetter zu Weihnachten und hält die Blütezeit bis Februar.

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,— 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50 Reich blühbare Klumpen . Hybriden. Die buntfarbigen Christrosen blühen im Freien im Februar in vielen Farbenschattierungen und Zeichnungen. Im kühlen Zimmer gehalten, bei 5—6°R. werden die Farben klar und rein 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Ausdauernde Sonnen= blumen=Arten.

Harpalium rigidum Ligeri ist eine sehr wertvolle neue Bereicherung der Sonnenblumen und eine der schönsten mit sehr edlen, grossen hellgelben Blumen in langstrahliger

- Miss Mellish. Die Blüten sind grösser als die der Stammform, von kräftigem Wuchse. 120 cm.
- praecox, blüht einige Wochen früher, als die vorhergehenden mit grossen, schwefelgelben Blumen und gelber Mitte. 80 cm.

Alle Sorten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—.

Helianthus laetiflorus (syn. Harpalium rigid. semipl.). Die zahlreichen dünn- und langgestielten Blüten sind halbgefüllt von gesättigt tiefgelber Farbe. Blüht später als Harpalium rigid. Aug.-Septbr. 120 cm.

- multiflorus maximus. Die kräftig wachsende Pflanze ist mit einer Fülle von grossen, edelgeformten, tief-gelben Blüten bedeckt. 1,50 m. Juli-September.
- Meteor, sehr schön, halbgefüllte Form. 150 cm.
- microcephalus, bildet einen sehr kräftigen Busch, der dicht bedeckt ist mit unzähligen, dünn- und langgestielten, edelgeformten, schwefelgelben Blüten, die wie einfache Dahlienblüten aussehen.
- mollis, an Stielen und Blättern weich behaart; mit grossen. schwefelgelben Blumen. September.
- multiflorus grandiplenus (Soleil d'or) ist eine Spielart der vorigen, in der statt der krausgefüllten Mitte die Blumen-blätter alle wie bei einer Kamelie regelmässig dachziegelförmig übereinanderliegen.
- salicifolius. Bis zu 2 m hochwachsend mit weidenartigen hängenden Blättern. Prächtige Einzelpflanze. Septbr.-Okt.
- strumosus, bildet schlanke, hohe Stiele mit schwefelgelben Blüten. 120 cm.

Sämtliche Helianthus kosten:

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-



Helianthus

Hemerocallis (Tag-Lilie).

(Auch im Halbschatten gut gedeihend.)

Hemerocallis aurantiaca major, besonders grossblumig, leuchtend orangegelb 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

- citrina ist eine seltene, schöne Species, aus China stammend. mit langgestreckten, lichtzitronengelben Blüten, die in Aufeinanderfolge bis zu 30 Stück an einem Blütenstand erscheinen. 70–80 cm. Juli. 1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—
- disticha fl. pl. mit gefüllten bronzegelben Blüten. 75-100 cm. August 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- flava. Die Blütenschäfte von 75 cm Höhe tragen an ihrer Spitze je 5—6 der goldgelben, kelchförmigen Blüten, leicht herunterhängend mit köstlichem Duft. 70 cm. Mai-Juni 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,—
- " major. Aus einer Kreuzung von flava mit aurant. major. Schlank und hochwachsend wie flava mit sehr grossen, goldgelben Blüten. 60—80 cm. Juli. 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—
- fulva, orangegelb, ohne Geruch. 75 cm. Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- luteola ist eine Hybride zwischen H. Thunbergi und Hem. aurant. major, der Blütenstand trägt nacheinander 6-9 grosse, zitronengelbe Blumen. Eine prachtvolle Art. 70 cm. Juli. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- Thunbergi, eine starkwachsende Art mit grossen, reinschwefelgelben Blumen auf 75 cm hohen Stielen. Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

F Heuchera (Purpurglöckchen).

Heuchera brizoides gracillima. Diese Heuchera-Hybride blüht ununterbrochen in unzähliger Menge mit feinverzweigt. Blütenrispen von zartrosa Färbung mit rosa Karminspitzen, auf langen, drahtartig dünnen Stielen 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
brizoides gracillima "Girandole". Eine kräftiger wachsende
Abart der vorigen mit frisch karminrosa Blüten.

"Flambeau" ist eine sehr schöne Neuheit mit zahlreichen remontierenden, grossblumigen Rispen, glänzend rosaviolett auf 50-60 cm langen Stielen. Juni-August. Panorama. (Neu.) Die karminrosafarb. Blüten stehen auf

straffen Stielen über kräftigem, marmoriertem Laubwerk. "Pluie de feu". (Neu.) Grosse, verzweigte Blütenstiele bringen leuchtendrote Blüten. 40 cm. Juni-Juli. "Rubis". (Neu.) Grossblumig karminrosa. 60 cm. Blätter stark marmoriert.

hybrida "Edge Hall". (Neu.) Auf straffen, hohen Stielen erscheinen im Mai-Juni die schönen hellrosa Blüten. Jede der 6 neuen Sorten kostet: 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

hybrida "Zabeliana". (Neu.) Eine sehr straff wachsende Hybride mit schönen karminrosafarbigen Blütchen und festem Laubwerk, sehr reichblühend. 50–60 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,— sanguinea. Aus dem niedrigen Blattbusch erheben sich zahl-

reiche Blüten, die eine auf hartem, dünnem Stiele ruhende Traube aus kleinen Röhrenblüten von wunderbar schöner, karminroter Farbe bilden. 30 cm. Mai-Juli. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,sanguinea alba mit weisslichen Blütenrispen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,sanguinea grandiflora maxima mit leuchtendroten Blütchen auf festen straffen Stielen. Diese Varietät ist eine bedeutende Verbesserung von H. sanguinea. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

F Hepatica (Leberblümchen).

Die Leberblümchen sind mit ihren allerliebsten blauen und rosafarbenen Blüten zu den lieblichsten Frühjahrsblühern zu zählen. Sie verlangen alle einen schattigen Standort.

Hepatica angulosa, Blumen sehr gross, von schön hellblauer Farbe... 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,— triloba, blau...... 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

" alba, weiss.

rubra, rot. fl. rubro pleno mit rosarot dichtgefüllter Blüte.

Sämtliche 3 Sorten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,-Alle Hepatica blühen im März-April und werden nur 15 cm hoch.

Heracleum Mantegazzianum (Bärenklau). Riesenblattpflanzen mit grossen, weissen Blütendolden, für grosse Parks als . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Einzelpflanze

Hesperis matronalis alba plena (Nachtviole). Die weissgefüllten Blüten erinnern an Levkojen und sind wie diese, wohlriechend .

wohlriechend 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 **Hieracium rubrum** (Habichtskraut) hat leuchtend orangerote
Blüten. 30 cm 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 F Horminum pyrenaicum (Drachenmaul). Die quirlständigen Lippen-

blüten sind purpurlila. Juni. . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-F Houstonia coerulea bildet niedere runde Pflanzen, die übersät

sind mit reizenden hellblauen Blütchen.

coerulea alba hat die gleichen Eigenschaften der vorigen mit weissen Blümchen. Beide Sorten blühen im Mai und kosten 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— F Hypericum lysimachioides (Hartheu). Kleiner Halbstrauch mit

endständigen gelben Blüten. Verlangt Winterschutz.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,polyphyllum, eine reizende Staude für Felspartien mit goldgelben Blüten 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

F Iberis (Schleifenblume).

Wertvolle anspruchslose Pflanzen für Felspartien, Einfassungen, Trockenmauern etc. sind alle unsere Schleifenblumen-Arten. Sie blühen ausserordentlich reich im Mai-Juni. Zu grösseren Trupps auf Felsenanlagen angepflanzt, bieten sie während ihrer Blüte breite Blütenkissen vom schneeigsten Weiss. Schön auch zum Ueberhängen an Mauern.

Iberis corifolia. Eine ausgezeichnete Felsenpflanze.

sempervirens grandiflora hat besonders grosse, reinweisse Blütendolden,

Iberis sempervirens flore pleno. Die Blütchen sind gefüllt und bilden ein geschlossenes, weisses Blütenkissen.

sempervirens "Perfection" mit sehr schönen blendend weissen Köpfen.

sempervirens "Schneeflocke" mitsehr grossblumigen, schneeweissen Blütenköpfen.

Jede der obigen Sorten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Incarvillea (Freiland-Gloxinie).

Incarvillea Delavayi. Eine winterharte, knollenbildende Pflanze aus China, die in grossen, rosafarbenen, trompetenartigen Blumen in Büscheln auf hohen Stielen blüht. 70 cm. Mai bis 1 St. M 0,50, 10 St. M 4.—

grandiflora. (Neu!) In allen Teilen schöner als Incarvillea Delavayi. Die Blüten haben fast die doppelte Grösse und auch ihre Farbe ist viel leuchtender purpurrot.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Inula glandulosa (Alant) ist eine Composite aus dem Kaukasus mit prächtigen, 10—12 cm grossen, fedrighängenden, goldgelben Strahlenblüten. Die Pflanze ist sehr reichblühend. 50 cm. Mai-Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Mai-Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— **glandulosa laciniata.** Die fedrigen goldgelben Strahlenblüten sind fein geschlitzt. . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Iris siehe nächste Seiten.

Lathyrus latifolius albus, eine für den Blumenschnitt unersetzliche Staude, mit grossen, rein weissen, in grosser Anzahl erscheinenden Schmetterlingsblüten in zierlicher, einseitiger Aehrenform. Wuchs rankend, bedarf der Stütze. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

F Leontopodium alpinum (Edelweiss). Das bekannte Edelweiss ist im Garten im sandigen Boden bei Vermeidung jeglichen Düngers leicht zu kultivieren, nur erreichen die Blüten nicht die ganz reinweisse Farbe wie in den Alpen. Die Blätter sind silbergrau. Die Blüten erscheinen sehr zahlreich und sehen in ihrer weich seidenartigen Umhüllung reizend aus. 15 cm. Juni-September . . 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

sibiricum (Sibi-Edelweiss). risches widerstandsfähigere Sorte, wird grossblumiger als das Edelweiss der Alpen. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Liatris (Prachtscharte).

Prächtige Schmuckstauden, deren Blütenkerzen auf rundbeblätterten Stielen aufgesteckt sind und die auf Blumenrabatten und an Wasserrändern vorzüglich wirken und als Schnittblumen besonders dekorativ sind. Sie bilden trockene winterharte Wurzelknollen.

Liatris callilepis trägt auf straffen, 60-80 cm hohen Stielen, kräftig leuchtende, karminrosa Blütenwalzen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- pycnostachya. Die über einen Meter hohen, purpurrosafarbenen Blütenkerzen wachsen in leichter Schlangenwindung. August-September, 1 m. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- pycnospica (G. u. K.). Eine reizende Neuheit aus der Kreuzung von spicata mit pycnostachya, nur mittelhoch mit straffem Wuchs und rings um den Stiel straff strahlenförmig rund abstehenden Lanzett-Blättern und dichten lila-rosafarbenen Blütenähren. 80—100 cm. Juli-August 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- spicata mit nur 50 bis 60 cm hohen lilarosafarbenen Aehren.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Ligularia speciosa ist eine hochwachsende Staude zur Einzelpflanzung mit blaugrünem Laub und gelben Blütenrispen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

F Linaria Cymbalaria globosa. Dichte kugelige Büsche bildend mit kleinen lila Blütchen. Vorzügliche Pflanze für Felspartien und Trockenmauern . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

F Linum arboreum. Aus dem kurz gedrungenen Busche blaubereifter Blätter erheben sich zahlreiche Blütendolden, getragen von festen, harten Stielen. Die Blumen sind reingoldgelb in weit offener Schlundform. Juni-August 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

F, flavum hat schlanke hellgelbe Blütendolden 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,—



Liatris-Blütenstiele.

Iris interregna.



Interregna-Iris-Sorten.

"Fritjof" (G. & K.). Domblätter klar hell-lavendelblau; hängende Blumenblätter samtig veilchenblau, prachtvoll edler Bau der Blume; Stiele hoch und schlank, 50—60 cm. Höhe der Blüte 12 cm, Petalenbreite 4½—5 cm.

"Halfdan" **(a)** (G. & K.). Einfarbig hellcremegelb ist die ganze Blume, deren stofflich feste Blumenblätter die edelste, vollkommene Irisform bilden, die sich auch in der Sonne bemerkenswert gut hält. Stiellänge 40—50 cm, Höhe der Blüte 9-10 cm, Petalenbreite 41/2 cm.

"Helge" (G. & K.). Licht zitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern in vollkommener, feiner Form. Höhe der Blüte 10 cm. Petalenbreite $4^{1}/_{2}$ –5 cm. Blütenstiellänge 40–50 cm.

"Ingeborg"
noch in allen ihren Vorzügen, ist grösser in der Blume, klarer im Weiss und hat den orangefarbenen Bart als Honigmal nicht stark vortretend wie bei "Ivorine", so dass der Eindruck der reinweissen Blume nicht gestört wird. Blütenhöhe 12—13 cm. Petalenbreite 5 cm. Blütenstiele 40—50 cm.

,, Walhalla" (G. & K.). Die oberen Domblätter sind lilalavendelblau, während die hängenden Blumenblätter samtig
weinrot sind. Die Blume ist prachtvoll gebaut. Blütenhöhe
10—11 cm. Petalenbreite 4½—5 cm. Blütenstiele 40—50 cm.
Jede der 5 Sorten kostet:

1 Stück M 0,90, 10 Stück M 8,-, 100 Stück M 75,-

Um einen sicheren Blütenerfolg mit Iris oder Schwertlilien im ersten Jahre zu haben, ist es ratsam, die Pylanzen bereits im zeitigen Herbst zu pflanzen.

Eine neue Iris=Rasse!

Es ist uns gelungen, aus der Kreuzung der Iris pumila-Hybriden mit den feinsten Sorten der Iris germanica eine neue Rasse zu züchten, die die Blütezeit zwischen lris pumila und Iris germanica ausfüllt, auch in ihrem halbhohen Wuchs eine Zwischenform zwischen beiden darstellt, während ihre prachtvollen Blumen in edler Form und Grösse selbst von den schönsten Iris germanica nicht übertroffen werden. Diese neue Rasse stellt also eine wunderbare Vereinigung der edlen grossen lris-Blumen mit früher Blütezeit und halbhohem Wuchs dar.

Herr C. Foerster, Bornim bei Potsdam, schreibt uns

"Ihre Interregna-Iris erscheinen mir als Ihre grossartigste Einführung. Etwas ganz herrliches, an dem ich eine der grössten Freuden dieses Jahres hatte. Es ist eine Zukunftsrasse, die ihren Weg machen wird!"

"Gerda" (G. & K.) 1910. In Färbung zwischen "Halfdan" und "Helge" stehend, bildet diese Neuheit eine wertvolle Ergänzung zu den schon bekannten Sorten. Die Domblätter sind licht cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler in der Farbe mit goldgelber Aderung, in der Erscheinung Prachtblüten auf 40—45 cm langen Stielen. Höhe der Einzelblüte 12—13 cm, Petalenbreite $4^{1}/_{2}$ cm.

1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—



Iris interregna, den Wuchs der Pflanze während der Blütezeit zeigend.

Iris germanica. (Deutsche Schwe

Schwertlilien.)

Die unter diesem Namen vereinigten Spielarten sind keineswegs nur Formen von Iris germanica, sondern Blendlinge verschiedener Iris-Arten, die nur im Laub gleich, in der Blütenzeichnung aber grosse Verschiedenheit aufweisen, und so bieten denn die hier zusammengefassten Spielarten eine Musterkarte von Mannigfaltigkeit und reizender Zeichnung der Blütenfarben.

Wer die vollkommenen Formen der deutschen Schwertlilien gesehen, der muss die edle Schönheit bewundern, die aus jeder Blume spricht. Wie sich die zum Licht strebenden Blumenblätter zu einer Domkuppel zusammenfalten, den Blick ins Innere gestattend, und sich stützend auf die abwärts fallenden Blätter, und das alles durch Farbe, Licht und Zeichnung verschönt und durchflutet!

Eigene Züchtungen der letzten Jahre.

"Iriskönig" (G. & K.). Diese feinste Iris-Neuheit ist eine Kreuzung aus "Iris pallida dalmatica" mit "Maori King" und vereinigt die Vorzüge der ersteren, Schönheit und Grösse der Form, mit der Farbenwirkung der letzteren. Die herrliche Blume hat zitronengelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter samtig dunkelbraun sind, von breitem Goldrand um-

säumt. — "Iriskönig" ist bis heute die feinste Iris germanica.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-"Berchta". Die oberen Blumenblätter sind sandfarben, die unteren blauviolett mit vertuschtem, sandfarbenem Rand 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-"Fro" siehe Neuheiten Seite 6.

"Gajus". Der Dom der Blume ist rein lichtgelb, die unteren Blätter sind gelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert, in sehr klarer reiner Farbe und reiner Zeichnung. Reichblühend wie Gracchus, aber grossblumiger und noch edler als diese. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-"Lohengrin" siehe Neuheiten Seite 6.

"Loreley". Von den unteren Blättern, die tief ultramarinblau mit creme Aderung und lichtgelb gerändert sind, heben sich die lichtgelben oberen Blumenblätter in scharfer Farbenwirkung ab, doch schliessen sie sich nicht kuppelartig zusammen.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-"Mimung". Neuheit G. & K. 1911. Von reiner hellblauer Farbe sind die edelgeformten grossen Blumen und blühen frei über dem hellgrünen Laubwerk. Für Gruppen der reichen Blüte und des gleichmässigen Wuchses wegen sehr geeignet 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-"Mithras" siehe Neuheiten Seite 6.

"Nibelungen" (G. & K.). Domblätter olivenfarben mit schwefelgelbem Anflug; Hängeblätter tief purpurviolett mit getuschtem cremefarbenem Rand; Höhe der Blüte 12 cm, Petalenbreite $5\frac{1}{2}$ cm 1 St. \mathcal{M} 0,75, 10 St. \mathcal{M} 6,—

"Pfauenauge". Der Dom ist rein olivengelb, die unteren Blätter in auffallendem Farbengegensatz dazu bräunlich pflaumfarben mit scharf sich abhebendem, oliven-.... 1 St. M 0,75, 10 St. M 6, gelbem Rande

"Prinzess Viktoria Luise" siehe Neuheiten Seite 6.

"Rhein-Nixe" siehe Neuheiten Seite 6.

"Thora" (G. & K. 1910). Nach jahrelanger Beobachtung empfehlen wir diese neue

Iris germanica wegen ihrer überschwenglichen Reichblütigkeit, ihres niederen Wuchses und ihrer späten Blütezeit der besonderen Beachtung. — Obwohl die Einzelblüte nicht die Grösse unserer letztjährigen Neuheiten erreicht, ist doch der Gesamteindruck der leuchtend blauen Massenblüte so bestechend, dass unserer Ueberzeugung nach dieselbe eine Gruppensorte I. Ranges werden wird. — Domblätter: lichtblau; Hängeblätter purpurviolett. Höhe: 50 cm 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Die feinsten "Iris germanica".

Die feinsten rosafarb. Iris für den Blumenschnitt.

*,,Her Majesty." Grosse edle Blume von vollendeter Form und reiner rosa-lila Färbung.

*,,Queen of May." Die rosalila Blüten stehen auf schlanken hohen Stielen.

"Mad. Pacquette", glänzend rosig weinrot mit gewellten Blumenblättern und sehr feinem Duft.

*,,Trautlieb" hat die zarteste, reinrosa Färbung, nach der Mitte weiss abgetönt.

Die besten Iris in gelben Farbentönen.

*, Maori King" ist die schönste der dunklen Iris. Die Kuppel ist tief goldgelb und die hängenden Blätter schwarzsamtbraun mit leuchtend goldgelbem Rande eingefasst. "Aurea", rein goldgelb.

** "Darius", chromgelb mit lilablau, blassgelb gerändert und weiss geadert.

**, Gracchus", zart blassgelb mit rot, netzartig geadert, niedrig, eine der reichstblühendsten.

**, Mars." Hochgebaute Blume, deren oberer Dom hellgelb und deren untere Blumenblätter mattgelb mit rotvioletten Flecken und Adern sind.

*,,Mrs. Neubronner", rein goldgelb, auf den unteren Blättern leicht weiss geadert.

Die schönsten licht-lilablauen Iris.

**, ,Mad. Chereau" ist eine der feinsten Züchtungen in der ganzen Erscheinung. Schlanke hohe Stiele tragen edelgeformte Blumen, die auf milchweissem Untergrund feine licht-lilablaue Randzeichnung haben.

*** "Lord Seymour", weiss mit hellila getuscht, sehr zarte Farbe

in grosser Blume.

*,,Mrs. Reuthe." Die edle langgestreckte Blume ist in der Kuppel zartlilablau und in den Hängeblättern wachsweiss mit zartlila geädert.

Hellblaue und blaue lris.

- **,,Macrantha", eine wahrhaft riesenblumige asiatische Art. violettblau.
- *Pallida "Prinzeß Beatrice", grossblumig mit lavendelblauer Kuppel, während die Hängeblätter violetten Anflug haben.

** Pallida racemosa ist durch ihre besonders frühe und reiche Blüte wertvoll; dunkellavendelblau.

Rein dunkelblaue Iris.

* "Atropurpurea", dunkelblau.

"Spectabilis", sehr früh, mit Iris florentina zusammenblühend, reindunkelblau mit weinrotem Anflug.

Fortsetzung Seite 35.

Iris germanica (Fortsetzung).





Die feinsten "Iris germanica" (Fortsetzung).

Eine Auswahl schönster weisser Iris:

- * Ivorine. Aus einer Kreuzung mit frühblühenden Iris hervorgegangen, blüht diese wertvolle Neuheit noch vor Iris florentina. Die prächtigen grossen Blumen sind rein elfen-
- ** Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiss, an den unteren Blumenblättern leicht violett geadert, sehr reichblühend und
- * Albicans, elfenbeinweiss, grossblumig.
- ** Bridesmaid, weiss mit lavendelblau, untere Petalen genetzt und gefiedert mit rötlich lila; sehr reichblühend.
- Florentina ist nächst spectabilis die frühestblühende der zur Iris germanica-Klasse gehörenden Iris. Die zahlreichen Blumen sind gross, weiss, innen perlmutterfarben schimmernd.
- 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-** L'Innocence, seidenweiss, netzartig geadert, mit purpur

Verschieden- und mehrfarbige feinste Iris:

* Conscience, olivefarben, die hängenden Blumenblätter dunkelweinrot, leicht geadert.

- * Contraste. Kuppel hellavendelblau, untere Blätter dunkelschwarzsamtblau.
- ** Dalmarius. Eine Kreuzung von dalmatica mit Darius. Die grossen Blumen haben zarthellblauen Dom, in den unteren
- Blättern dunkler mit violettbraun geadert.

 * Hector, aufrechte Blumenblätter gelb, hängende braunrot mit
- * Lord Beaconsfield, aufrechte Blumenblätter hell zitronengelb, hängende Blumenblätter dunkelweinrot.
- * Magnifica. Rötlich olivefarben ist der Dom der Blume, während die hängenden Blätter dunkelsamtbraunrot sind.
- * Madame Patti, die oberen Blätter sind blass-schwefelgelb, die hängenden rosarot.
- Penelope, aufrechte Blumenblätter durchsichtig weiss, violett gesprenkelt, hängende Blumenblätter weiss, netzartig geadert.
- * Perfection, lavendelblau, hängende Blumenblätter reich samtig ultramarin.
- Squalens Arnols. Die hochgebaute Kuppel der Blume ist rosig-bronzefarben; die unteren Blätter samtig-violettbraun.
- ** Variegata de Berghi. Der Dom der Blume ist hell-
- gelb, die Hängeblätter schwarzpurpur mit hellgelb gerändert. Viola. Die sehr grosse Blume hat rosalilafarbene Kuppel und tiefviolette Hängeblätter.

Die mit einem * bezeichneten Sorten kosten: 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-.

Die mit zwei ** bezeichneten Sorten kosten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-.

Aeltere Sorten: Alberti, Alvaris, Chenedole, Comelie, Elisabeth, Hannibal, Incomparabile, Julius Cäsar, Marie, Miss Maggie, Mystlère, Rigolette u. andere . . 10 St. M 3,—, 100 St. in 5—10 Sorten M 25,—

Iris pumila=Hybriden (eigene Züchtungen) und Zwerg=Iris.

Langstielige Sorten.

Iris pumila hybr. citrea. Der hohe schlanke Dom der Blüte ist lichtgelb und die breiten Hängeblätter zitronengelb mit leuchtend goldgelbem Bart. Der Stiel ist 25—30 cm lang. pumila hybr. formosa. Die 30 cm langen Blütenstiele tragen

zuweilen je 2—3 Blumen. Die aufrechten Blütenblätter sind rein dunkelveilchenblau, die fallenden penseeviolett.

Obige Sorten: 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 22,50

pumila hybr. excelsa. Vollkommen in edler Blütenform und in reiner Farbe. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüte von ganz reiner, reich ockergelber Farbe.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—
pumila hybr. florida. Eine äusserst reichblühende Form von
tadellosem Blütenbau und von zitronengelber Farbe; die
hängenden Blätter sind etwas tiefer im Farbenton mit feinen
Adern 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Kurzstielige Sorten.

Iris pumila hybr. compacta. Die reichblühendste und niedrigste der Iris pumila-Hybriden. Der Dom der Blume ist veilchenblau und die Hängeblätter sind schwarzblau.

pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigt tief ultramarinblau mit schwarzblausamtenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Wegen ihrer reichen Blüte und intensiven Farbe zu Frühlingsgruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen.

" pumila hybr. eburna. Die aufrechten Blätter sind reinweiss, die hängenden weiss mit creme Schattierung gegen den Schlund;

der Bart ist cremefarben.

Obige drei Sorten kosten: 1 St. M 0,25,10 St. M 2,-,100 St. M 15,-



Iris pumila hybrida cyanea als Einfassung in unseren Anlagen.



Iris pumila hybrida. (Eigene Züchtungen.)

Eigene Neuzüchtungen.

Abbildungen und Beschreibungen siehe Neuheiten.

Iris pumila hybrida "floribunda"

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Iris pumila hybrida "Schneekuppe"

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Die Iris pumila-Hybriden ergeben die besten Farbenflächen im Frühling.

Diese Iris sind eine wertvolle Bereicherung der Frühlingsblumen. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Iris pumila mit Iris germanica, und während einige von ihnen auch im Wuchs das Iris germanica-Blut erkennen lassen, zeigen andere mehr den Iris pumila-Habitus; alle aber haben solch edle, vollkommene Blütenform, wie sie den Iris pumila nie eigen war. Besonders schön ist bei einigen die von den aufrechten Blumenblättern gebildete hohe Domkuppel. — Die Blumen haben einen süssen Duft und einige einen Stiel bis zu 30 cm Länge. Sie blühen nur einige Tage später als die ersten pumila und werden sich daher besonders wertvoll auch zur Blumentreiberei erweisen.

Die Zwerg-Frühjahrs-Iris.

Die gesamten Zwerg-Iris sind vorzügliche Einfassungspflanzen.

Iris pumila atroviolacea, tiefviolettblau.

- " coerulea, hellblau.
- " velutina, dunkelblau.

Jede von den obigen Sorten kostet: 1 St. M 0,20, 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—.

Leuchtende Farbenwirkungen,

selbst auf grosse Entfernungen hin, sind von überraschender Wirkung bei Durchblicken vom Hause oder von Spaziergängen aus. Man pflanzt derarlige Gruppen einer Farbe vor Gehölzhintergrund, ohne dabei etwa ein regelmässig geformtes Beet anlegen zu wollen. Es eignen sich dazu für Frühjahrsblüte: Primeln, Frühjahrsphlox; für Sommer: Türkischer Mohn, Rittersporn, Gaillardien, Fingerhut; für Herbst: die prächtigen Herbst-Phlox, Helianthus, Gladiolen, Herbst-Astern und Anemonen.

Verschiedene Iris=Arten.

Die auf dieser Seite mit † verschenen Iris-Sorten können ausser auf Blumen-Rabatten auch an feuchten Ufern von Gewässern prachtvoll verwandt werden, nur darf der Wasserspiegel — ausser bei Iris Kaempferi — nicht bis über der Wurzelkrone stehen. Siehe auch unter Wasserpflanzen (Nymphaeen) Seite 62.

Iris graminea, eine niedrig wachsende Art. Die Blüten haben reizende Zeichnung von blauer, weisser und purpurner Farbe und einen aprikosenartigen Duft. 30 cm. Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Kaempferi. Diese herrlichen, grossblumigen, japanischen Iris verlangen während des Wachstums viel Feuchtigkeit und sind vorzüglich an Wasserrändern zu verwenden und können während des Sommers bis über die Wurzelkrone mit Wasser bedeckt stehen.

1 St. *M* 0,70, 10 St. in 1—10 Sorten *M* 6,—
100 St. in 5—15 Sorten *M* 50,—

† " ochroleuca gigantea. Eine der feinsten und auffallendsten Iris von hohem, kräftigem Wuchse mit schwerem, breitem Laube und grossen, reinweissen Blüten auf kräftigen Stielen. Ende Juni-Juli:

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

- ochroleuca gigantea sulphurea (G. & K.).

 Eine lichtschwefelgelbe Abart der vorigen, deren Blüten die erstere in Vollkommenheit der Form übertreffen. Ende Juni-Juli 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,—
- † " Monnieri ist im Wuchs der vorigen ähnlich, hat aber leuchtend goldgelbe Blüten. Ende Juni-Juli.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

† " Monspur hat ebenfalls den prächtigen Wuchs der Iris ochroleuca und die gleiche Blütenform, aber in herrlich lichtblauer Farbe. Ende Juni-Juli.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

† " Pseud-Acorus. An Bächen und Teichen wild vorkommende gelbblühende Wasserschwertlilie.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

pallida variegata ist eine der schönsten, buntblätterigen, dekorativen Pflanzen. Die breiten Schwertblätter sind leuchtend silberweiss und goldgelb gestreift und halten diese frische Färbung auch in heissen Sommertagen. Die Blumen sind gross und hellblau.

1 St. M. 1,-, 10 St. M 9,-

† " sibirica, von schlankem, hohem Wuchs mit feinen, hellblauen Blüten, deren je drei auf einem Stengel stehen. 60 cm. Mai-Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—



Blütenform der hohen Iris ochroleuca, Monnieri und Monspur.

† Iris sibirica alba, wie die vorige, mit lichten, reinweissen Blüten. Für Binderei empfehlenswert.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

† " sibirica orientalis, von schön tiefblauer Farbe mit leichter gelb, schwarz und weisser Zeichnung auf den äussern Blumenblättern. 50 cm. Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- † " sibirica "Snow Queen" ist eine neue Varietät mit grossen, elfenbeinweissen Blumen auf 60 cm hohen, schlanken Stielen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
 - " **Statellae**, frühblühend, hellschwefelgelb auf langen Stielen. 1 St. *M* 0,35, 10 St. *M* 3,—

Der Rand der Gehölzgruppen

ist zur Anpflanzung der Stauden des schönen Hintergrundes wegen vornehmlich geeignet, aber die Pflanzung sei weit genug vorgeschoben, damit jede Staude genügend Luft und Licht erhält, dass sie sonnig und frei aufwachsen kann. Der Boden sei vorher sorg fältig gegraben und gedüngt. Alles das ist notwendig, soll der Erfolg nicht kümmerlich sein.

Lilien.

Eine geschmackvolle

Staudenanpflanzung

gibt dem Garten Blütenbilder, die immer wechselnd, immer neues bietend, immer Freude und Genuss für den sind, der Schönheit liebt.

Da die Lilienzwiebeln erst spät ausreifen, so pflanzt man dieselben erst von Ende Oktober bis Ende November oder zeitig im Frühjahr. Die Lilienzwiebeln werden, nachdem der Boden mit verrottetem Dünger gedüngt ist, ca. 10—20 cm tief je nach Grösse gelegt, in schwerem Boden weniger tief, auch tut man dann gut, Sand unter die Zwiebeln zu legen. Zum Schutze gegen Frost wird die Erdoberfläche mit Laub gedeckt. Man lasse die Lilien ungestört an ihrem Standorte, um so reicher blühen sie in jedem Jahre. Wir bieten in folgendem nur Sorten an, die in gewöhnlichem Gartenboden gut gedeihen.

Prachtvoll verwenden lassen sich die höher wachsenden Lilienarten in Rhododendron-Gruppen. Sie beleben im Juni, Juli dieselben von neuem. Auch zusammen mit Azalea mollis und pontica wirken sie durch ihre grossen Blüten.



Wir empfehlen folgende gute Gartensorten:

- * Lilium auratum, die japanische Goldbandlilie.
 - 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-
 - "Batemanni, mit prächtig rein-terrakottafarbenen Blumen. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
 - "Browni mit wundervollen, langen Trompeten, innen ganz weiss, aussen purpurbraun . 1 St. M 2,50, 10 St. M 24,—
 - " canadense ist eine der zierlichsten Lilien, die auf hohen, dünnen Stielen die leicht nickenden orangeroten Blumen trägt 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
 - candidum, die allbekannte schöne weisse Gartenlilie. Sollte auf keiner Staudenrabatte fehlen. Ebenso in Trupps für grössere Parks und Gärten. Zusammen pflanzen mit späten Tulpen. (Beste Pflanzzeit: Früh-Herbst)

 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—
 - chalcedonicum hat leuchtend scharlachrote Blumen. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—
 - " croceum (Feuerlilie) ist eine der härtesten und am stärksten wachsenden Lilien mit safranorangefarbenen Blumen. Für grössere Felspartien 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—
 - Szowitzianum (colchicum), ist eine der prachtvollsten, frühblühenden Lilien mit grossen, zitronengelben, innen schwarzbraun punktierten Blumen . . 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—
- #. lancifolium roseum (speciosum), eine wohlbekannte Lilie mit prachtvollen rosagefleckten, hellrosa Blüten.

- * Lilium lancifolium album mit reinweissen Blumen.
 - 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- *, lancifolium alb. "Krätzeri", die edelste, weisse lancifolium.

 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- *, lancifolium "Melpomene", reich karmesin, mit weiss gerändert 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- *, lancifolium rubrum, dunkler rot gefleckt als roseum.

 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- **, longiflorum, grosse, vorne weit geöffnete, reinweisse Trompeten 1 St. M 0,60, 10 St. M. 5,—
 - " pardalinum, orangegelb mit blutroten Flecken. 1 St. *M*. 0,60, 10 St. *M*. 5,—
 - testaceum ist eine ausgezeichnete Lilie von kräftigem Wuchs mit zart-aprikosenfarbigen Blumen. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—
 - " **tigrinum** (*Tigerlilie*). Wohlbekannte, rote gefleckte Lilie, die stark wächst und dankbar blüht. 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—
 - " tigrinum fl. pl., die gefüllte Tigerlilie.
 - 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-
 - tigrinum Fortunei, grossblumige, robust wachsende rot gefleckte Varietät 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
 - , **tigrinum splendens**, eine besonders leuchtende Form. 1 St. *M* 0,25, 10 St. *M* 2,—
 - Thunberg. aureum nigro-maculatum ist eine niedrige, reichblühende Lilie mit orangefarbenen Blumen mit schwarzen Flecken 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
 - , umbellatum incomparabile, orangefarbene Blumen mit blutrot marmoriert 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Lupinus (Lupine).

Alle Lupinen sind stattliche Schmuckstauden mit der schätzenswerten Zugabe, dass sie auch unter Bäumen im Halbschatten noch gut gedeihen.



Lupinus polyphyllus roseus.

Lupinus arboreus Schneekönigin ist eine wertvolle schneeweisse Varietät der baumartigen Lupine, die herrliches Blumenmaterial zum Schneiden liefert. Verlangt Winterschutz. 75-100 cm. Juli-August.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

polyphyllus albus ist durch seine Schäfte reinweisser Blütenähren hervorragend. Juli-August. 100 cm.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- polyphyllus Moerheimi, Neuheit! Die Blütenfarbe dieser Abart ist reinrosa mit weissen Flügeln. Eine gedrungen wachsende, 50—60 cm hohe Sorte. Vorzüglich für niedrige Gruppen geeignet . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- polyphyllus roseus. Eine prächtige Neuheit der ausdauernden Lupine, deren lange Blütentrauben von schöner, reinrosa Farbe sind. Echte Pflanzen, die geblüht haben. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- polyphyllus superbus mit hohen Schäften blauer Blüten-ähren. 100 cm. Juli-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Lychnis chalcedonica rubra plena (Brennende Liebe). Leuchtend scharlachrote, gefülltblühende, dichte Blütenköpfe werden auf 1 m hohen, straffen Stielen getragen. Eine prächtige Juli-August blühende Staude . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
 - Haageana, mit flachen, leuchtend karminroten, rosa und weissen Blüten 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
 - viscaria fl. albo pl. Die Blütenfarbe dieser gefülltblühenden Lychnisart ist reinweiss. Die grosse Reichblütigkeit und der ca. 40 cm hohe Wuchs machen die Pflanze für Gruppen und Einfassung als auch für Schnittblumengewinnung gleich wertvoll. Mai-Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
 - viscaria splendens fl. pl. (Pechnelke). Die gefülltblühende Pechnelke, eine sehr dankbar blühende Staude mit unzähligen Blütenähren von leuchtend magentaroter Farbe. 30 cm. Mai-Juni. Wertvoll für Fernwirkungen, aber auch als Einfassung um Staudenrabatten . 1 St. M 0,35, 10 St. M, 3,-

Malva moschata (Moschus-Malve). Die reichverzweigten Blütenstände mit den duftenden, rosafarbenen Blumen blühen 50 cm hoch im Juli-August. Sehr dankbar.

moschata alba ist die weisse Form der vorigen. Jede Sorte: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Marrublum Kotschyanum. Die kleinen lila Blütchen stehen in Quirlen an den Blütenstielen. Für trockene Lagen geeignet. 40 cm 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Megasea (Bergenia) hybrida (Riesen-Pracht-Steinbrech). Zwischen den grossen, lederartigen Blättern treiben die hohen Schäfte mit den prächtigen Blütendolden heraus, die in diesen Hybriden von rosa bis karmin- und purpurrot variieren und als früheste Frühjahrsblüher von März-April besonders will-kommene Schmuckpflanzen sind und als prachtvoll wirkende starke Einfassungspflanzen an Gehölz- oder Koniferen-Wegrändern, auch im Halbschatten, vorzügliche Verwendung finden. 50 cm. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Mertensia primuloides ist mit den enzianblauen Blüten eine reizende Staude für halbschattigen Standort. 15 cm. Mai. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

- Mimulus cupreus (Gauklerblume) hat orangerosafarbige Blüten und ist für feuchte Plätze vorzüglich geeignet. 20 cm. Mai-August 1 St. \mathcal{M} 0,35, 10 St. \mathcal{M} 3,
 - luteus X cupreus. Die ziemlich grossen Blumen sind leuchtend kupferig orangefarben und erscheinen bei feuchtem Standort vom Mai bis zum August in ununterbrochener Reihenfolge. Bei leichter Deckung hält diese Hybride vollständig im Freien aus. Eine recht angenehme Pflanze an Teichund Uferrändern, wie auch als Gruppenpflanze bei Vorpflanzungen am Gehölz . . . 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
- Monarda didyma (Rotmäulchen) ist eine jener schönen, alten Stauden, deren Schönheit lange in Vergessenheit geblieben ist. Auf 75 cm hohen blattbesetzten Stielen stehen in gefälliger, kranzförmiger Doldenform stufenweise übereinander die hochroten, löwenmaulartigen Blüten, die bei ihrer dichten Menge in Gruppenpilanzung eine perzielen. 50-60 cm. Juli-August.

 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
 - didyma violacea superba mit dunkelrotvioletten Blüten. 60 cm 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- Oenothera Eldorado (Nachtkerze) hat leichtgefüllte goldgelbe Blumen, die an den zahlreich erscheinenden Blütenstielen locker gestellt sind. Die Blüte ist eine lang andauernde 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,
 - glabra. Die leuchtende satt goldgelbe Blütenfarbe hebt sich wirkungsvoll von der bräunlichroten Belaubung ab. Durch die grosse Reichblütigkeit vorzüglich für Gruppen geeignet. 30 cm. Juni-Juli . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
 - missouriensis, mit grossen, glockenförmigen, schwefelgelben Blüten, die in solcher Fülle erscheinen, dass, obwohl jede Blüte nur einen Tag hält, die Pflanze doch stets in vollem Schmucke dasteht. 30 cm. Juni-Oktober.
 - speciosa mit grossen rein schneeweissen, schalenförmigen Blüten von süssem Wohlgeruch. 40 cm. Juli-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- Youngii. Prachtvolle, bis 50 cm hoch werdende Nacht-kerzenart mit goldgelben Blumen, in grossen Sträussen blühend. Zusammen mit dem Wermig-Veilchen angepflanzt von grosser Wirkung. Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- Omphalodes verna (Gedenkemein), eine Staude mit kriechendem Wurzelstock, deren Blumen dem Vergissmeinnicht sehr ähneln; sie sind jedoch grösser, von hellblauer Farbe mit weissem Schlund. Wertvolle Frühlingsblume. 10 cm. April-Mai 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 verna alba, eine weisse Abart der vorigen.


1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 Opuntien (Freiland-Kakteen). Die zur Ausschmückung von Stein-

partien so beliebten winterharten Freiland-Kaktus liefern wir in einer Auswahl bester Sorten.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Orobus vernus (Walderbse) blüht schon März-April mit purpurblauen Schmetterlingsblüten. 30 cm 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

varius. Die Schmetterlingsblumen, welche lachsfarbigrosa und gelb sind, erscheinen bereits im April. Die reizende Walderbse wird etwa 40 cm hoch. Selten! 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-




Die baumartigen Paeonien blühen etwas früher als die krautartigen, chinesischen, und zwar zur Pfingstzeit und bilden mit ihren holzigen Trieben im Alter mächtige Büsche. Aber auch die jungen Pflanzen tragen schon die Riesenblumen, die mit einem Durchmesser von 20—25 cm von überwältigender Grösse sind und, halb oder ganz gefüllt, mit ihren prächtigen Farbenschattierungen von weiss bis rot wahre Prunkstücke des Gartens bilden.

Als Winterschutz umbinde man die baumartigen Paeonien mit einer Hülle von Tannenreisig oder leichtem Packtuch, deren Spielraum aber weit genug sein und die so lange bleiben muss, bis den frühzeitigen Trieben im Frühjahr keine Gefahr durch Nachtfrost mehr droht. Diese Gefahr für die jungen Triebe ist grösser als diejenige des Winters für die junge Pflanze.

Werden die Pflanzen in Töpfen kultiviert, so brauchen solche nur anfangs Februar in ein mässig grosses Gewächshaus gestellt zu werden bei $10-15^{\circ}$ Celsius, und blühen sie dann 1-2 Monate vor der Blütezeit im Freien.



Einzelblüte der baumartigen, gefülltblühenden Paeonia.



Einzelblüte der einfachen neuen japanischen baumartigen Paeonien.

Gefülltblühende baumartige Paeonien

(Paeonia arborea).

Aus unserer grossen Kollektion bieten wir die folgenden an:

Bijou de Chusan, reinweiss mit zarter, fleischfarbener Schattierung, locker gekräuselte Form, niedrig und gedrungen wachsend.

Caroline d'Italie, zartlachsfarben mit creme; kräuselig, dichtgefüllte Schalenform.

Comtesse de Tudor, lebhaft lachsfarben, nach dem Rande zu seidenartig rosa, mittelgross, dicht gefüllt.

De Bugny ist ausserordentlich reichblühend in halbgefüllter Schalenform, reinweiss mit violettroten Streifen und leuchtend goldenen Staubfäden.

Emilia, lichtlachsfarben, flache Schalenform, dicht gefüllt.

Grossherzog von Baden. Leuchtendviolettrot, sehr dankbar blüh. Jeanne d' Arc. Zartlachsfarben m. Silberschein, flache Phantasieform.

Königin Elisabeth ist mit ihren riesengrossen, dichtgefüllten Blüten von feurig rosaroter Farbe eine der wirkungsvollsten Sorten.

Lambertina. Riesenblütig weiss, am Grunde violettrot. Sehr reichblühend.

La ville de St. Denis ist eine riesenblütige, regelmässig gebaute Paeonienblume, weiss mit lila Schimmer, am Grunde violett.

Louise Mouchelet, silbriglachsrosa, besonders grossblumig.

Mad. Stuart Low, leuchtend seidenartig lachsrot mit Silberschein halbgefüllt, grossblumig.

Maxima plena, sehr reichblühend, halbgefüllte, flache Schalenform, silberfarben mit kirschviolett am Grunde.

Regina Belgica, lachsrosa, am Grunde fleischfarben; lockere Phantasieform mit federiger Haube.

Remembrance of Dowening, gefranst, seidenartigrosa, halbgefüllt. Rosea superba, leuchtend lachsrosa, lockere, halbgef. Phantasieform.

Roseolens odorata, grossblütig, zart lachsrosafarben, am Grunde fleischfarben.

Souvenir de Ducher, kugelige Form, tief rotviolett mit magenta Reflexen.

Souvenir d'Etienne Méchin. Lockere fedrig gefüllte Schalenform, leuchtend frisches Rosa mit Silberschein.

2-3jährige Pflanzen.

Der Preis ist nach unserer Wahl: 1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50. Nach der Wahl des Bestellers: 1 St. M 3,-, 10 St. M 25,-.

Japanische Paeonia arborea.

Die japanischen Sorten der baumartigen Paeonien sind einfachblühend oder nur halbgefüllt, dabei aber in der Erscheinung von besonderer Schönheit und sind die von uns ausgesuchten Sorten von auffallender Reinheit und Leuchtkraft der Farben.

Aus unserer Kollektion nennen wir nachstehend die schönsten Sorten:

Colorado. Reinweiss, halbgefüllt, ähnlich der gefüllten Bijou de Chusan, aber höher im Wuchs, stumpfe Tulpenform.

Etna. Seidenartig glühend feuerrot.

Illinois. Karminrot, einfarbig grossblumig.

Missouri. Reinweisse, sehr grosse, leichtgefüllte, schalenförmige Blumen; die dunkelroten Narben heben sich scharf ab.

Nebraska. Zart rosa mit kirschfarbenem Mittelstern, Blumen blätter gefranst.

New York. Reinweiss mit regelmässig strahligem leuchtend kirschrotem Mittelstern, extra grossblumig.

Pennsylvania. Leuchtend lachsrot mit Silberschein.

Wisconsin. Zart rosa mit auffallend violettem Streifen in der Mitte jedes Blumenblattes, halbgefüllt, grossblumig.

Preis dieser japanischen Sorten: 1 St. M 4,-, 10 St. M 37,50.

Europäische krautartige Paeonien=Arten.

Paeonia albiflora "Celestial". Eine einfachblühende Art mit schönen hellrosafarben. Blüten. 1 St. # 0,90, 10 St. # 8,-

- albiflora "Dorothy", nelkenfarbig rosa, mit silbrigem Rand; einfachblühend 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—
- anemonaeflora rosea. Die kugelrunden einfachen Blumen sind von feinster karminrosa Färbung; die Mitte angefüllt mit den breiten goldgelben Staubfäden. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- anomala ist eine seltene, hübsche Spezies mit tief geschnittenem Laubwerk und einfachen rosalila Blumen. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-
- officinalis. Die becherförmige einfache Blume ist durchscheinend weinrot, der innere Kopf der Staubgefässe ist blutrot, während jeder Staubfaden leuchtend goldfarben gerändert ist 1 St. # 0,50, 10 St. # 4,—
- Paeonia officinalis rubra plena, die dunkelrot gefüllte Pfingstrose 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
 - Smoothi. Einfachblühend, glänzend kirschrosa mit goldenen Staubfäden 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-
 - tenuifolia. Glänzend-karmesinfarbene Blumen ruhen eingenestelt in fein geschlitztem Laubwerk. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
 - fl. pl. Eine dichtgefülltblühende Abart der vorigen, von wunderbarer Leuchtkraft.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Wittmanniana, sehr selten, mit zartschwefelgelben einfachen

Paeonia sinensis (Chinesische Pfingstrosen).



Aus unseren Anlagen: Paeonienfeld in Blüte

Die Paeonie in ihren feinsten Farbenmischungen ist die mächtigste Rivalin der Rose.

In Einzelpflanzung auf Rasen oder Rabatten, in grossen Gruppenpflanzungen bei 75—150 cm Entfernung der Pflanzen untereinander, als Zwischenpflanzung unter Rosenhochstämmen, denen sie in der Blüte vorangehen, immer ist die Wirkung der Pracht-

blumen eine imposante.

Die chinesischen Paeonien sind scheinbar unerschöpflich in Hervorbringung neuer Spielarten in immer wieder neuer Farbenzusammenstellung und wechselnder Blütenfüllung. Die Farben spielen in allen Schattierungen und geben in jeder anderen Spielart wieder neue Ueberraschungen durch die stets wechselnde Verteilung. — Man lernt da einen kaum glaublichen Reichtum in zarten Farben-Abstufungen kennen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, dann rot, rosa, gelb und cremefarben durchlaufend bis zum reinsten Schneeweiss.

Die Blütenform der Paeonien ist trotz der Grösse wunderbar anmutig und leicht gebaut in abwechselnder Füllung. Einige Sorten sind dicht kugelig gefüllt, andere hochgebaut, einige mit gekräuselter Mitte in schalenförmigen Aussenblättern, wieder andere

mit glatter, lockerer Füllung usw.

Alle geringwertigen, schmutzigfarbigen Sorten sind aus unseren Beständen ausgeschlossen.

Die Paeonien

gedeihen in jedem Boden — in schwerem besser als in leichtem —; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August-Oktober, sonst im Frühjahre. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer mehr zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden. Winterschutz verlangen die Pflanzen nicht, da sie völlig hart sind. Pflanzweite 75—100 cm. Baumartige Paeonien umbinde man leicht mit Tannenreisig, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Nachtfröste leidet.

Es ist sehr wichtig, die Stauden-Paeonien niemals zu tief zu pflanzen (die Wurzelkrone höchstens 5 cm unter

die Erdoberfläche), da sie sonst nicht blühen.

Eine Auslese feinster Paeonia sinensis neuerer Züchtungen!

Alba sulphurea. Schalenform. Schale reinweiss, Füllung hellschwefelgelb, rote Narben zeigend. Vorzüglich in der Form und reichblühend.

Albert Crousse. Flach gebaute Paeonienform. Helles, frisches Rosa mit Silberschein.

Alfred de Musset. Extra grosse, lockergefüllte Schalenform. Weiss mit zart fleischfarbenem Hauch, Füllung reinweiss, fedrig untermischt

Avalanche. Duftig lockere Nelkenform. Reinweiss mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen zeigend.

Boule de Neige. Flache Rosenform. Reinweiss mit licht schwefelgelber Mitte und Haube. Die Blumenblättchen sind innen stark karmin gerändert und die Staubfäden golden durchscheinend.

Candidissima. Junge Blumen Schalenform, ältere Blumen hochgebaute Phantasieform. Schale schneeweiss. In jungen Blumen Füllung zitronengelb, in älteren cremefarben mit weisser Haube und grünlichen Narben.

De Candolle. Nelkenform. Frische lila-karmin Färbung.

Dr. Bretonneau (Guérin). Gekräuselte Schalenform. Schale lichtlila, Füllung lichtzitronengelb mit fleischfarbener Haube.

Paeonia sinensis (Chinesische Pfingstrosen). Fortsetzung.



Paeonia sinensis, Einzelpflanze.

Eugenie Verdier. Dicht gedrängte Paeonienform, zart lachsrosa.

Lutea plenissima. Gekräuselte Schalenform. Schale reinweiss, Füllung in jungen Blumen strohgelb, in älteren Blumen lichter werdend. Fedrig untermischt mit reinweisser Haube.

Mad. Charles Levècque (Mlle. Léonie Calot). Nelkenform. Zart fleischfarbig, nach der Mitte zu etwas dunkler werdend, zuweilen purpurrote Rändchen zeigend.

Marie Crousse. Locker gewölbte Paeonienform. Farbe zart fleischfarben-lila. Extra schön.

Nec plus ultra. Halbgeschlossene Schalenform mit gekräuselter Füllung und knospenartiger Mitte. Schale weiss mit fleischfarbenem Hauch, Füllung creme, Haube zartrosa.

Philomèle. Schalenform. Schale frisch lilarosa, Füllung fedrig, chamois mit dunkelrosaroter, sich scharf abhebender Haube. Sehr intensive Farbenwirkung.

Solfatare. Fedrige Schalenform. Schale reinweiss, Füllung hellschwefelgelb mit weisser Haube. Zuweilen grüne Narbenblättchen.

Virginie. Phantasieform. Frisches hellilarosa mit durchleuchtenden goldenen Staubfäden.

> Der Preis obiger Sorten feinster Auslese: 1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50

Auslese unserer ersten Abteilung.

Alba triumphans. Gekräuselte Schalenform. Schale zartlila. Füllung elfenbeinweiss mit lockerer zartlilafarbener Haube und kelchartiger Mitte.

Amalia. Platte Schalenform. Schale rosa. Füllung gedrungen, rosa mit lachs durchsetzt, Mitte dunkler.

Globosa. Flache Kugelform. Weiss mit lichter Fleischfarbe, oft lichtgrün durchschimmernd. Rote Narben.

La Perle. Kugelige Schalenform. Schale rundgewölbt, weiss mit lila Hauch, Füllung fedrig untermischt, zart fleischfarben, Mitte kräftig lila mit karminfarbenem Rändchen.

La Rosière. Lockere Rosenform, an den Spitzen gefedert. In Büscheln blühend. Cremeweiss mit durchleuchtenden, goldenen Staubfäden.

Mad. Calot. Kräuselig gefüllte Schalenform. Schale kreisrund, weiss, Mitte elfenbeinweiss, rote Narben.

Mad. Crousse. Dichtgefüllte Schalenform. Reines Schneeweiss, lichtgrün durchschimmernd. Grossblumig.

Mad. de Galhau. Rosenform, zuweilen lockere Schalenform. Aussen lilarosa, dann cremefarben, Mitte lilarosa.

Mad. de Vatry. Grosse lockere Schneeballform. Schale lichtfleischfarben, Füllung elfenbeinweiss mit lichtfleischfarbenem Anflug.

Mad. de Verneville. Grosse Schneeballform. Hellcreme mit lichtgrünem Schimmer und lichtlachsfarbenem Anflug, zuweilen karminroten Spitzen in der Mitte. Niedrig wachsend, frühblühend.

Mad. Jules Elie. Lockere Paeonienform, extra grossblumig, Schale zartlila, Füllung lilarosa mit Silberschein.

Monsieur Dupont. Flache Kugelform, rosenartig gefüllt. Elfenbeinweiss mit goldenen Staubfäden durchschimmernd, hier und da mit karminroten Rändchen.

Prolifera tricolor. Grosse, kräuselig gefüllte Schalenform. Schale reinweiss, an älteren Blumen wie ein Kragen zurückgeschlagen, Füllung zuerst wachsgelb, später elfenbeinfarben. Leuchtend rote Narben.

Victoire Léman. Ausgeprägte Schalenform. Schale zartlila, Füllung cremegelb, die kleine Haube zartlila mit purpurnen Rändchen.

Ville de Poissy. Sehr lockere Phantasieform. Zart lilarosa, die goldenen Staubfäden überall durchleuchtend. In Büscheln überreich blühend.

1 St. obiger Sorten der 1. Abteilung kostet M 2,50, 10 St. M 22,50

Auslese unserer zweiten Abteilung.

Arthémise. Dichtgefüllte Schalenform. Die grossblättrige Schale frisch lilarosa, Füllung cremelachsfarben mit lilarosa untermischt.

Bicolor. Locker gefüllte Schalenform. Schale zart lila, Füllung cremegelb. In Büscheln blühend.

Charlemagne. Dichtgedrängte flache Paeonienform. Zart fleischfarben, nach der Mitte zu in der Farbe sich vertiefend.

Edmond About. Kugelform. Weiss mit zart rosa und lachsfarben. Die Blüten stehen auf langen Stielen hoch über dem sehr niedrigen gedrungenen Laubwerk.

Festiva maxima fällt schon durch imponierende Grösse auf. Grosse Rosenform, reinweiss mit Elfenbein-Untergrund, in der Mitte karmingerändert. Herrlich!

Formosa alba. Dichtgefüllte Schalenform. Schale reinweiss. Füllung lichtcreme, an jungen Blüten gelb, rote Narben.

Formosa rosea. Kräuselig gefüllte Schalenform. Schale lebhaft rosa, Füllung bleich lachsfarben, mittlere Haube lichtrosa.

Jeanne d'Arc. Grosse, lockergefüllte Schalenform, Schale pfirsichblütenfarben, Füllung cremegelb, mittlere Haube wieder zart pfirsichblütenfarben.

Paeonia sinensis (Chinesische Pfingstrosen). Fortsetzung.

Auslese unserer zweiten Abteilung. (Fortsetzung.)



La Coquette. Kugelig gefüllte Schalenform. Schale frisch rosa, Füllung cremerosa mit chamois, in älteren Blumen silbrig rosa.

La Tulipe. Lockere Rosenform. Zart elfenbeinweiss, hier und da karminrot gerändert, durchleuchtende Staubfäden. Ausnahmsweise hochwachsend.

Lingulata alba decora. Hochgebaute Schalenform. Schale hellila, Füllung creme, mittlere Haube əbenfalls lichtlila.

Lucrèce. Phantasieform mit fedriger und kräuseliger Schalenform abwechselnd. Schale von sehr zartem Rosa, Füllung creme, zuweilen mit zartrosa untermischt. Die cremefarbenen Blütenblätter sind fedrig.

La Vestale. Dichtgefüllte Schalenform. Schale reinweiss. Füllung zart elfenbeinweiss. An jungen Blumen: Schale und mittlere Haube fleischfarben. Rote Narben.

Mad. Duruflé. Lockere Rosenform. Reinweiss, goldgelbe Staubfäden zeigend.

Mad. Geissler. Locker gebaute Schalenform. Schale kräftig lilarosa, Füllung licht lilarosa.

Mad. Lemoine. Sehr grosse, locker gefüllte Schalenform. Schale tiefrosa, Füllung silbrig rosa mit chamois.

Marie Deroux. Lockere Schalenform. Schale lilarosa, Füllung lilarosa, zart fedrig untermischt.

Monsieur Galland. Locker gefüllte Schalenform, Füllung fedrig untermischt. Rein ponceaurot.

Nigricans. Lockere Phantasieform. Samtig dunkelamarantrot.

Pierre Dessert. Lockere halbgefüllte Paeonienform. Dunkelamarantrot.

Pottsi. Halbgeschlossene Paeonienform. Amarantrot. Reine des Roses. Fedrig gefüllte Schalenform. Schale zart rosa-lila, Füllung creme mit lachsfarben, zuweilen in der Mitte reinrosa. Haube herauswachsend.

Richard Fetters. Locker gefüllte Schalenform, zart lilarosa mit die Mitte grün durchschimmernden Narben.

Victor Duruflé. Locker gefüllte Schalenform. Reinweiss, Füllung creme-weiss, Narben hell.

Ville de Nancy. Dichtgefüllte Schalenform. Reines weinrot.

Triomphe de l'Exposition de Lille. Grossblumige Nelkenform. Silbrigrosa mit zuweilen durchscheinenden goldenen Staubfäden.

Triumphans gandavensis. Dichtgefüllte Schalenform; Schale sehr zartes Lila, Füllung am Untergrund hellgelb in lachsfarben auslaufend mit lilarosa Haube; in Büscheln blühend.

1 St. obiger Sorten der 2. Abteilung kostet: M 1,50, 10 St. M 14,-.

Auslese unserer dritten Abteilung.

Clarissa. Paeonienform. Schale rosa, Füllung silbrigrosa, zuweilen mit creme vermischt.

Clarisse Calot. Sehr grosse, lockere, hochgebaute Paeonienform, seidenrosa mit Silberschein; sehr reichblühend.

Edulis superba. Lockere Paeonienform, aus grossen, gewellten Blättern gebildet, frisch reinrosa, gross- und reichblühend.

Faust, Schalenform; Schale fleischrosa, Füllung creme mit chamois, mittlere Haube fleischrosa.

Fulgida. Lockere Paeonienform. Leuchtend purpurrot.

Henry Demay. Grosse vollkommene Blume, lebhaft purpur mit Silberschein.

Heracles. Locker gefüllte Schalenform. Schale lilarosa, Füllung silbrigrosa mit chamois.

L'espérance. Kugelform, auf weissem Untergrund mit lila gespritzt und gesprenkelt.

Lucie Malard. Flache lockere Nelkenform. Seidenrosa mit lila Schein. Niedrig wachsend, gute Gruppenpflanze. Mad. Costé. Locker gefüllte Schalenform. Schale lichtrosa. Füllung cremeweiss, weisse Haube mit karmin gerändert. Mad. Bollet. Abgeplattete dichtgedrängte Kugelform. Rotlila mit Silberschein.

Mad. James Odier. Paeonienform. Junge Blumen rosa, bei alten Blumen in dunkel lila mit Silberschein übergehend.

Marie Jaquin. Locker gefüllte Schalenform, Schale lichtfleischfarben, Füllung hellcreme mit fleischfarben.

Monsieur Barral. Dichtgedrängte, flache Paeonienform, silbrigrosa.

Reine des fleurs. Schalenform, Schale lilarosa. Füllung chamois, mittlere Haube dunkellilarosa, Füllung in jungen Blumen kräftig rosa.

Reine Victoria. Extra grossblumige Paeonienform. Zartfleischfarbenlila, am Grunde mit creme untermischt. Grüne Narben.

Sidonie. Rosa mit lachsfarbenem Anflug. Starkwachsend.

Superba. Locker gefüllte Schalenform. Karminrosa.

Victor Lemoine. Lockere Paeonienform. Dunkel purpurrot.

1 St. obiger Sorten der 3. Abteilung kostet: M 0,90, 10 St. M 8,-

Interessenten für Paeonien machen wir auf unser beschreibendes Sonderverzeichnis mit Preiszettel der feinsten Sorten aufmerksam, das frei gesandt wird. Wir kultivieren etwa 60000 Stück.

Auswahl guter Sorten aus unserer reichen Sortenwahl von Paeonia sinensis kostet nach unserer Wahl:

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 65,-.

Papaver orientale (türkischer Riesenmohn).



Papaver orientale, Blüten einer rosa blühenden Varietät des Riesenmohns.

Für den Zimmerschmuck sollte man die Blumen des türkischen Mohns in Knospenform — kurz vor dem Aufbruch - schneiden. Die Blumen halten sich dann gut im Wasser und man erhält stets die frischen, noch ungebleichten, herrlichen Farben des Mohns.

Wo immer die türkischen Mohne im Garten oder Park an passender Stelle in grüner Umgebung angepflanzt sind, da sind die unvergleichlich leuchtenden Farben der Riesenblumen von solch packender Wirkung, dass selbst auf weite Entfernung hin das Auge unwillkürlich gefesselt wird. - Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass die hier angebotenen Sorten die echten Züchtungen und keine Sämlinge sind.

Nach der Blütezeit

schneide man die abgeblühten Stiele bei den orientalischen Mohnarten über dem Boden ab, ebenso das nach der Blüte absterbende Laub, da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben.

Rote Spielarten des türkischen Mohns.

Bracteatum, glänzend tief dunkelrot.

Brightness. Leuchtend orangerot mit karmesinbraunen Flecken. Brillant, mit leuchtend lebhaftroten, grossen Blumen mit grossen schwarzen Flecken am Grunde der Blumenblätter. "Goldschmidt", karmesinblutrote, riesige Blume m. schwarz. Flecken.

"Goliath" (G. & K.). Die beinahe holzartigen, riesenhaften Stiele werden bis über 1,50 m hoch und tragen straff aufrecht die grossen Blumen, brennend scharlachrot und von ganz aussergewöhnlicher Haltbarkeit.

"Grossfürst", s. grossbl., dunkelzinnoberrot m. schwarz. Fleck. Liliput ist eine reizende, reichblühende Zwergform, lachsrot
Little Prince, äusserst reichblühend, mit kleinen, ziegelroten
Blumen auf festen Stielen.

"Loreley", glänzend dunkelzinnoberrot von fester Form. Mary Studholme. Lachsfarbigrosa, im Zentrum karmin gefärbt mit eigenartig leuchtendem Schmelz. Wuchs niedrig.

Menelik. Hochgebaute edle Blütenform, mit gewellten Blumenblättern, eigenartig schöne Kupferfarbe.

"Monarch", orangerot mit schwarzen Flecken.

Mrs. Perry. Aprikosen-orangefarbig.

Oriental King. Leuchtend karminrot auf starken Stielen. Plenum, hat grosse, dichtgefüllte lachsfarbene Blumen.

Parkmanni ist sehr empfehlenswert durch die auffallende Reichblütigkeit. Die Blumen sind mittelgross und straffstehend. Prince of Orange, orangefarben mit schwarzen Flecken am Grunde.
Royal Scarlet. Wir halten diese Spielart in ihrer Wirkung für die schönste, durch die riesigen, grossen Blumen von blendend scharlachroter Farbe mit tiefschwarzen Flecken am Grunde der Blumenblätter

Salmon Queen. Die Färbung dieser Blumen ist eine eigenartige durchsichtige Lachsfarbe.

Semiplenum, hat eine doppelte Reihe von Blumenblättern, wodurch die Blüte vollkommener aussieht. Farbe leucht. scharlachrot.

"Silberblick". Die tassenförmigen Blumen sind hellleuchtend lachsrot mit weisser Staubfädenschale in der Mitte und weissen Flecken am Grunde der Blumenblätter.

"Tom Thumb", gedrungen wachsend mit silbrig welligen Blättern und sehr grossen, glänzend ziegelroten Blumen.

"Trilby". Leuchtend lackzinnoberrot mit karmesinbraunen Flecken, doppelreihige, sehr haltbare Blume, 60-75 cm hoch.

Württembergia, tief blutkarmesinrot mit tiefschwarz. Pleck.

Hellfarbige, rosa und lila Sorten des türkischen Mohns.

"Fürstenkind", extra grossblumig, fleischfarbig mit zartrosa angehaucht und kohlschwarzen Augen.

"Hesperia", lila lachsrosa mit grossen schwarzen Flecken. "Lady Roscoe", zart lachsrot, auf straff aufrechten Stielen

mittelgross blühend. Neu.

"Prinzess Viktoria Luise". Die Farbe ist rein lachsrosa mit weichem Hauch, gänzlich neu unter den grossen Mohnblumen. — Die zahlreichen Blüten tragen sich gut und sind sehr haltbar, auch im Wasser in abgeschnittenem Zustande.

recht auf straffen Stielen und sind von herrlich lachsrosa Färbung. Schöne Schalenform. "Proserpine", dunkellila in karminrosa und hell lila übergehend.

"Prinzess Ena". Die mittelgrossen Blumen stehen auf-

"Psyche", leuchtend hell lila in weiss übergehend.

"Queen Alexandra", seidenartig lachsrosa mit schwarzen Flecken am Grunde, in hochgebauter Form. Neu.

"Rose Queen", lachsrosa mit lila schattiert, im Verblühen in die lila Farbe der Proserpine übergehend.

Diese Sorten kosten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-. Nach unserer Wahl 10 St. M 3,50, 100 St. in 20 - 50 Sorten M 30,-.

Papaver nudicaule und Papaver alpinum,

Papaver nudicaule.

der kleine sibirische Mohn und der zierliche Alpenmohn.

Für Garten-, besonders Felspartien-Schmuck und Blumenschnitt!

Der sibirische Mohn (Papaver nudicaule) liefert mit seinem Reichtum reizender kleiner Blumen in frischen Farben auf langen drahtdünnen Stielen nebenbei einen entzückenden haltbaren Schmuck für das Zimmer, während der zierliche Alpenmohn nur zur Ausschmückung von Felspartien dient.

F Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn), (Ursprungsform) gelb.

nudicaule album, reinweiss.

" miniatum, dunkel-orange. sulphureum, schwefelgelb.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

FPapaver alpinum (Alpen-Mohn), in Farben gemischt.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-Papaver alpinum laciniatum, geschlitzt-

blütig, in Farben gemischt.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

F Frühjahrs=Phlox.

Die Frühjahrsphloxe bilden mit ihren mannigfachen Blütensträussen ein sehr schätzbares Material zur Bepflanzung unserer Felsanlagen, Böschungen und Hänge. Sie wirken besonders gut, wenn Flächen davon in möglichst einer Farbe bepflanzt sind. Die reinen leuchtenden Farben von rosa-rot und dunkelrot, in lila und weiss, heben sich da wunderbar voneinander ab. Auch zwischen den Steinritzen erfüllen sie ihren Zweck, indem sich die kriechenden Aestchen nach allen Seiten hin ausbreiten. Einzelne Sorten sind auch für ganze Gruppen in regelmässigen Anlagen zu verwenden, oder auch zur Unterpflanzung in Tulpenbeeten wertvoll. Während des Winters sollten sie einen leichten Schutz mit Tannenästen gegen die Wintersonne haben.



Frühjahrs-Teppich.

Phlox amoena ist zu Frühlingsgruppen besonders geeignet mit ihrem grossen Reichtum festgeschlossener Blütendolden von modern magentaroter Farbe. 20 cm. April-Mai. . 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 22,50

amoena fol. var. wirkt entzückend mit seinen gelblich weissbunten und an den jungen Trieben noch rosafarbenen Blättern. . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— 100 St. M 35,—

divaricata canadensis ist eine der dankbarsten Frühlingsstauden und sehr empfehlenswert für den Blumenschnitt. In einer Höhe von 30 cm bildet die Pflanze einen vollen Busch lockerer Dolden von zierlich gezackten, reinfarbig blassblauen Blüten auf festen Stielen. April-Mai.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—

divaricata "Laphami" ist eine Neuheit und durch die grösseren Blütendolden auf kräftigen Stielen und die länger anhaltende Blütezeit eine Verbesserung der vorigen, der sie in Farbe annähernd gleicht. Diese Sorte eignet sich auch vorzüglich zum Blumenschnitt.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

setacea atropurpurea. Das Blütenkissen ist aus purpurrosafarbenen Blütchen gebildet, aus deren Mitte dunkel-purpurrote Aeugelchen herausleuchten. 10 cm. April-Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Phlox setacea "Blütenteppich" (G. & K.). Durch die rosafarbenen Blütchen, welche die Pflanzen überreich bedecken, ist die Sorte von grosser Wirkung. April-Mai.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

setacea "Daisy Hill". Dunkelrosa mit karmin Mitte. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

setacea "G. F. Wilson", ein reizender niedriger Phlox mit schieferblauen Blüten, ungemein reichblühend und

sehr empfehlenswert. 15 cm. April-Mai.
1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—

setacea Perfection, weiss mit lichtlila Anflug.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

setacea "The Bride". Die einzelnen Blüten des Teppichs sind gross, weiss mit rosa geäugelt. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

setacea "Sternteppich". (G. & K.) Diese reizende Neuheit bildet halbhohe Kissen, die dicht überschüttet sind mit sternförmigen, lilablauen Blütchen. Einer der dankbarsten Frühjahrsphlox. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

setacea "Silberlicht" (G. & K.). Zart lichtlila in der Farbe sind die Pflanzen überschüttet mit den anmutigen Blüten. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

setacea "Sprite" hat leuchtend karminrote Blüten mit dunklem Auge. Sehr dankbar blühend.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

pilosa ist eine der schönsten Frühlingsphlox für Gruppen. Mitte Mal und schon früher erscheinen auf 30-40 cm hohen Stielen die lilarosa Blumen in solcher Fülle, dass sie ein reinfarbiges Kissen bilden. Eine Gruppenpflanze I. Ranges und zugleich das Gegenstück zu Phlox canadensis.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 32,50 pilosa "Brillant". Eine verbesserte neue Abart des schönen Phlox pilosa. Die Farbe ist dunkelkarminrosa und ebenso reichblühend wie jene. Für ganze Gruppen sehr wertvoll. Der Flor dauert 4—6 Wochen. Mai-Juni. 30—40 cm.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,subulata wirkt durch die rosafarbenen Blüten auf hellgrünem Laubpolster. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 22,50

suffruticosa "Snowdon". Die schönen wohlgeformten Blumen sind blendend weiss. Vorzügliche Schnittsorte. Remontierend, im Juli-August blühend. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Phlox decussata (Flammenblumen).



Ein Teil unserer Phloxblüte mit Phlox "Rheingau" im Vordergrunde.

Unvergleichlich in der Farbenwirkung sind die prächtigen Phloxsorten, wenn sie in grösseren Gruppen angewandt sind in einer Farbe mit andersfarbiger Einfassung, oder auch gemischt, ebenso als leuchtende Farbenlinie in langer Reihe am Wege entlang, auch als Vorpflanzungen vor Gehölzen und zwischen Koniferen. Daneben sind die weissen und zarten Farben vorzüglich zu Bindereien zu verwerten. — Um aber das vollkommen Schöne in Phlox zu erreichen, ist notwendig, 1. nur ausgesucht beste Sorten; 2. volle Sonne; 3. kräftig gedüngter Boden und gute Pflege im Giessen und Hacken, vor allen Dingen fortwährendes Bewässern während des Sommers.

Aus unserer grossen, jährlich um die aufkommenden Neuheiten bereicherten Sammlung von Phlox-Sorten wählen wir nur stets solche zur Vermehrung aus, die sich durch Schönheit der Farben und Grösse der Dolden und Einzelblüten auszeichnen.
Für grössere Farbenwirkungen in Phlox stellen wir auch gern Sorten in Farbenskala zusammen, genau stufenweise in Farben abgetönt, z. B. die verschiedenen Rot durch Rosa in Reinweiss überlaufend usw.

PDie Gesamt-Blütezeit der Phlox decussata erstreckt sich von Mitte Juli bis zur zweiten Hälfte September und die Zahlen 🗓 🔁 🖫 geben an, in welchem Abschnitt dieser Zeit die angegebenen Sorten blühen.

Zwei eigene Phlox=Neuzüchtungen für 1911/12.

Gefion (G. & K). Beschreibung siehe unter Neuheiten S. 9. 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-

Wanadis (G. & K.). Beschreibung siehe unter Neuheiten S. 9. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Beste Neuheiten der letzten Jahre von anderen Züchtern.

"Baron van Dedem". Scharlach blutrot. Die grossen Einzelblumen vereinigen sich zu gut geformten Dolden. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

"Edouard Bour". Karminviolett stark verzweigte Rispe, mittel-hoch, als Gruppensorte geeignet. [2]

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

"Elisabeth Campbell". Zart lachsfarbigrosa mit grossem, weissem Mittelspiegel, prachtvolle Dolden bildend. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

"Fitzboy". Lichtrosa mit violettroter Mitte. 2

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

"Frau Ant. Buchner". Schneeweiss. 3-4

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

"Frau Oekonomierat Buchner". Schneeweiss, mit leuchtendem hellkarminrotem Auge. Niedrigbleibend. 3

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

"Kommerzienrat Borsig". Zinnoberrot mit karminrotem Auge, hochwachsend. [3] 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

"Rosenberg", feurig karminviolett mit blutrotem Auge. Sehr gute Farbe für Gruppenpflanzung. [3]

1 St. M. 0,50, 10 St. M 4,—

Eigene Neuzüchtungen von 1910 11.

"Astrild" (G. & K.). Die stark verzweigten hochgebauten Blütendolden haben eine weithin leuchtende karminrosa mit zinnoberrot untermischte Farbe. — Der Hauptwert dieser Neuheit aber besteht darin, dass sie in der Sonne die Farbe nicht verliert, ebenso bei andauernder Nässe nicht abblasst. Für grosse Gruppen daher besonders geeignet.

"Braga" (G. & K). Die kräftig lilarosa Färbung der grossen Blütendolde, gehoben durch den weichen Mittelspiegel der Einzelblüte ist von ausserordentlicher Klarheit und Reinheit.

"Hervor" (G. & K.). Karminrosa mit lachsfarbenem Anflug und klarer weisser Mitte, hochgebaute stattliche Dolden bildend bei mittelhohem Wuchs.

"Widar" (G. & K.). Violettblau mit reinweisser Mitte, in tadellosen grossen Dolden, frei über den mit Blättern bis zum Grunde dichtbesetzten Stielen blühend, mittelhoch werdend. Eine vorzügliche Gruppensorte. Alle 4 Sort. kosten: 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-, 100 St. M 50,-

Unsere besten Züchtungen der letzten Jahre wie:

Donar Frühlicht Hödur Loki Ostära

Nähere Beschreibung siehe nächste Seite.

sind ihres prachtvollen Farbenspiels, der enormen Reichblütigkeit und der vorzüglichen Haltung wegen besonders beliebt und zur Pflanzung von Farbengruppen ausserordentlich geeignet.

Diese Sorten kosten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Phlox decussata (Flammenblumen). Fortsetzung.

Besonders empfehlenswerte Phlox-Sorten letzter Jahrgänge zur Pflanzung von Farbengruppen.

Clara Benz wächst gedrungen niedrig mit dichten Dolden in leuchtend karminrosa mit lila Auge. [2]

Coquelicot, der leuchtendste aller roten Phlox; blendend orange-scharlach. (3)

Comtesse de Jarnac. Weissbuntblättriger Phlox. Wertvoll für Grupp., als Unterpflanz.

Donar (G. & K.). Die sehr grossen Blüten sind karminrot mit feurigen Reflexen und bilden eine dichte Dolde. (4)

Eclaireur, mit grossen, kräftig karminviolettroten Dolden über üppig festem Laubwerk. I

Etna, feurig orange-scharlach. 2-3

Fräulein G. von Lasseng. Besonders grossblumigmit schnee-

weissen Dolden.

Freya (G. & K. 1910). Lichtfleischfarben mit hellrosafarbenen Knospen locker durchsetzt. In der Mitte der Blume ein zarter, karminfarbener Ring. Zwergsorte mit stark verzweigter Dolde. 2 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Frühlicht (G. & K. 1907). Die herrliche, lichtrosa Farbe, die grossen, festgeschlossenen Dolden, der gedrungene niedere Wuchs und die frühe, schon Anfang Juli beginnende Blüte lassen diese herrliche Sorte immer mehr als ein Ideal für Gruppenpflanzung erkennen.

G. A. Ströhlein. Sehr grosse, pyramidale, feste Dolden, brennend scharlachrot mit dunklem Auge in den grossen Einzelblüten.

General van Heutz. Leuchtend lachsfarben mit weisser Mitte. [3] Gretchen Goos. Lebhaft karminviolett mit weissem Mittelspiegel, niedrig bleibend.

Gruppenkönigin. Prachtvolle, grosse Dolden von 20 cm Durchmesser und 15 cm Höhe, pyramidal gebaut aus grossen Einzelblüten, malvenrosa mit scharfem, purpurnem Auge. Eine hervorragende neue Gruppensorte,* gedrungen, halbhoch mit üppigem Laubwerk. Hanny Pfleiderer. Lichtfleischfarben mit karminrotem Mittelring. Halbhohe Gruppensorte.
Hermlne bildet als niedrigster Phlox mit seinen dichtgesetzten

Blüten in Gruppenpflanzung einen weissen Teppich.

Hödur (G. & K.). Fleischfarbigrosa mit grossem, weissem Mittelstern; äusserst zarte Farbe. Sehr grossblumig. 2-3

Iduna (G. & K. 1910). Zartes lachsrosa mit weisser Mitte.
Dichte, kugelförmige Dolden bildend. Kurz gedrungene und
straffe Zwergsorte. [3]

Le Mahdi, der beste blaue Phlox, dichte Dolden bildend. Bei bewölktem Himmel und abends rein tiefblau und nur bei Sonnenschein violett scheinend.

Loki (G. & K.). Rein lachsrosa mit dunkelkarminrotem Mittelring, mittelhoch wachsend mit sehr grossen Dolden von 18 bis 20 cm Durchmesser. 4

Mounet Sully. Scharf leuchtendes Rot in hohen Dolden. 2

Ostära (G. & K.). Feste Dolden bildend, atlasrosa mit kleinem, dunklem Mittelring, dabei gedrungen wachsend auf straffen, dicht blattbesetzten Stielen. Vorzügliche Gruppensorte.

Reichsgraf von Hochberg. Tief leuchtend amarantrot in grosser Dolde. Einer der schönsten dunkelroten Phlox. 11-2

Rheingau (G. & K. 1906). Es ist die grösstblumigste weisse Sorte mit wahren Prachtdolden, deren Riesen-Einzelblüten hohlspiegelartig geformt sind und in der Wirkung ganz besonders dadurch gehoben werden, dass sich das reine Weiss der runden Blumen scharf abhebt. 2 remontiert bis 4

Siebold. Brenn. orangerot, coquelicotartig in flachbreiter Dolde. 2 Tapis Blanc, ganz niedrig, grossblumig, schneeweiss. Die hervorragendste und feinste weisse Gruppensorte in Phlox.

Phlox decussata, die besten roten Farben.

Brillant, hellblutrot. [2,-[3] Coquelicot, der leuchtendste rote Phlox, blendend orange-scharl. [3]

Donar (G. & K.). Siehe oben.

Eclaireur, karminviolettrot, gegen die Mitte zu lachsrosa. L Etna, orange-scharlach, einer der feurigsten Phlox. 2-3 Flambeau, orange-scharlach. 1-2 G. A. Ströhlein. Sehr grosse, feste Dolden in brenn. scharlachrot. 2

Jocelyn, leuchtend rot, gedrungen wachsend. Lothar, leuchtend rot, grosse Dolden. 3 Matador, feurig-orange mit kirschrotem Auge. 3

Mounet Sully. Scharf leuchtendes Rot in hohen Dolden. 2 Reichsgraf von Hochberg, tief leuchtend amarantrot in grosser Dolde, einer der schönsten Phlox. (1)—(2)

Siebold. Brenn. orangerot, coquelicotartig in flachbreiter Dolde. 2

besten zarten Farben.

Artaxis, violettrosa mit grossem weissem Auge. I Clara Benz, leuchtend karminrosa mit lila Auge, gedrungen niedr. 2 Eugen Danzanvillier, sattlila mit grossem, weissen Auge. 11—2 Faust, weiss mit zartkirschrotem Auge. 2 Freya G. & K. 1910). Siehe oben.

Frühlicht (G. & K. 1907). Siehe oben.
Fürstin Nina Gagarin. Feurig lachsorange mit karmin.
General van Heutz. Leuchtend lachsfarben mit weisser Mitte.

Hanny Pfleiderer. Siehe oben.

Hödur (G. & K.). Siehe oben.

Iduna (G. & K. 1910). Siehe oben. Le soleil, chinarosa mit lebhaft rosa Mitte. 2

Loki (G. & K.). Siehe oben.

Michel Cervantes, reinweiss mit leuchtend rotem Auge. 2 Mad. Paul Dutrie, zart cattleyenrosa m. weiss. Hauch in gross. Dolde. 2 Ostara (G. & K.). Siehe oben.

Professor Virchow, orangerosa mit weiss gezeichnet. 3—4
Sonnenkind, dunkelrosa. Mitte mit etwas zartem, abgetöntem
Umkreis. Niedrig. 1
W. Robinson, lachsrosa mit leuchtend violettem Auge. 1

Die besten weissen Farben.

Blanc nain, reinweiss, grossblumig niedrig. [3] Fräulein G. von Lassberg, besonders grossblumig, schneeweiss. B. Hermine, ganz niedrig, dichtblütig weiss.

Rheingau (G. & K. 1906). Siehe oben.

Tapis blanc, ganz niedrig, grossblumig, schneeweiss.

Die besten blauen Farben.

Absolut reinblaue Farben gibt es in Phlox noch nicht; diese aber sind bei bedecktem Himmel und abends reinblau, während sie bei Sonnenschein violett aussehen.

Emanuel de Rouge, dunkelviolettblau. 2-3 Le Mahdi, tiefblau, in dunkelviolett übergeh. Der beste blaue Phlox. I Lord Raleigh, violettblau. I

Auswahl von Zwergsorten.

Blanc nain, reinweisse Dolden. [3]
Brillant, hellblutrote Blütendolden. [4] Clara Benz, leuchtend karminrosa, prächtige Gruppensorte. 2 Freya. Lichtfleischfarben mit karminrotem Mittelring. Zwergsorte. 2 Frühlicht. Siehe oben.

Gretchen Goos. Siehe oben. Iduna. Zartes Lachsrosa mit weisser Mitte. [3] Le soleil, chinarosa mit lebhaft rosa Mitte.
Sonnenkind, dunkelrosa, nach dem Umkreise zart abgetönt. Tapis blanc, sehr grossblumig, schneeweiss. 1

Sämtliche oben= und nebenstehende Phloxsorten kosten nach Wahl des Bestellers: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-Nach unserer Wahl: 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Physalis Francheti, die sogen. Judenkirsche, ist beachtenswern durch die schönen Früchte, die einer rot durchscheinenden Ballonfackel ähnlich sind. 30 cm. 1 St. M. 0,30, 10 St. M. 2,5

Physostegia virginiana alba ist eine reich mit schlanken, weissen Blütenrispen blühende Staude, die slch vorzüglich für den Blumenschnitt eignet. 80 cm. Juli-August . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" virginiana rosea. Eine ebenfalls vorzügl. Schnittsorte mit schön rosafarbigen Blütensorten 1 St. 11 0,50, 10 St. 11 4,—

Plumbago Larpentae. Im Spätsommer blühend mit reichen kobaltblauen Blütchen, die auf den braungeaderten Blättern sehr hübsch aussehen. Leichte Decke im Winter. 20 cm. Juli-September 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Polemonium Richardsoni. Eine reizende, sehr empfehlenswerte Staude mit schönem, lebhaft grünem, farnähnlichem Laube und himmelblauen Blütchen, in denen die leuchtend goldgelben Staubfäden wirkungsvoll abstehen. Blüht zweimal jährlich, zuerst im April-Mai, durch die niedrigen, schön gruppierten Blütentrauben besonders schön; später im Juli-August zum zweiten Male in höheren, lockerer stehenden Blütenständen. 60 cm 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

"Richardsoni album, eine reinweisse, ungemein dankbar blühende Form der vorigen, die fast den ganzen Sommer hindurch blüht 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Polygonum amplexicaule album Eine prachtvolle Herbststaude mit den schlanken, weissblühenden Blütenähren. Die 120 cm hohen Pflanzen sind sehr dekorativ. August-September.

Bistorta. Rosafarbene schlankgestielte Blütenrispen schmücken das dichte Laubwerk. 60 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

, **Bistorta superbum.** Mit leuchtend roten Blütenrispen. Beide Sorten für feuchte Plätze . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" Sieboldi wächst zu stattlichen Pflanzen von über 1,50 m Höhe mit weissen Blumen in den Blattachseln.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 nanum. Niedrige, bis 60 cm hochwachsende Abart.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-



Polygonum amplexicaule.

Potentilla hybrida fl. pl. sind reizende Stauden mit erdbeerartigem Blattwerk und locker ständigen gefüllten Blüten von gelber, orange und roter Färbung. Ausgezeichnete Rabattenpflanze. 50—60 cm.

Etwa 10 verschiedene Sorten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4, atrosanguinea Gibsoni. Die einfach leuchtend samtigroten Blüten stehen einzeln auf den sehr verzweigt liegenden Aesten. Blüht von Juni bis Herbst ununterbrochen.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
willosa ist hellfilzig behaart und gelbblühend, für Fels- und
Steinpartien geeignet 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Pulmonaria angustifolia azurea hat tief gentianblaue Blumen, die
Anfang März bis Ende April in grosser Blütenfülle erscheinen.

Der frühen Blüte wegen sehr beliebt. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9, saccharata. Im April blüht diese halbschattenliebende Frühlingsstaude mit dunkelblauen glockenförmigen Blüten. Die herzlanzettlichen dunkelgrünen Blätter sind silberweiss gefleckt 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

rubra, hat rote Blüten. 30 cm. April. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Primeln.

Man sehe eine Gruppe feiner Primelarten in voller Blüte zu einer Zeit, in der das Wachstum in allen anderen Gewächsen im Garten eben erst zum Durchbruch kommt, und man wird sich sofort zugestehen, dass es etwas erfrischend Schönes ist, nach der langen Entbehrung des Winters diese reinen, leuchtenden Farben in den edlen, zierlichen Formen zu sehen.

Primula acaulis-Hybriden, die zierlichen, einfachblühenden Pr. acaulis sind durch ihre Reichblütigkeit und die reizenden Farben sehr beliebte Frühjahrsblüher.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—


acaulis coerulea (blaue Primel) ist eine neue Spielart von der so seltenen leuchtend blauen Farbe. Die Blumen wachsen in solcher Menge einzeln zwischen den Blättern hindurch, dass die blühende Pflanze eine leuchtend blaue Halbkugel bildet. Echte Pflanzen. Da etwas empfindlich, ist ein leichter Winterschutz mit Tannenzweigen zu empfehlen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—

" acaulis alba plena, dankbar blühend mit reinweiss gefüllten Blüten. 15 cm. März-April. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

" acaulis "Primrose", einfache hellgelbe frühblühende Sorte 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Auricula. Die schönen Aurikeln in feinem Farbenspiel. Unsere Aurikeln stammen von der feinsten Zuchtwahl und zeichnen sich durch besonders schöne Farbentöne aus. Zweijähr. Pflanz.: 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—

Bulleyana. Siehe Neuheiten Seite 8.



Primula acaulis.

Primeln (Fortsetzung).

Primula Cashmeriana ist besonders für Liebhaber von grossem Werte. Die grossen Blätter sind auf der Unterseite mit goldgelbem Staub bedeckt, ebenso die gerade aufwachsenden starken Blütenstengel, die an ihrer Spitze je eine dichte, kugelförmige Blütendolde aus tief violettblauen Blumen

tragen. 30 cm. März-April.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—

Cashmeriana alba ist eine neue, reinweisse Form dieser beliebten asiatischen Primel. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

"Rubin". Im Gegensatz zur bekannten Stammform prangen die Blütenbälle in tief rubinrot weithin leuchtender Farbe. Selten. März-April. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—Cockburniana. Diese Neueinführung ist eine wertvolle Bereicherung unseres Primelsortiments. Die Farbe der Blumen ist leuchte d orangerot, eine Färbung, wie sie bisher bei den Primeln noch nicht vertreten war. Die Blüten sind quirlständig und etagenmässig aufgebaut. 30—40 cm.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—



Primula elatior gigantea.

Primula elatior aurea grandifl. (Vierländer Primel.) Die grossblumigen, goldgelben Dolden bilden dichte Blütenkissen, die zu Gruppen vereinigt, eine gleichmässig leuchtend goldene Masse bilden. Echte Pflanzen, keine Säm-linge! Wert oll zur Ausschmückung natürlicher Blumenwiesen, wirkt besonders schön mit dem wilden Schaumkraut Cardam. pratensis. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4, -, 100 St. M 35,-

elatior gigantea-Hybriden. (Die grossblumigen Polyanthus.) Die herrlichen, neuen englischen Prachtprimeln haben in ihren süssduftenden, langgestielten, grossen Blütendolden, deren Einzelblumen oft über 4 cm Durchmesser haben, einen Farbenreichtum von weiss, gelb, rosa und rot in allen Schattierungen, der bei der reichen Menge der Blumen zu so früher Jahreszeit von wunderbarer Wirkung ist, und auch einen erfrischenden Blütenschmuck für das Zimmer bietet. Blütezeit Anf. April bis Mitte Mai.
1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 18,-

elatior alba gigantea hat grosse weisse Blütendol en. Als Einfassungspflanze sowohl wie für Gruppen vorzüglich geeignet 1 St. M 0,32, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25.—

frondosa ist eine reizende alpine Primelart mit herrlichen, rosa gefärbten Blüten. Die Blätter sind unterseits weiss bestäubt 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50



Primula Cashmeriana.

Primula Littoniana. Siehe unter Neuheiten S. 8.

rosea grandiflora (rosarote Primel), der Edelstein unter den Primeln, eine reizende Frühjahrsblume, blüht sehr willig im April mit glänzend rosaroten Blumen in Dolden-form. 20 cm. Zu verwenden auf Beeten, Felspartieen oder am Bach und sumpfigen Ufern, wo sie einen herrlichen Anblick gewähren. Auch zum Verwildern in grossen, feuchten Wiesen. . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Primula Sieboldi.

Winterharte japanische Primeln.

In Farbenpracht, Blüten-Reichtum und Mannigfaltigkeit unbeschreiblich schön für Frühlingsbeete, dabei vollkommen winterhart und ausdauernd.

Primula Sieboldi.

In den entzückenden Züchtungen dieser winterharten, japanischen Primeln ist eine herrliche Bereicherung der Frühlingsgruppen geboten, die bei den vielseitigen Farben in der Lieblichkeit der Formen nicht ihresgleichen hat. Die Blütenkeime werden im September-Oktober gelegt und — falls sie nicht am Blütenstandort in ha bschattiger Lage verbleiben können — nach der Blüte dann vorsichtig in halbschattige, lockere Beete verpflanzt. In Sorten unserer feinsten Auswahl:

1 St. M -,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Primula sikkimensis. Die schwefelgelben lockeren Blütendolden sind leicht geneigt und werden von 40 cm hohen Stielen getragen. Ein feuchter freier Standort sagt den Pflanzen am besten zu 1 St. M 0,60, 10 St. St. M 5.—



Primula irondosa.

Pyrethrum hybridum.



In der Schönheit der Blumen mit Bezug auf Farbe und Form ist in den hier angebotenen neuen Sorten ein bedeutender Fortschritt geboten, der die Pyrethrum auf eine immer höhere Schönheitsstufe hebt. Die gefüllten Formen zeigen, wie das nebenstehende Bild zeigt, eine auffallend zierliche Federung, die jede Plumpheit ausschliesst.

Alle gefüllten und einfachblühenden Pyrethrum-Sorten sind für sogenannte Staudenrabatten von ganz besonderem Werte. Die frühe Blütezeit und der schöne Blütenflor sind nicht genug hervorzuheben. Sie verlangen zum guten Gedeihen einen kräftigen Gartenboden, bei zu grosser Trockenheit zu wässern und auch einige Male an trüben Tagen zu düngen. Ein Verpflanzen und zugleich Verjüngen alter Büsche ist ratsam.

Die Pyrethrum-Varietäten sind die dankbarsten Pilanzen zur Ausschmückung der Gärten. Der prächtige Busch farnähnlicher Blätter ist an sich schon eine Zierde; in der Hauptblütezeit, im Mai-Juni, treiben dann in reicher Masse die langstielighochstrebenden, edelgeformten Blumen, die in den mannigfaltigen Sorten in gefüllten und einfachen Blüten in den reichsten Farben-Schattierungen vertreten sind. Eine zweite Blütezeit ist im August-September. Die abgeschnittenen Blumen sind zur Zimmerschmückung in Vasen oder Sträussen vorzüglich zu verwenden.

Ausgesucht feinste, neue Sorten der letzten Jahre.

Alfred Wermig. Eine dichtgefüllte reinweisse Sorte mit strahligen Blüten auf stark verzweigten Stielen.

Capella. Lilarosa ist der breite Blütenrand, in dem die weisse Füllung eingebettet liegt.

Corona. Siehe Neuheiten 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Delphin. Siehe Neuheiten 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Luna (G. & K.). In allen ihren Eigenschaften ist diese Neuheit das schönste aller gefüllten Pyrethrum! Der äussere, breitblättrige Blütenkranz ist frisch leuchtend reinrosa, von dem sich die kurzgedrungene weisse Füllung ganz scharf abhebt. — In sehr grossen Blumen auf schlanken, kräftigen Stielen ist Luna ausserordentlich reichblühend.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Lord Roseberry. Die leuchtend karminroten Blumen sind dicht gefüllt, wohl eine der schönsten roten Sorten.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Mars. Eine wundervolle, grossblumige Neuhett, deren reinlitarosafarbene Blüten mit kaum merklicher, kleiner Mitte einen Durchmesser von 8—9 cm erreichen und von kräftigen, langen Stielen getragen werden. Eine sehr wertvolle Schnittblume.

Morgenstern. Zierlich gedrehte Blumenblätter, einfach zartlilarosa; sehr früh- und reichblühend.

Orion ist bis jetzt das schönste, einfachblühende Pyrethrum, sehr grossblumig, lila, mit nur kleiner gelber Scheibe, dabei auf sehr langen Stielen blühend.

Othello. Die grossen einfachen Blumen sind von karmoisinroter Farbe mit bläulichem Schein. Die Blumenblätter sind 2 bis 3 reihig angeordnet.

Walküre. Die sehr grossen kirschroten Blumen werden von festen Stielen getragen.

Yvonne Cayeux ist das edelstgeformte, weissgefüllte Pyrethrum, reinweiss mit cremefarbener Mitte.

Pyrethrum hybridum (Fortsetzung).

Die einfachblühenden werden auch: "Bunte Margareten-Blumen" genannt.



Aus unseren Anlagen: Pyrethrum-Feld.

Eine feine Farbenauswahl einfacher und gefüllter Pyrethrum.

Einfachblühende:

Beatrice Kelway. Kirschrot, um die Mitte ein weisser Ring. Beta. Grossblumig, schneeweiss.

Coma. Reinweisse, mittelgrosse Blumen mit gelber Mitte.

Duchesse de Brabant. Violettrosa, grossblütig.

Feuerstrahlen. Grosse und spitzstrahlige Blumen von feurig karminroter Farbe.

Hamlet. Lebhaft rosa. Hellos. Weiss mit lichtfleischfarbenem Anflug.

Macbeth. Karminrot.

Sherlock. Lebhaft karmoisinrot mit reingelber Mitte, sehr frische

Farbe, grossblumig.

Taurus. Zart lilarosa. Auffallende Form mit zierlich gedrehten Blumenblättern.

Tasso. Hellkarmin, weithin leuchtend, kleinblütig. Vivid. Leuchtend karmesinrot.

Gefülltblühende:

Aphrodite. Reinweiss mit langfedrigen Strahlenblüten.
Antinous. Sehr grossbl., reinrosa, sehr lockere spitzstrahlige Form.
Auriga. Hellrosa, auf festen straffen Stielen. Blumenblätter

doppelreihig.

Bellatrix. Weiss mit leicht fleischfarbenem Ton.

Edelweiss. Weiss, halbgefüllt. Gedrungen wachsend.

La vestale. Lila mit silbriger Füllung.

Libra. Teils einfach, teils halbgefüllt, äussere Blumenblätter weiss mit lichtlila Schimmer, Mitte cremeweiss.

Montblanc. Eine der besten weissen. Penelope. Die Randblüten sind weiss mit licht lila Anflug. Zierlich gekrauste Mitte.

Spitzenkrause. Weiss mit zartlila Hauch.

Uranus. Lichtlila.

Venus. Gefüllt, riesenblumig, von zart lila Farbe.

Wega. Federig dicht gefüllt, zart lilarosa.

Obige Sorten kosten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-. Gefüllt und einfach blühende Pyrethrum hybridum in besten Farben und Sorten unserer Wahl: 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Ranunculus aconitifol. fl. albo pl. (Silberköpfchen), blüht in reicher Fülle weissgefüllter Blütchen auf dichtverzweigten Stielen. April-Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

acer fl. pl. (Goldköpfchen). Zierlich goldgelb gefüllte Blütchen auf reichverzweigten Stielen decken in lockerer Fülle die Pflanzen. 30—40 cm. April-Mai. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—amplexicaulis (Hahnenfuss). Die blendend weissen, grossen Blumen erscheinen im Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 speciosus plenus. Dieht gef., goldgelb. 1St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Ess=Rhabarber.

Der echte verbesserte "Queen-Victoria", die feinste Sorte für Kompott. Starke Pflanzen. (Keine Säml.). 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Rheum (Zier-Rhabarber).

Die Zier-Rhabarber machen durch ihren mächtig wirkenden grossen Blätterbusch als Einzelpflanze auf dem Rasen einen vornehmen Eindruck.

Rheum Emodi, mit hochwachsenden, rosa austreibenden, später mattgrünen, grossen, oyalrunden Blättern. Eine der feinsten Pflanzen als Rasenschmuck.

- palmatum fl. rubro mit roten Blütenrispen.
- palm. tanguticum treibt riesengrosse, handartig geschnittene Blätter.

Alle drei Sorten kosten: 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Rudbeckien.

Die Familie der Rudbeckien schenkt uns in ihren reichblühenden Vertretern einen Spätsommer- und Herbstflor, wie wir ihn zur Ausschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt nicht mehr entbehren möchten.



Rudbeckia in Blüte.

Rudbeckia purpurea. Diese rosafarbene Rudbeckia ist eine Schnittblume von auffallender Schönheit für die Zeit von Anfang Juli bis Ende August. Die $1^4/_2-2$ nn hohen Blütenstengel tragen einzeln langgestielte Blumen mit hochkegelförmiger Scheibe und lang herabhängenden Blütenstrahlen von purpurrosa Färbung. 1 St. \mathcal{M} 0,50, 10 St. \mathcal{M} 4,—, 100 St. \mathcal{M} 35,— Rudbeckia nitida "Autumn Glory". Aus der für den Herbstflor so wertvollen Familie der Rudbeckien ist diese Form eine der schönsten mit sehr edelgeformten, prächtigen Blumen mit leicht hängenden Blumenblättern von reingoldgelber Farbe. Die 1—2 m hohen Pflanzen sind verschwenderisch mit langgestielten Blumen überschüttet, die in abgeschnittenem Zustande sich 1-2 Wochen im Wasser halten. Sept.-Oktober.

nitida "Herbstsonne" ist eine Verbesserung von "Autumn Glory". Die grossen goldgelben Blumen sind vollkommener, grösser und breiter in den Petalen, dabei straff in der Haltung und stofflich fest. Sie blüht etwas später als "Autumn Glory". 1 m. Oktober.

laciniata fl. pl. "Goldball", eine neuere Rudbeckia, hochwachsend mit anmutig geformten, dicht gefüllten, aber locker gebauten Blumen. 1,50 m.

Neumanni, trägt eine Ueberfülle lang- und festgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von dunkelgoldgelber Farbe mit tiefschwarzer Mitte. Sie blüht von Juli bis September. 60—70 cm hoch; vorzügliche Gruppenpflanze.

Rudbeckia subtomentosa, blüht im September in reichen Dolden, deren Blüten mit kegelförmiger, braunschwarzer Scheibe zitronengelb gestrahlt sind. 1 m.

Jede Sorte: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30.—

purpurea "Abendsonne" (G. & K. 1907). Nicht nur durch die Prachtfärbung, die ein weithin leuchtendes tiefes Weinrot ist, zeichnet sich diese neue Rudbeckia aus, sondern auch durch die vollkommene kreisrunde und dabei geschlossene, breitblättrige Form der Scheibenblumen, die auf schlanken Stielen gerade nach oben schauen. Anf. Juli-Ende August. $1^{1}/_{2}$ m. 1 St. \mathcal{M} 1,25, 10 St. \mathcal{M} 10,—

F Sagina subulata (Arenaria caespitosa), grüne Rasen bildend mit kleinweissen Sternen im Juni. Ausgezeichnete Rasenersatzpflanze für Talmulden in kleinen Felspartien.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 15,-

Saponaria officinalis fl. albo pl. (Seifenkraut). Eine sehr reichblühende gefüllte Art der Stammsorte. Die Farbe ist im Aufblühen reinweiss und geht später in licht lilarosa über. 75 cm. . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

ocymoides. Zum Bekleiden grosser Steine auf Felsanlagen. Blüht im Juni prachtvoll karminrot. Anspuchslos.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Scabiosa caucasica.

Bei der den ganzen Sommer hindurch währenden Blütezeit erregt die zarte Schönheit dieser Scabiosen immer die besondere Aufmerksamkeit der Besucher unserer Anlagen. Auf schlanken hohen Stielen werden die weichhimmelblauen Blumen getragen, in deren gefälliger Schalenform der innere lichtblaue Blumen getragen, in deren gefälliger Schalenform auch abgeschnitten sich gut halten, liefern sie entzückenden Vassenschmuck. 80 cm. Juni-September. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

- F Sedum (Fetthenne). Eine Gattung dickblättriger Felspflanzen für trockene Lagen, die teils kriechend, teils bis 50 cm hoch wachsend sind und deren hübsche Blütendolden in den Farben gelb, hellrosa, rosenrot und weiss vorkommen.
 - acre, niedrig, gelbblühend . 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 **Aizoon.** 30 cm hoch, gelbblühend.
- Aizoon. 30 cm noch, genommend.

 Fabaria, grosse rosapurpurne Dolden mit blaugrünen Blättern. Lässt sich in voller Blüte verpflanzen. 40 cm. Aug.-Sept.

 Fabaria splend. Abart von voriger mit dunklerer lebhafter Färbung.

 kamtschaticum hat gelbe Blütendolden. Juni-Juli.

 Maximowiczi, blüht dunkelkarminrosa. Juni-Juli.

Obige 5 Sorten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Ausserdem führen wir noch ein weiteres Sortiment niedrig bleibender Sedum-Arten. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-



Blüten von Scabiosa caucasica.

Saxifraga (Steinbrech).

Eine Pflanzengattung, die in ihren Arten eine ausserordentlich reiche Formbildung aufweist, da die Blätter teils gross und dickfleischig, teils reizende Rosetten bildend, teils fein moosartig sind, und so entsteht durch die noch hinzutretende verschiedenartige Färbung eine interessante Mannigfaltigkeit. Sie bieten ein vorzügliches Material zur Felspflanzung.



Hochwachsende rosettenartige Saxifraga.

F Rosettenartige Saxifraga.

Saxifraga Aizoon. Eine überall in den Alpen vorkommende Art. Aizoon minor, gedrungen kurzblättrig, kleine, runde Rosetten bildend.

pyrenaica. Kleinere Form von Aizoon.

altissima, mittelstarkwachsende langstrahlige rosettenbildende Sorte.

cultrata. Die festgeschlossenen Polster sind aus kleinen Rosetten dicht zusammengesetzt.

elatior. Im Wuchs der schönen S. Cotyledon ähnlich.

Hosti, widerstandsfähig, viel rosettig rasenbildend.

intacta minor. Gedrungene Polster, Blätt.langgestreckt.

intermedia, robustwachsende Sorte.

lantoscana superba. Die Blätter dieser Abart sind lang und locker gestellt.

Malyi ähnlich S. Aizoon.


Mac Nabiana. Im Herbst wunderbar rote Färbung annehmend.

Obige 12 Sorten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-Nach unserer Wahl in 1—10 Sorten: 100 St. M 25,—
Saxifraga carinthiaca. Kleine geschlossene spitzstrahlige Rosetten mit auffallend kalkkrustigen Blatträndern.

Cotyledon pyramidalis hat schöne grosse Rosetten, bringt grosse breitästige Blütenrispen, bis 60 cm hoch werdend.

- lingulata superba. Ueber den schönen, graugrünen, kalkkrustigen Blattrosetten erheben sich im Mai, etwa 40 cm hoch werdend, die blendend weissen Rispen. Ausserordentlich reichblühend. Wunderbar auf Felspartien. Auch für den Blumenschnitt wertvoll.
- nivalis. Die schmal lanzettlichen Blätter sind auffallend graugrün und bilden strahlige Rosetten. Selten. Preise siehe oben rechts!

Saxifraga valdensis. Die kleinen runden Rosetten bilden feste Polster zwischen den Steinen. Eine seltene Alpenpflanze.



Moosartige Saxifraga.

F Moosartige Saxifraga.

Saxifraga Camposi. Blendend weiss, sehr grossblumig.

- groenlandica. Lockere Rasen bildend, weissblühend.
- hypnoides, frühblühend, weiss.
- " purpurea hat leuchtend purpurrosa Blumen.
- muscoldes, niedrige weissblühende Art.
- Rhei. Hübsche gedrungene Polster bildend mit rosa Blüten.
- " superba. Eine Verbesserung der vorigen Sorte, zeichnet sich durch grössere frischrosa Blüten aus. Für grosse Trupps auf Felspartien.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- kermesina (Guildford Seedling). Blumen im Aufblühen tiefdunkelrot 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Stansfieldi. Ueber der hellgrünen rasenbildenden Pflanze erscheinen im April-Mai die kleinen weissen Blütensterne in reicher Zahl.
- **Sternbergi.** Spätblühende, gedrungen wachsende, grossblumige weisse Varietät.

Alle nicht mit Preisen versehenen moosartigen Steinbrech kosten: 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 22,50.

F Verschiedene Steinbrech-Arten.

Saxifraga hybrida "Blütenteppich" Siehe unter Neuheiten S. 8. hybrida "Purpurmantel"

oppositifolia major. Die kaum wenige cm hochwerdende kriechende Pflanze bringt im März-April auffallend grosse, leuchtende purpurrosa Blüten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- oppositifolia splendens ist in der Farbe feuriger. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- sancta. Die kaum 5 cm hochwerdenden Blütenstände bringen dunkelgelbe Blumen. Ueber Felsen hängend und feste Polster bildend. Alle 3 Sorten nur für Felspartien ge-. . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- umbrosa (Porzellan-Blümchen), ist eine ausgezeichnete Pflanze zur Ausschmückung halbschattiger Plätze. Anspruchslos. Die Blütenrispen werden 30 cm hoch.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

F Sempervivum (Hauslanch). Diese Gattung reizender Felspflanzen umfasst eine Menge von Arten und Spielarten, deren fleischige Blätter dachziegelförmig gelagert eine reiz. Rosette bilden in den verschiedensten Farbenschattierungen und Zeichnungen von hellgrün mit weiss, dunkelgrün, blaugrün, bräunlich etc. Auch die Blüten sind sehr hübsch und mannigfaltig.

10 St in 10 Sorten unserer Wahl *M* 2,50 100 St. in 5—10 Sorten *M* 20,—

- Senecio Clivorum (Kreuzkraut). Die stark verzweigten Blütenstiele tragen eine grosse Dolde dunkelgelber Randblüten und stehen frei über den grossen herzförmigen Blättern.
- "Veitchianus Neu! Ueber den grossen herzförmigen Blättern erheben sich im August die kräftigen bis 1, 0 m hohen Blütenstiele, in langen Rispen leuchtend gelber Strahlenblüten. Einzelpflanze für feuchte Orte.
- "Wilsonianus. Neu! Achnlich der vorigen Sorte, nur grösser werdend. Blüten von dunklerer Farbe. Alle 3 Senecio-Arten sind prachtvolle Pflanzen für Uterpartien. Alle 3 Sorten: 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—.
- Sidalcea Rosy Gem ist eine malvenartige, in zierlich verzweigten Rispen blühende Staude mit rosafarbenen Blüten. Juli-Aug. 80—100 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- F Silene acaulis ist mit ihren kleinen, leuchtend rosaroten Blütchen, die an kurzen Stielchen über dem dichten, moosartigen Polster erscheinen, eine ganz reizende Alpenpflanze. Mai-Juni 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- F , acaulis alba. Wie die vorige mit reizenden weissen Blütchen. 1 St. \mathcal{M} 0,40, 10 St. \mathcal{M} 3,50
- F , acaulis fl. pl., mit rosaroten gefüllten Blütchen über dem niedrigen dicht n Polster . . . 1 St. ${\cal M}$ 0,50, 10 St. ${\cal M}$ 4,—
- F, alpestris (Leimkraut), eine niedrige, dichtwachsende teppichartige Pflanze, die im Mai mit weissen Blüten dicht bedeckt ist. 10—15 cm..... 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
- F, Schafta. Die rosafarbenen Blüten erscheinen im August 10 cm über der lockeren rasenbildenden Pflanze.

 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- FSoldanella alpina ist ein liebliches Alpenpflänzchen für feuchtschattige Stelle. Aus dem lederartigen, tiefgrünen Laubkissen ragen die zierlichen, gefransten glockenartigen Blütchen.

 1 St. M 0,50, 10 St. M 4.—
- **Solidago aspera** (*Goldrute*), ist sehr feinverzweigt, mittelhoch wachsend, mit frischgelben Blütenfahnen. 80 cm. August-September 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
 - "

 elliptica mit niedrigen, goldgelben Blütenrispen. 30—40 cm.

 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

 Shortii. Diese prächtige Schmuckpflanze wächst 1,50 m
 hoch und hat leichte, federig aussehende, goldgelbe Blütenrispen. August-September. . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
 - " virgaurea nana (Zwerg-Goldrute). Gedrungen wachsend, mit Dolden goldgelber Blüten. 40 50 cm. August-Oktober. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Spiraea Aruncus ist durch ihren herrlichen Wuchs gleich schön auf Rabatten und als Gruppenpflanze auf Rasen. Die langen, federartigen Rispen sind aus zahlreichen kleinen weissen Blumen zusammengesetzt. Die Pflanze gewährt einen prächtigen Anblick. 1 m. Juni bis August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- " filipendula fl. pl. bildet lockere Sträusse blendend weisser dichtgefüllter Blüten, die sehr gutes Schnittmaterial abgeben. Die Pflanzen lieben einen feuchten Standort und sind zur Ausschmückung von Teich- und Sumpfrändern empfehlenswert. 50 cm. Juli 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- " palmata, karmoisin-purpurrote Doldentrauben und tief braunrote Blüten- und Blattstiele. 60 cm. Juni-Juli.
- 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 palmata alba, eine kräftig wachsende, reinweisse Spielart der vorigen 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- " Ulmaria fl. pleno. Die schönen weissen Blüten sind dicht gefüllt, im Juni blühend. 80 cm 1. St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Statice latifolia (Blau-Schleier), treibt aus der grossen Blattrosette hohe, verzweigte Stengel, deren hängende Spitzen schleierartig die unzähligen blauen Blütchen tragen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlangt leichte Bedeckung im Winter. 50—60 cm. Juni-September 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Statice Limonium wächst 60 cm hoch mit grossen Köpfen blauer Blütchen und ist am Meeresstrand heimisch.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- Stenanthium robustum. Aus der lanzettlichen, 30—40 cm hohen Belaubung erscheinen im Juli-Aug bis über 1 m die reichverzweigten Blütenrispen, die dicht mit kleinen weissen Sternblünrchen besetzt sind. Liebt Halbschatten. 1 St. M 1,50
- Telekia speciosa (Buphthalmum). Eine kräftig wachsende und anspruchslose Blattpflanze Die grossen gelben Scheibenblumen erscheinen im Juli-August in reicher Zahl. 150 cm.

 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- Thalictrum adiantifolium (Farnraute), eine zierliche farnähnliche Pflanze, deren Blätter Ersatz für das feine Adiantum-Farn bieten und zur Straussbinderei vorzüglich zu verwenden sind 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
 - " aquilegifolium purpureum (Akelei Raute), mit straffen, 70 bis 80 cm hoch aufwachsenden Blütenstielen mit roten Blütenköpfen. Das Blattwerk ist akeleiart g.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- " dipterocarpum. Siehe unter Neuheiten Seite 8.
- " flavum ist eine schöne Blütenstaude mit blaugrünen Blättern, deren kräftige, zahlreiche, 75 cm hohe Blütenstiele leichte Scheindolden lockerer schwefelgelber Federblumen tragen. Juli-Aug. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- minus. Bis 80 cm hochwachsende Art. Im Juni mattgelbe, zierliche Blütensträusse bringend 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- , polygonum, wird ca. 1 m hoch und bildet lockere Sträusse cremeweisser Blüten. Die Belaubung ist graugrün. Juni.

 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- Tradescantia virginica purpurea. Ueber der schilfartigen Belaubung stehen auf 40 cm hohen Stielen purpurrote Blüten vom Mai bis August. Anspruchslos 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- FThymus lanuginosus (Thymian). Eine alle liebste Felsenpflanze mit grauem Blattwerk. Polsterbildend.
- F " Serpyllum albus. Im Juni ist der niedrige Teppich mit weissen Blüten bedeckt.
- F, Serpyllum coccineus. Für Felspartien ist diese wie auch die vorhergehende Sorte geschaffen, ruhige, teppichartige Stellen zu bi:den Rotblühend. Juni.

 Obige 3 Sorten: 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Trillium grandiflorum (Waldlilie), die sogenannte amerikanische Gehölzlilie, ist eine reizende Pflanze zur Verwendung an schattigen, aber feuchten Plätzen. Diese Blätter sind Maiblumen ähnlich, während die dreiblättrigen, flachen Blumen wie Schmetterlinge über dem Laubwerk schweben. 40 cm. Mai-Juli 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Tritoma

(Kniphofia, Tritomanthe).

Die Tritomen sind bei ihrer Reichblütigkeit und dem schönen eigenartigen, leuchtend orangefarbenen Blütenkolben im Herbst sehr beliebte Schaustücke für den Garten, auf dem Rasen oder in Rabatten stehend, und liefern prunkende Blumenstücke für das Zimmer.

Die Tritomen müssen alle im frostfreien Raum überwintert oder im Freien sorgfältig geschützt werden, Frühjahrspflanzung geboten.

Tritoma corallina, korallenrote Blütenkolben, niedrig.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

- "Mac Owani, niedrig . . 1 St. M 0,60, extra stark M 1,— Chloris aprikosengelb 1 St. M 0,75
- , Chloris, aprikosengelb 1 St. \mathcal{M} 0,75 Dbelisque, chromgelb 1 , , 0,90
- "
 Uvaria floribunda. Die korallenroten Blütenkolben werden von kräftigen Stengeln getragen. Schr reichblühend. 130 cm.
 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- " Uvaria grandiflora-Hybriden, 1 St. M 0,60, extra stark M 1,20, 10 St. M 5—10
- hybrida "Express" ist eine besonders wertvolle, frühblühende Neuheit, die durch Kreuzung mit Tritoma Tuckii entstanden, diese an Schönheit weit übertrifft und schon Anfang Juli in voller Blüte steht.

 Starke Pilanzen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Trollius (Trollblumen).

Da die Trollblumen in ihrer edlen Erscheinung mit den golddurchfluteten Blumen zur schönsten Frühjahrszierde des Gartens und als Schnittblumen auch der Wohnung gehören, so haben wir seit Jahren in aller Stille an der Bereicherung dieser Schönheit gearbeitet und können nun eine erlesene Auswahl neuer, verschiedener Sorten anbieten.



Grossblumiger Trollius in natürlicher Grösse aufgenommen.

Eigene Züchtungen.

"Electra". Grossblumige, orangefarbene Kugelform, deren innere Honigblätter rot sind. 50—60 cm hoch.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

"Fackel". Hochgebaute, langgestreckte offene Blumen, leuchtend orangerot. 60—70 cm hoch . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

"Feuertroll". Blendend orangerot in hochgebauter Blütenform. 60—70 cm hoch 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"Flamme". Auf sehr schlanken und hohen Stielen stehen die äusserst zierlichen, orangefarbenen Blüten, welchen die langgestreckten Honigblätter noch ein besonders lockerduftiges Aussehen geben 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

"Goldrose". Neu! Sehr grosse Blumenbälle von lockerer gefälliger Form und gelboranger Farbe bildend, aus denen die orangeroten Honigblätter heraus leuchten. Reich- und frühblühend.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Neue Trollblumen eigener Zucht.

"Götterfunke". Aus orangegelber offener Schale leuchten in heller Wirkung rote Honigblätter scharf heraus. 60—70 cm hoch 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

"Helios". Grosse, kugelförmige, reingelbe Blumen, reichblühend auf verzweigten Stielen. 50—60 cm hoch.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

"Leuchtkugel". Die orangeroten Blütenbälle stehen in reicher Farbenfülle und gleicher Höhe frei ausstrebend an straffen Stielen über dem dicht gedrungen wachsenden Laubbusche. Diese Neuheit wird einmal eine Gruppensorte ersten Ranges werden. 30—40 cm hoch . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

"Lichtball". Besonders grosse, festgeschlossene Kugeln, orangegelb, auf straffen, 50—60 cm hohen Stielen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

"Orangeglut". Scharf leuchtend rötlich orange in halboffener nelkenartiger Form. 50—60 cm hoch.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

"Salamander". Auf vielverzweigten, kräftig langen Stielen blüht diese Sorte auffallend reich mit satt orangefarbenen, locker gebauten Kugeln. 60—70 cm hoch.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

"Schwefelglanz". Blume locker gebaut, hellgelb, grossblumig. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Verschiedene Trollblumen-Arten.

Trollius americanus, mit kugelig gewölbten, hellgelben Blumen 1 St. *M* 0,50, 10 St. *M* 4,— 100 St. *M* 35,—

" caucasicus, mit hochgebauten, halbkugeligen, hellorangefarbenen Blüten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" caucasicus sulphureus mit halbkugeligen gelben Blumen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

. europaeus mit kleinen, zitronengelben, kugeligen Blumen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

"Goldkugel" ("Golden Gate"), mit lichtkanariengelben Kugeln...... 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

"Orangekugel" (Orange Globe). Grosse, gelborangefarbene Kugeln auf schlanken Stielen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

, japonicus plenus. Aus dem Busch der schöngeformten Blätter erheben sich, frei ausstehend, zahlreiche Blütentriebe mit einzelnen lang- und festgestielten Blüten von halbgeschlossener Form und so leuchtender, durchscheinend orangeroter Farbe, dass sie selbst auf weite Entfernungen das Auge anziehen. 75 cm. April-Mai.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Hybriden. In diesen aus Samen gezogenen Hybriden kommen in Mischungen nur vollkommene Formen in gelben und orange Farbenschattjerungen vor, mehrjährige Pflanzen 75 cm. April-Mai 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

pumilus yunnanensis. Siehe unter Neuheiten Seite 8.

Tropaeolum speciosum. Eine winterharte Kletterstaude von sehr dekorativem Wert. Die Pflanzen treiben lange Ranken, die mit den unzähligen leuchtendroten Blüten überraschend wirken. Ein nahrhafter, feuchter und tiefgründiger Boden und ein halbschattiger Standort sagt den Pflanzen am besten zu. Zum Winter sterben die Ranken ab und treiben im Frühling neu aus 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Veratrum nigrum (Germer) zeichnet sich durch prächtige Gruppierung der grossen, hellgrünen, gerippten Blätter aus. Die schwarzroten Blüten stehen auf graufilzigem Stengel. Verlangt Halbschatten. 100 cm. Juli 1 St. M 0,75

Verbascum (Königskerze).

Alle Königskerzen-Arten sind prächtige, wirkungsvolle Schmuckstauden, die sich, zu grösseren Trupps vereinigt, als auch zur Einzelpflanzung ganz vorzüglich eignen. Für grosse Parks und für den Hausgarten gleich wertvoll.

Verbascum densiflorum (Neu!) ist eine reich verzweigte Königskerzenart von 1 m Höhe. Die Farbe der mittelgrossen Blumen ist kupfriggelb mit dunklerem Zentrum. Juli-August.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

giganteum. Mit prächtigen, besonders grossen, silberweissen Blättern und bis 2 m hohen goldgelben Blütenpyramiden 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Harkness Hybrid. Neu! Aus den Rosetten wollig grüner Blätter entwickeln sich im Juli kräftige Blütenstengel. Die sehr grossen Blumen sind von einer leuchtend gelben Farbe und erscheinen vom Juli bis September in reicher Fülle. 150—180 cm 1 St. M 1,25, 10 St. M 11,—

hybr. Caledonia. Neu! Die grossen Blüten sind bräunlich lachsfarben und von eigenartiger Schönheit. Starkwachsend. Juli-August 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

hybr. Mars. Neu! An den ca. 150 cm hohen Blütenstielen erscheinen im Juli die grossen isabellfarbigen Blumen, die nach der Mitte zu rötlich werden . 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—

olympicum. Eine stattliche Dekorationspflanze mit grossen, silberweissen Blättern in Rosettenform, bildet eine prächtige, ca. 1,50 m hohe Blütenpyramide mit gelben Blüten. In grossen Anlagen ist Verbascum olympicum, zu einer Gruppe vereinigt, von wunderbarer Wirkung . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

pannosum. Diese gelbblühende Königskerze erreicht eine Höhe von 150 cm und bildet sehr lange, weissfilzige Blätter. Sehr dekorativ. Juli-August . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

F Veronica (Ehrenpreis).

- Veronica alpina (= V. orientalis). Die kriechende, für Felspartien so recht geeignete Pflanze ist mit zierlich-kleinen, blauen Blütenähren dicht bedeckt. 15 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

 - amethystina, ist von gedrungen aufstrebendem Wuchs und trägt eine Fülle von zierlichen Blütenähren, die von leuchtend amethystblauer Farbe sind. 40 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
 - gentianoides fol. var., schmückt den ganzen Sommer hindurch mit seinem niederen Busche hübsch weissbunter Blätter, der im Mai mit zierlichen lichtblauen Blütenähren

überdeckt ist. 30 cm.
1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—

Hendersoni. Es ist dies der schönste "Ehrenpreis" mit dichten, grossen Blütenähren von gesättigt tiefblauer Farbe. Die Pflanze wächst kräftig mit üppigem Laube und blüht

sehr reich mit ihren grossen und doch schlank aufstrebenden Blütenähren, die sich — abgeschnitten — lange Zeit im Wasser frisch halten. 50—60 cm. Juli-August. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

incana. Die Blätter bilden einen niedrigen, wohlgeformten Busch und sind von leuchtend silberweisser Farbe, von der sich die reizenden Blütenähren in der vorteilhaftesten Weise abheben. 30 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

longifolia rosea, hat reichverzweigte Blütenrispen, von hellrosa Farbe. Juni-Juli. Anspruchslos.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Veronica rupestris. Die leuchtend amethystblauen Rispen erscheinen im Juni-Juli und bedecken die kriechenden Rasenpölster vollständig. Auf Felspartien zu grösseren Trupps vereinigt oder kleinere Mulden damit ausfüllend; während der Blüte von bestechender Wirkung. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

saxatilis rosea, rosafarbig. 20 cm hochwerdende Trockenheit liebende Staude für Felspartien.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

spicata, mit hohen, schlanken, blauen Aehren. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

rosea. Eine rosenrote Abart der vorigen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Vinca minor (Sinngrün). Das Immergrün, das sich vorzüglich als Rasenersatz eignet, wo Rasen wegen Trockenheit oder Schatten nicht gedeiht. 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 18,-

variegata mit weissbunten Blättern.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Viola cucullata grandiflora (Pfingstveilchen). Die geruchlosen Blumen sind gross und tief dunkelblau auf langen Stielen. Für Halbschatten und Einfassungen.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-

cornuta-Varietäten. (Hornveilchen.) Grossblumige Hornveilchen-Spielarten, entstanden durch Kreuzungen von Viola cornuta mit Stiefmütterchen, die ausdauernd sind und in dichten Büschen vom Frühjahr bis Herbst blühen. Ein Rückschnitt im Juli gibt volle Blüte bis spät zum Herbst. Lieferbar in reinen Farbensorten in blau, gelb, lila, weiss usw. . . . 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—

Viola cornuta "G. Wermig".

(Sommerveilchen.) Dieses Viola cornuta hat eine so reine veilchenblaue Farbe, dass ein Bund seiner Blüten, mit Veilchenblättern umgeben, einen herrlichen Strauss grossblumiger Veilchen im Sommer vortäuscht. Es blüht un-endlich dankbar in blauer Menge von Mai bis Frosteintritt. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,

odorata (Wohlriechendes Veilchen). In verschiedenen Sorten, grossblumig, violettblau, weiss und auch rosa, alle einfachblühend; ferner noch dichtgefüllt in blau.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

odorata "Deutsche Perle". Kompakt wachsend und ohne Ranken. Die aufrechten Blumen stehen frei über dem Laub und sind tief dunkelblau.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

fl. albo, weissblühend . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

"Königin Charlotte". Eine vorzügliche Treibsorte mit dunkelblauen Blumen. Die grosse Reichblütigkeit und der gute Herbstflor machen diese Sorte besonders 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Perle rose, rosablütig. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Wahlenbergia grandiflora. (Platycodon, Campanula). Die auffallend grossen, flach schalenförmigen Blüten von dunkel-blauer Farbe bilden an hohen Blütenschäften eine lange Traube. 75 cm. Juni-August.

grandiflora alba, eine Spielart der vorigen, weissblühend.

- Mariesi, eine sehr wertvolle Zwergform der vorigen, deren grosse schalenförmige, prächtig blaue Glocken-blumen in verschwenderischer Fülle die gedrungen wachsende Pflanze bedecken.
- Mariesi alba, eine neue weisse Form der vorigen, ebenfalls niedrig.

Obige 4 Sorten kosten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

macrantha. Die Blumen dieser neuen Spielart sind noch grösser als diejenigen von Mariesi, auch wächst die Pflanze etwas höher . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Yucca (Palmlilie).

Yucca filamentosa ist eine prächtige Pflanze zur Einzel- oder Gruppenpflanzung auf dem Rasen oder auf grösseren Felspartien. An den Rändern der starren, lanzettlichen Blätter hängen weisse Päden, während die hochstrebende Blattrosette einen dracaenenartigen Eindruck macht. Im Juli dann blüht sie mit hochaufstrebenden, schlankgestielten Rispen, aus grossen glockenartigen hängenden weissen Blumen gebildet. Nur bei strenger Kälte ist etwas Winterschutz nötig. — Wir liefern nur kräftige Pflanzen mit festen Topfballen, die sofortiges Weiterwachsen sicherstellen. 1 m. Juli-August. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—karlsruhensis. Neu! Hybride zwischen Y. filamentosa und glauca, diese hat von Yucca glauca die blaugraue Farbe und Gestaltung, die biegsame Form und die Fäden von Y. filamentosa. Die Form erinnert an Dasylirion. Je nach Stärke: 1 St. M 1,50-3,00



Gynerium argenteum.

Bambusa aurea, je nach Stärke M 5,— bis M 20,— Metake \

Arundo Donax (Pfahlrohr). Die mächtigen Schäfte dieses Grases treiben bis zu 2 m hoch mit breiten, schweren Blättern, wo durch die Pflanze ein hervorragender Schmuck auf Rasen oder an Wasserpartien wird.

In Töpfen: 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-

- Donax fol. var., mit cremefarbig gestreiften, bunten, breiten Blättern. Es ist entschieden das feinste Ziergras für den Rasen, muss aber nach dem Absterben der Blätter vor Eintritt des Winters herausgenommen u. frostfrei überwintert werden. Kräftige Pflanzen in Töpfen: 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—
- Phragmites fol. var. (Schilfrohr), ein halbhohes, hübsches Ziergras mit leuchtend weissbunten Blättern, winterhart 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
 Phragmites fol. aureis var. Neu! Eine gelbbuntblättrige
- Form, 1,50 m hoch 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,-



Yucca filamentosa.

Ziergräser.

Die schönen Ziergräser bilden in Einzel- oder truppweiser Pflanzung einen besonders wirkungsvollen Schmuck der Rasenplätze, während sie dem Uferrande von Gewässern erst den rechten Charakter verleihen.

Gynerium argenteum (Pampasgras). Im Herbstschmucke der hohen, weissen Blütenfahnen über dem impo-

santen Grasbusche ist das Pampasgras von unvergleichlicher Wirkung. Gibt man den Pflanzen einen guten Winterschutz, so werden sie im Laufe der Zeit wahre Riesenschmuckstücke. Nur durch Teilung echt vermehrte Sorten gewährleisten sicheres Blühen und bieten wir deshalb nur solche (keine Sämlinge) hierunter an:

"Soyeux nain" (Bertini), reichblühend mit grossen Fahnen auf halbhohen Schäften . . . Topfpflanzen: 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
Extra starke Topfpflanzen: 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50

"Argenteum elegans" mit hohen weissen Fahnen.

Topfpflanzen: 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— Extra starke Topfpflanzen: 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

"Rendatleri" mit mattsilbrig rosafarbenen Blütenfarben.

,,Roi des Roses" Neu! 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Winterharte Bambusa.

Die Bambusen werden bei richtiger Pflege nach einigen Jahren imponierende Schmuckstücke des Gartens. Sie verlangen während der Wachstumszeit bis zum Spätherbst reichliche Wasserzufuhr. Die hier angeführten Sorten sind zwar winterhart, doch ist es erfahrungsgemäss gut, sie bei strenger Kälte zu schützen und auch den Erdboden mit Laub abzudecken.

Sonniger gegen Nordostwinde geschützter Standort ist der beste. Pflanzung nur im Frühling.

Cyperus longus (Cypergras). Die braunen doldenständigen Blüten-ähren werden 60—80 cm hoch. Dekoratives Gras. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Eulalia japonica gracillima univittata, eine zierliche Einzelpflanze für den Rasen und eine prächtige Zierde um den Rand von Springbrunnen usw., die schmalen grünen Blätter durchläuft in der Miite ein silberweisser Streifen

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
japonica zebrina, quergestreift, zebraähnlich mit gelben
Linien 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

jap. zebrina stricta, übertrifft die alte Zebrina in allen Vorzügen, da die straffen Triebe derselben besonders haltbar sind und die goldbunten Querstreifen auffallend leuchtend wirken, auch ist sie nicht empfindlich im Winter. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

FFestuca glauca (Schwingel), ein zu Einfassungen sehr geeignetes Gras m. blaugrün. pfriemart. Blättern. 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,— punctoria (Stechschwingel). Von intensiv blaugrüner Färbung

sind die starren scharfspitzigen Blätter. Liebt trockene Plätze.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Glyceria spectab. fol. var. (Quellgras). Dieses neue, goldbunte

Gras ist das schönste und wertvollste aller niederen und halbhohen Gräser. Die reine, goldbunte Färbung hält den ganzen Sommer durch und sind die Triebe besonders gut in Blumensträussen zu verwerten . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Imperata sacchariflora. Ein kräftig wachsendes Schmuckgras, dessen federige Blütenfahnen für Garten- und Zimmerschmuck gleich zierend sind 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Melica altissima (Perlgras). Die 50-60 cm hohen Blütenrispen sind silberweiss 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Phalaris arundinacea var. picta, das weissbunte Bandgras 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Winterharte Heidekräuter.

Es liegt ein eigener Reiz in der lieblichen Schönheit der Heidekräuter, dem jeder unterliegt, der im Anschauen die Anmut dieser zierlichen Gebilde auf sich einwirken lässt. Die Heidekraut-Arten gedeihen am besten, wenn dem Boden etwas Heide- oder Moorerde zugemischt wird, doch nehmen sie auch schon mit gewöhnlichem Boden fürlieb.



Erica cinerea in Blüte.

Calluna (Heidekraut).

Was wir hier unter Calluna anbieten, sind Abarten unserer einheimischen Heide, sie sind vollständig winterhart. Ein ganz leichter Winterschutz mit Tannenzweigen ist vorteilhaft.

Calluna vulgaris Alporti. Schlanke rotblühende Rispen über

graugrünem Laube. Juli-August.

argentea mit grauen Trieben u. rosa Rispen. Juli-Aug.

aurea, die schlanken Triebe sind leuchtend gelbgrün und tragen hellilaweisse Blütchen. Juli-August.

elata mit graugrünen Trieben und rahmweissen Blütchen. Juli-August.

Hamiltoniana, hoch wachsend mit zierlichen, dünnen Trieben u. weissen Blütchen. Juli-Aug.

"
Reginae ist fein belaubt mit langen, spitzen, weissen Blütenähren. Juli-August.

"
Searly hat weisse Blütenrispen und graugrünes Laub. August-September.

Obige Sorten kosten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—,

100 St. in Sorten M 35,-

Daboecia (Irländische Heide).

Herrliche, myrtenblättrige, während des ganzen Sommers blühende Heide. Traubenartig, an den Spitzen blühen die grossen, hängenden Glocken in rosa und weiss, an Maiglöckehen erinnernd. Verlangen guten Winterschutz.

Daboecia polifolia mit roten Traubenglocken. Ende Mai bis Juli . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

alba mit weissen, grossen Blütenglocken. Ende Mai-Juli . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

grandiflora. Die Blütentraube ist aus be-

sonders grossen, dunkelweinroten Blütenglocken gebildet. Ende Mai-Juli.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
bicolor trägt rote und weisse Blütenglocken.

Ende Mai-Juli . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Erica (Glockenheide).

Erica carnea. Eine frühblühende Erica, die ihre lebhaft fleischfarbenen Blütenglöckehen in grossem Reichtum öffnet, sobald nur etwas mildes Wetter im Frühjahr eintritt, während sie ihre Hauptschönheit im April-Mai in ihrem vollen Flor entfaltet. Sehr anspruchslos. Für Felsenanlagen oder Einfassungen immergrüner Gruppen geeignet.

carnea alba ist eine reinweisse entzückende Form der vorigen 1 St. # 0,60, 10 St. # 5,-

carnea rubra. Eine aufrechtstrebende, sehr lebhaft rot-

rosenroten Blüten. Juni-Juli.

*, ciliaris mit fein bewimperten rosa Blütchen. Juni-Juli.

*, mediterranea hybrida. Frühblühend, mit dunkelrosa Blütchen. Mai.

Tetralix alba (Torfheide). Die Zweige sind silbergrau, mit gewundenen Nadeln und tragen einen dichten Kopf weisser Glöckchen. Juni-Juli. Mackayi. Die Blütenköpfchen sind zartrosa. Juni

bis Juli.

rubra mit rosafarbenen Blütenköpfchen. bis Juli.

* Erica Vagans, frisch rosafarbene Blütenrispen an den Spitzen kräftiger Zweige.

vagans alba mit wachsweissen Aehren. Juni-Juli.

" rubra mit dunkelrosafarbenen Blüten.

Watsoni. Die Zweigspitzen enden in einem Kopf rosafarbener Blütenglöckchen. Juni-Juli.

Alle mit Stern bezeichneten Glockenheiden verlangen gute Deckung mit Tannenreisig.

Obige Sorten kosten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. in 10 Sorten unserer Wahl M 35,-.



Form von Erica Tetralix.

Winterharte Freilandfarne.



Aspidium angulare-Form.

Wie mannigfaltig die Schmuck-Anwendung der vielseitig schönen Formen der Farne in den Gärten sein kann, wollen wir versuchen in Kürze anzudeuten.

Zur Ausschmückung schattiger Stellen, Belebung von Felspartien, Unterpflanzung lichter Gehölz- und Baumgruppen, Vorpflanzung vor Gehölze sind die Farne in geschlossenen Gruppen passender Arten oder in Anwendung kleinerer Einzeltrupps von malerischer Wirkung. Man denke sich unsern Straussenfarn (Struthiopteris germanica) oder die Schildfarn-Formen (Aspidium), den auffallend schönen Schleier-Farn (Adiantum pedatum), die verschiedenartigen Frauenfarne (Athyrium) und den Königsfarn (Osmunda regalis) in solcher Anwendung.

Auf schattigen Rabatten bilden die Farne einzeln oder in kleinen Einzeltrupps wohltuende grüne Schmuckpunkte zwischen den Stauden.

Für feuchte, schattige Stellen, an denen die meisten Farne am besten gedeihen, ist die Auswahl am grössten: Adiantum pedatum, die gesamten Aspidium-Arten, Athyrium fil. fem.-Arten, Blechnum Spicant, Onoclea, Osmunda, Scolopendrium und Struthiopteris.

An feuchten, sonnigen Plätzen, an Bach- und Weiher-Ufern usw. gedeihen der Königsfarn (Osmunda regalis), der Straussenfarn (Struthiopteris) und der Sumpf-Farn (Onoclea sensibilis).

Für sonnige Rabatten: Der Straussenfarn (Struthiopteris) und Osmunda Claytoniana.

In trockenen, schattigen Lagen, bei denen aber der Boden gut mit Torf vermischt sein muss, gedeihen: Athyrium-Arten, Aspidium acrostichoides und Osmunda Claytoniana; sie alle aber werden in feuchtschattigen Stellen üppiger.

Wir raten bei der Pflanzung von Farnen dem Boden durchweg feuchten groben Torf oder Heideerde beizugeben.

Wildwachsende Farne.

Einheimische, amerikanische und japanische Arten. Mit * sind wintergrüne Arten, deren Blätter erst im Frühling absterben.

Adiantum pedatum (Schleierfarn).

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

* Aspidium acrostichoides (amerikanischer Schildfarn).

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

aculeatum (stachliger Schildfarn).

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Braunii (Brauns Schildfarn).

1 St. M 0,90, 10 St. M 8, Aspidium erythrosorum (syn. Lastraea corusea). Junge Wedel rötlichbraun mit rot durchscheinenden Fruchthäutchen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,

Fllix mas (Wurmfarn) . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Lonchitis (scharfer Schildfarn).

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

setosum (borstiger Schildfarn).

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

spinulosum (*Dornfarn*) 1 St. *M* 0,40, 10 St. *M* 3,50

Athyrium Filix femina (Frauenfarn). 1St. M0,35, 10St. M3,—

* Asplenium Trichomanes (braunstieliger Milzfarn).

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

viride (grünstieliger Milzfarn).

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

* Blechnum Spicant (Rippenfarn). 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Cystopteris bulbifera (Blasenfarn). 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

fragilis 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

* Cyrtomium Fortunei 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Onoclea sensibilis (Sumpffarn) 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Osmunda cinnamomea " Claytoniana

(amerikanische Königsfarne).

gracilis

alle 3 Sorten: 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-Osmunda regalis (Königsfarn) 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,— Polypodium Dryopteris (Eichenfarn). 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— " Phegopteris (Buchenfarn) 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

" vulgare (Engelsüss) . . . 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Pteris aquilina (Adlerfarn) . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Struthiopteris germanica (Straussfarn). 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" japonica (japanischer Straussfarn).

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

* Scolopendrium vulgare (Hirschzunge). Dieser Farn ist als ältere Pflanze sehr widerstandsfähig und zur Anpflanzung in unseren Gärten besonders zu empfehlen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 30,-



Scolopendrium vulgare_undulatum.

Winterharte Freiland=Farne (Kulturformen).

Unsere Sammlung von Freiland-Farnen umfasst über 200 verschiedene Sorten, doch können wir im Katalog nur immer diejenigen anführen, von denen für den Allgemein-Gebrauch genügender Vorrat ist. — Alle mit ** versehenen Kulturformen sind wintergrün.



Athyrium (Kulturform).

Aspidium (Schildfarn).

Die Aspidien-Formen sind mit ihren wintergrünen, zum Teil sehr langen Blättern ein hervorrag. Schmuckmaterial schattiger Plätze. Besonders erfreuen uns die Wedel im Spätherbst mit ihrem saftig frischen Grün

*Aspidium angul. capitatum.

```
1 St. M 1,- 10 St. M 9,-
angulare congestum. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,
    cruciato-polydactylum. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,
     divisilobum
                         . 1 St. 11 0,75, 10 St. 11 6,
     divisilobum grande
                          . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-
                           1 St. M 1,-, 10 St. M 9,
     frondosum.
                           1 St. M 2,-
     nitescens. .
                          . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,
     percristatum. . .
     perserratum.
                           1 St. M 1, -, 10 St. M 9,
                          1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
     polydactylum.
          grande.
     revolvens.
                        . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-
```

dilatatum gracile. Eine zierliche, feinblättrige Abart des schönen, besonders im Schwarzwald vorkommenden Farnkrauts. . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Filix mas fluctuosum cristatum.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

```
gracilis . . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

grandiceps. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

linearis. . . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

polydactylum 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

(Wills) . . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

(Dodds) . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

propinquum crispum.
```

" cristatum 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-" St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Athyrium Filix femina-Varietäten.

Die Frauenfarne bilden in ihren Varietäten mit den verschiedenartigsten Wedeln eine grosse Gruppe. Sind sie doch so abwechslungsreich und mannigfaltig, dass wir diese monströsen Arten jedem Liebhaber empfehlen können. Allerdings schon im zeitigen Herbst bräunen sich die Blätter und sterben ab.

Athyrium fil. fem. angust. cristat. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

```
fil. fem. congestum laciniatum.
                                         1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
                                         coronatum.
                                          1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
                                         corymbiferum.
                                          1 St. M 0,75, 10 St. M 6,
                                         Craigii laciniatum.
                                          1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
                                         cruciatum.
                                         1 St. M 0,60, 10 St. M 5,
                                         cruciatum cristatum.
                                         1 St. M 1,25, 10 St. M 10,
                                         cruciato = robust.
                                          1 St. M 1,-, 10 St. M 9,
                                          curtum cristatum.
                                          1 St. M 1,-, 10 St. M 9,
                                          Fritzelliae.
                                          1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
                                         Fritz. multifid.
                                          1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
                                         graminicon lineare.
                                         1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-
Athyrium fil. fem. illyricum . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,
                               . . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
       fil. fem. multifidum
                 pannosum, sehr feinfiedrig.
                                     1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-
                 plumoso=multifidum.
                                     1 St. M 2,50, 10 St. M 20,-
                 plumosum "Axminster". . . . . 1 St. M 5,-
                 pulcherrimum. .
                 sagittato=lunulatum.
                                     1 St. M 1, , 10 St. M 9,-
                 setigerum. . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
                 Stansfieldi. . . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
                                 . . 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-
                 Victoriae
                 Varietäten. Eine Mischung feiner Sorten ohne
Namen . . . 10 St. 1/4 4,50, 100 St. 1/4 40,-
                                                      . 1 St. M 1,50
* Blechnum Spicant serratum. . .
Polypodium vulgare bifido-grandiceps ist eine gegabelte Form, deren Endspitzen ausserdem einen mehr gekräuselten Schopf haben . . . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50
```

Athyrium fil. fem. congestum.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Scolopendrium (Hirschzunge).

Die Hirschzungen oder Scolopendrium bilden mit ihren Mutationen eine reiche Abwechslung. Die 30—40 cm langen, lederartig hellgrünen Blätter sind teils gewellt, geschlitzt und scharf gesägt, andere wieder haben an den Blattenden grosse Quäste, die fingerartig auseinandergespreizt und gekraust oder hirschhornähnlich gegabelt sind. Sie alle vertragen noch tiefen Schatten, kommt doch die Urform in tiefen feuchten Schluchten vor. Für Mauern und schattige Felspartien empfehlenswert.

```
* Scolopendr. vulg. coronat.

* " vulgare cristatum.

* " digitato = crist.

* " laceratum.

* " marginat.

* Scolopendr. vulg. muricat.

* " vulg. nepentheoides.

* " ramo = digitatum.

* " cristatum.

* " subcapitatum.

* " suprasorif. grandic.
```

Obige Varietäten kosten: 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
100 St. in 5—10 Sorten unserer Wahl M 50,—

wellten Blättern 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Eine Auswahl von Farnen nach unserer Wahl: 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—. Eine Auswahl nur feinster Sorten unserer Wahl: 10 St. M 8,—, 100 St. M 70,—. Eine Auswahl mit Zugabe feinster Sorten: 10 St. M 5,—, 100 St. M 45,—

Wasserpflanzen.



Aus unserer Wasserpflanzen-Anlage.

Winterharte Seerosen (Nymphaeen).

Die Kultur der herrlichen, dankbaren, winterharten Seerosen (Nymphaeen) ist sehr einfach und in jedem Garten — wenn auch mit Beschränkung — anwendbar. Sie verlangen vor allen Dingen warme, sonnige, gegen Wind geschützte Lage, und in künstlichen Bassins darf nur das verdunstende Wasser erneuert werden, da zu häufige Erneuerung das Wasser zu kalt macht. Wer einen Versuch im Kleinen machen will, für den genügen in der Hälfte durchschnittene, ausgebrannte Petroleum- oder Seifenfässer, die in den Boden eingelassen werden. Für solche Fässer passen die schwachwachsenden Sorten, wie N. Laydekeri-Varietäten und odorata-Sorten und insbesondere die Zwerg-Laydekeri pumila und N. pygmaea helvola. — Die Pflanzerde soll kräftig sein; zwei Drittel lockere Lehmerde mit ein Drittel verrottetem Kuhdünger vermischt und für kleinere Behälter mit etwas Holzkohle durchsetzt und die Oberfläche mit grobem Sand bedeckt, um das Wasser sauber zu halten. In grossen Teichen genügt der vorhandene Teichschlamm.

Man pflanze die Nymphaeen bei Neupflanzungen nicht eher, bis das Wasser warm genug ist. Die Zeit des Pflanzens ist von Anfang Mai bis Ende Juni. — Zur Einsenkung in Teiche pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder in eine 25—30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten dünnen Bindfaden oder Draht darüber und versenke sie.

Der Wasserstand sei 30—50 cm für die schwachwachsenden Sorten, wie Laydekeri-, odorata- und pygmaea-Sorten und 50—75 cm — auch noch tiefer — für die starkwachsenden N. alba- und N. Marliacea-Varietäten.

Winterschutz ist in Teichen unnötig, da alle hier angebotenen Sorten winterhart sind; in kleinen Behältern decke man bei strengem Frost Bretter über; Fässer entleere man von Wasser, fülle sie mit Torf, Moos oder Laub und decke ein Brett darüber.

Nymphaeen.

Weisse und farbige winterharte Seerosen.

Nymphaea alba, die einheimische, grosse, weisse Seerose.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Aurora, die Blume ist am ersten Tage rosagelb, am zweiten orangerot und am dritten Tage tiefrot Froebeli. Blumen mittelgross, dunkelfeurig karmin, im Zentrum dunkelscharlach mit zinnoberroten Staubfäden. Sehr fulva hat kupfrig-rote Blumen und braungefleckte Blätter. Selten! Gloriosa, leuchtend rot, sehr grossblumig von vollkommener Form mit roten Staubfäden 1 St. M 10,— James Brydon. Blumen sehr gross, 12—15 cm Durchmesser haltend, becherförmig, Petalen sehr breit vom feurigsten Scharlachkarmin. Ungemein reichblühend . . 1 St. M 7,-Laydekeri purpurata, tief rosa-karmesin mit orangeroten Staubfäden . 1 St. M 4,lucida, äusserst grosse Blumen, dunkelkarminrosa, im Zentrum . 1 St. M 5,karmin, Staubfäden ockergelb Marliacea albida, starkwachsend mit sehr grossen, milchweissen Blumen . 1 St. M 3,50 Marliacea carnea, mit zartfleischfarb., gross. Blum. 1 St. M4,-

Nymphaea Marliacea chromatella ist die beste gelbe Nymphaee. Die Blüten sind kanariengelb und die Blätter kastanienbraun 1 St. M 2,-Marliacea rosea ist mit ihren grossen, rosafarbigen Blumen 1 St. M 5,eine der feinsten Seerosen . odorata Caroliniana, sehr wohlriechend, zartrosa 1 St. M 5,exquisita. Prachtvoll dunkelrosa, elegante Form, wohlriechend, Blätter bronzefarben, später grün 1 St. M 4,50 pumila. Zwergart, weissblühend mit ca. 8 cm grossen Blumen für ganz niederen Wasserstand 1 St. M 2,50 rubra, bekannte karmesinrosafarbene Seerose mit lieb-1 St. M 4,lichem Geruch sulphurea grandiflora, grosse schwefelgelbe Blumen, die 10 cm über dem Wasser stehen . . 1 St. M 3,50 pygmaea helvola ist mit ihren kleinen Blättern und den zierlichen, kleinen, schwefelgelben Blumen für flaches Wasser geeignet. Robinsoni, purpurrote Blumen mit gelbem Untergrund 1 St. M 5,-Wm. Doogue. Sehr grosse, tassenförmig gebaute Blumen von zartfleischrosa Färbung. Neu! 1 St. M 8,—

Sumpf- und Wasserpflanzen.

Acorus Calamus (Kalmus). Schilfartige Pflanze, Blüten unscheinbar in seitenständigen Kolben . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" Calamus fol. var. Eine weissbuntblättrige Abart der vorigen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Arundo Phragmites fol. aur. var. (Gelbbuntblättriges Schilfrohr), neu! 1 St. M 1,— 10 St. M 9,—

Butomus umbellatus (Wasserliesch), hat schwertlilienartige Blätter-Auf 1,25 m hohen Stielen stehen endständig die rötlich weissen Blüten zu einer Dolde vereint.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Calla palustris (Schlangenwurz). Die grünlichweissen Blütenscheiden erscheinen mm Ai, im September leuchten die rotfrüchtigen Beerenkolben . . 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Caltha palustris fl. pleno (Sumpfdotterblume). Im Mai mit grossen goldgelben Blumen in starker Füllung.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— Glyceria spectabilis fol. var. (Quellgras). Schönes weiss- und gelblichbuntes Gras. Wächst im Wasser sehr rasch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— **Hibiscus palustris** (*Eibisch*). Bis 1,50 m hochwerdend sind die Blütenstiele mit grossen weiss- oder rosafarbigen malvenartigen Blumen besetzt. Juli-Aug. Wächst auch auf Gartenbeeten. Verlangt Winterschutz. 1 St. M1,—, 10 St. M9,— Iris Kämpferi (Japanische Schwertlitie). Auf meterhohen Stielen erscheinen im Juli die prächtigen breitblütigen Blumen in mannigfachen Farben von blendend weiss zu rosa, violettdunkelblau, einfach u. gefüllt. Die Blütenform ist eigenart. schön. Eine der schönsten Sumpfstauden. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,--, Pseud=Acorus (Wasserschwertlitie). Einheimische leucht. gelbblühende Art. Juni-Juli. 1 m. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 Juncus zebrinus (Gestreifte Binse). Die Stengel werden bis 1,50 m hoch, sind grün und weiss quer gestreift. Form von effusus 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-- Myosotis palustris, Nixenauge . . 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-- Nuphar luteum (Mummel). Wilde gelbblühende Teichrose, Juni-Aug. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,--

Typha latifolia (*Rohrkolben*), 1—2 m hoch werdend, breitblättrig und mit grossen braunen Kolben. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" minima. Eine Zwergform, schmalblättrig, 40—50 cm.
1 St. M

Sagittaria sagittifolia (*Pfeilkraut*), hat cremeweisse Blumen, interessant sind die pfeilartigen Blätter.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Villarsia nymphaeoides, passend für grössere Wasserflächen. Herzförmige Blätter und gelbe nymphaeenartige Blumen. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Eine Auswahl von 10 schönen Sumpf- und Wasserpflanzen kostet M 3,50. Eine Auswahl von 25 St. Sumpf- und Wasserpflanzen M 7,50.

Weitere feuchtliebende Pflanzen (eine Zusammenstellung der allgemeinen Liste entnommen).

Arundo Donax. Donax fol. var. Aralia-Sorten. Astilbe Arendsi. Davidi. chinensis. Thunbergi. Chrysanthemum uliginosum. Cyperus longus. Eupatorium purpureum. Gunnera scabra. lris germanica. Monieri. ochroleuca gigantea. sulphurea. sibirica. alba.

orientalis.

Snow Queen.

Ligularia speciosa. Mimulus cupreus. luteus × cupreus. Polygonum Bistorta. Bistorta superbum. Primula rosea. Ranunculus aconitifolius fl. pl. Sidalcea Rosy Gem. Solidago-Sorten. Spiraea Aruncus. " · filipendula fl. pl. palmata. alba. Ulmaria fl. pl. Thalictrum aquilegifolium. " flavum. Tritoma-Sorten. Trollius.

Eine Auswahl von 10 Feuchtigkeit liebenden Pflanzen 10 St. in Sorten M 4,-, 100 St. in Sorten M 35,-.

Grossblumige Canna.

Sämtliche unten angebotenen Canna liefern wir in gesunden, kräftigen Knollen und verstehen sich die Preise für solche. Die letzten Canna-Neuheiten werden in der Frühjahrsliste 1912 erscheinen.

Die besten Canna-Neuheiten von 1910.

"Cserna". Die sich von selber putzend. hellscharlachroten Blütensträusse stehen frei über dem grünen Laubwerk. 100 bis 120 cm hoch. Petalenbreite $4-4^{1}/_{2}$ cm. Eine ganz vorzügl. Gruppensorte.

1 St. M 1,80

Fürstinz. Oettingen-Wallerstein.Reichblühend über den braunroten Blättern, stehen zu schönen Dolden vereinigt, samtigscharlachrote Blumen mit 4 zuweilen auch 5 grossen breiten Petalen.

1 St. M 3,-10 St. M 25,-

Száva. Zinnober mit karmin getuscht in dichten hohen und geschlossenen Dol-den blühend; Laub grün. 1 St. M 1,80 10 St. M 16,-



Canna

Maros. Die runden Blumen, in grossen Dolden vereinigt, sind im Aufblühen cremeweiss, im weiteren Erblühen reinweiss werdend. Eine der best. weiss. Sort. Petalenbr. $4-4^{1}/_{2}$ cm. 1 St. 11

10 St. M 18,-Prof. Schleich. Die leuchtend karminrot gefärbten Blüten ragen über bräunlichrotem Laubwerk frei hervor 1 St. M 3,-

10 St. M 27,50 Stolzenfels. (Neuheit eigener Zucht.) Über hellbraunem Laube erheben sich frei die zahlreichen starken Blütenschäfte, wel-che die zartfleischfarben-rosa Blüten, zu rund. Dolden geformt, tragen. Petalenbreite $4^{1/2}$ cm. 1 St. \mathcal{M} 2,—

10 St. M 18,-

Tisza. Cremefarbige mit licht karminrosa getuschte und punkt. Blumen bilden dichte geschlossene Dolden über dem grünen Laub. Petalenbreite 4–4½ cm. 1 St. M 1,80, 10 St. M 16,—

Hervorragende Canna-Neuheiten von 1909 und 1908.

Dernburg. Braunorangerot mit karminrot leicht gestreiften Blumen frei über den hellgrünen Blättern blühend. Eine grossblumige, grossdoldige und reichblühende Gruppensorte.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-Dr. Erwin Ackerknecht. Dunkelkarminrosafarbene Blumen mit 5 cm breiten Petalen über rotem Laubwerk. 100 bis 120 cm hoch 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Dr. W. Scheuermann. Die feurig scharlach blutroten Blumen stehen schön über dem braunroten Laub. Reichblühend.

1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50 Frau A. Wendhausen. Rein leuchtend aprikosenfarben mit ziegelrotem Schlund in lockeren Dolden über schmalem grünem Laub. 150 cm hoch 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Frau Geheimrat "Borsig". Frei über dem grünen, rotgeränderten Laube erheben sich, schon frühblühend, karminrosafarbene Dolden; 90-100 cm hoch . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Hungaria. Die sehr grossen prachtvollen Blumen in reinem lebhaften hellrosa mit weissem Schlund bilden eine runde geschlossene Dolde, die frei über grünes, graubeduftetes Laubwerk ragt. Petalenbreite 5—5½ cm. Höhe 100 cm. 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,— Graf M. Tolstoi. Grosse Dolden leuchtend scharlachroter Blumen über braunrotem Blattwerk. 130—140 cm hoch.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-Karl Luz. Rein leuchtend dunkelzitronengelb, in sehr frischer Farbe stehen die grünem und edel geformten Blumen über grünem Laub. 130—150 cm. 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,— Mdlle. Gabrielle Miquel. Licht creme mit lila Hauch in gut geschlossenen Dolden frei über Laub. 90 cm hoch.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Nadir. Die kräftige, 150 cm hoch wachsende Pflanze hat rotes Laub und grosse karminrote Blumen mit 4 cm breiten . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Niemen. Rein hellcremegelb in wohlgeformten Dolden reich und frei über Laub blühend. 100-120 cm hoch. 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-Robert Leicht. Samtig blutrot auf schlanken Stielen frei über braunrot mit dunkelgrün durchflossenen Blättern; $4-4^{1/2}$ cm. 1 St. M 2,- 10 St. M 18,-

Stuttgardia. Blätter breit, dunkelgrün, von majestätischem Wuchs. Blumen glühend scharlachorange mit kanariengelb umrandet und eigenartig getuscht und getigert. Petalenbreite 5 cm 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—

Auslese feinster grossblumiger Canna der letzten Jahre.

— Die für grosse Gruppenwirkungen geeigneten Blüten-Canna sind umrahmt.

Carl Cropp. Die braunrot umsäumten Blätter sind dunkelgrün, über diesen erheben sich freistehend die schönen Blütendolden, welche leuchtend karminrot mit scharlachrot getuscht sind 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Direktor M. Holze. Reichblühend, leuchtend zitronengelb mit dunkelkarmin punktiert. 100 cm. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Grossblumige Canna.

Auslese feinster grossblumiger Canna der letzten Jahre (Fortsetzung).

Die für grosse Gruppenwirkungen geeigneten Blüten-Canna sind umrahmt.

Runde, dichte Dolden, feurig zinnoberrot, straff Dr. Marcus. und frei über rotem Laubwerk. 130 cm. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,-

Frau Marie Nagel. Weissbl. von überraschender Wirkung. Blätter blaugrün. 120-130 cm. Immer noch die beste Weisse . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-, 100 St. M 55,-

Friedrich v. Schiller. Lachsrot mit zinnoberrot und scharfem Goldrand. Das Laub ist grün. 100—120 cm. 1 St. M -0,75, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—

Goethe. Die hochwachsenden Dolden stehen frei über dem musaartigen, grünen Laube und die grossen Blüten sind leuchtend bronziert gelborange. 140-150 cm. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Gust. Gumpper. Tief goldgelb, das untere Blatt leicht rot punktiert. Schlanke Dolden über grünem Blattwerk. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

J. B. van der Schoot. Die Blüten sind dunkelzitronengelb mit purpur punktiert. Extra! 120—130 cm.
1 St. *M* 0,50, 10 St. *M* 4,—, 100 St. *M* 35,

Helleuchtend zinnoberrot mit grossen aus-Karl Kirsten. gebreiteten Blumen. Blätter sind dunkelgrün. 150 cm. 1 St. \mathcal{M} —,90 10 St. \mathcal{M} 8,—

Königin der Gelben. Schon frühblühend in Dolden von tiefgoldgelben Blumen, 140—150 cm . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,-

König Humbert I. ist eine Aufsehen erregende Sorte. Die Riesenblumen mit einer Blütenblätterbreite von 5-5½ cm sind scharlachrot, während das majestätische Laub purpurbraun und 140—150 cm hoch ist. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—, 100 St. M 65,—

Le Lys. Lichtcreme, im Verblühen in reinweiss übergehend mit lichtrosa punktiert. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—

Mad. Marguerite Mühle. Kräftig reinrosa in Farbe stehen die dichten grossblumigen Blütendolden in Fülle gedrängt straff und frei über dem Laubwerk, alle verblühten Blumen selbst abstossend und sich putzend. Das Laub ist grün mit schmalem rotem Rande. Höhe 100—110 cm. 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Marcel Ricard. Die dichten Dolden hoch über braunrotem Laube sind hellmilchigrosa mit karminrosa durchsetzt. 100—110 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—, 100 St. M 65,—

Ueber grossem musaähnlichen Laube, grün mit dunkelbraunem Rändchen, stehen feste Dolden grosser Blumen, zinnoberrot mit Karminhauch. 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,-

Papa Nardy mit karminkirschroten Blütenrispen über grünem Blattwerk. 120cm. 1St. M0,60, 10St. M5,—, 100St. M40,—

Professor Hugo de Vries. wird mit den zahlreichen Blütenschäften von rein karminrosaroter Farbe über hellgrünem Blattwerk 90 cm hoch. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-, 100 St. M 55,-

Reichskanzler Graf v. Bülow. In unvergleichlich leuchtender, samtig blutroter Farbe wirken die Blütenrispen über frischgrünen Blättern. 100-120 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 45,-

Souvenir de Papa Crozy. Musaartiges dunkelgrünes Laub, zinnoberrote Blütenstände. 100—120 cm, reichblühend. 1 St. M 2,--, 10 St. M 18,-

The Gaikwar of Baroda. Blätter blaugrün, Blüten tief goldgelb, dicht und gleichmässig, forellenartig, blutrot getigert. Die beste getigerte Varietät. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-

Undine. Ungewöhnlich zahlreich sind die Blütenrispen, deren zinnoberrote Blüten von goldgelbem Rande umsäumt werden. Blattwerk grün. Vorzügliche Gruppensorte. 90 cm. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-, 100 St. M 55,-

Obige feinste grossblumige Canna der letzten Jahre nach unserer Wahl 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

Aeltere bestbewährte Blüten-Canna.

Grünlaubige Sorten:

Dr. Robert Funke. Leuchtend zinnoberrot. 140 cm.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 45,—
Frau Ober-Ing. Mast. Orangerosa, im Verblühen in rosa über-

gehend, reichblühend, 120 cm.

1 St. M 0,60, 100 St. M 5.—, 100 St. M 40,— Frau Philipp Siesmayer. Die Grundfarbe ist gelb orange und dicht mit ziegelroten Punkten getigert. 130 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Hofgärtner Eisenbarth. Kleine feste Dolde, putzt sich von selbst, feurig scharlachrot mit gelb umgeben. 100 cm. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Karl Räde. Satt goldgelb. 130 cm.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25, Karl Schroers. Hellorangefarben mit rosa getuscht, freiblühend. 1 St. M 0,50, 10 St M 4,—, 100 St. M 35,— Königin Charlotte. Blutrot mit goldgelb umsäumt. 100—110 cm. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—

R. Wallace. Zahlreiche schlanke Blütenrispen von leuchtend zitronengelber Farbe. Für gelbe Farbenwirkung die beste Gruppensorte. 120 cm. 1 St. M0,50, 10 St. M4,—, 100 St. M35,— Wilhelm Griesinger. Schwefelgelb mit karminblutroten Flecken. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— 100 cm .

Braun=rotlaubige Sorten:

Andenken an J. H. Krelage. Die riesengrossen Blumen sind feurig zinnoberrot, in tadellos gebauten Dolden vereinigt. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 45,-

Bronze Poitevin. Mit mächtigem bis 25 cm breitem, braunrotem Laube und runden Dolden orangefarbener Blumen. 125 cm.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 45,—

Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen. Scharlach-orangerot. 130 cm 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 45,— Gruss an Mainz. Karmin-scharlachrote Blumen. 100 cm.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

J. D. Cabos. Leuchtend aprikosenfarbige Rispen. 120 cm
1 St. M 0,40, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,— Rubin. Scharlachrot. 100 cm.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

Stadtrat Heidenreich. Leuchtend mennigzinnoberrot. 130 cm.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—
W. Watson. Weichlachsrosa mit Karminhauch, Laub dunkelrot. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9, 150-160 cm


Eine Auswahl älterer bestbewährter Blüten-Canna nach unserer Wahl

10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Zwei dekorative Blatt-Canna.

eine hervorrag. Gruppenpflanze . 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-

Black Beauty. Musaartiges Laubwerk v. metallisch braunroter Farbe, eine hervorrag. Gruppenpflanze. 1 St. M 1,—, 10 St. M 8,— als Einzel- und Gruppenpflanze. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—



Rheinkönig (G. & K. 1911).

Dahlien.

Zwei hervorragende Edel-Dahlien-Neuheiten. (Eigene Züchtungen für 1911.)

Rheinkönig (G. & K. 1911). Die blendend schneeweissen Blüten von etwa 15 cm Durchmesser werden von festen Stielen frei getragen und sind von gleichmässig typischer deutscher Edeldahlienform. Sie bedecken die Pilanze in überreicher Fülle, und was dieselbe noch ganz besonders wertvoll macht, ist ihre Haltbarkeit in abgeschnittenem Zustande, eine ihr geradezu eigentümliche Eigenschaft, die sie vor vielen anderen Sorten auszeichnet.

Rheintochter (G. & K. 1911). Die Blüten in sehr edler Form mit langen Petalen und ungemein zarter und weicher ilarosa Färbung erscheinen in grosser Menge auf festen Stielen frei über dem Laubwerk. Es ist eine vorzügliche Bindefarbe und die Pflanzen blühen lange und reich.

Nur in jungen fest durchwurzelten Topfpflanzen im Mai 1912 lieferbar.

1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50

Unsere diesjährigen Neuheiten fanden auf allen von uns besuchten Ausstellungen allgemeine Bewunderung, so auf der grossen Gartenbau-ausstellung in Liegnitz; in Frankfurt a. M. im Palmengarten und gelegentlich der grossen Obstausstellung; in Hannover und Düren.



Halskrausen = Stern = Dahlien. Eigene Züchtungen für 1911.

Diadem (G. & K. 1911). Die Farbe der leicht gedrehten, zugespitzten Blütenblätter mit silbriger Spitze ist ein klares, warmes Rosakarmin, ohne jede Zeichnung, und auf diesem liegt der schneeweisse Kragen in entzückendem, klarem Farbenkontrast. Die Blüten stehen auf festen, langen Stielen und erscheinen in unerschöpflicher Folge. Besonders geeignet für lockere Vasens räusse.

Leitstern (G. & K. 1911). Auf einem ganz regelmässigen spitzstrahl. Stern von satt kastanienbraunroter Farbe hebt sich ein zierlicher regelmässiger Kranz blendendschneeweisser Strahlenblüten leuchtend ab und der seltsame Eindruck wirkt um so stärker, aus je weiterer Entfernung man die ganze Pflanze betrachtet. Reichblütigkeit und lange Haltbarkeit in abgeschnittenem Zustande machen die Sorte besonders wertvoll.


Beide Sorten in Knollen: 1 St. M. 2,50, 10 St. M. 22,50



Ausführliche Beschreibungen unserer Neuheiten finden Sie in **Möllers Deutsche** Gärtnerzeitung (Jahrg. 1910, Nr. 45 u. 46, Jahrg. 1911, Nr. 1) in der Gartenwelt (Jahrg. 1910 Nr. 39, 46 u. 49).

Zwei Riesen-Edel-Dahlien eigener Zucht.

Ein Kreuzungsergebnis von einfachen Paeonien-Dahlien mit echten Kaktus-Dahlien.



Wodan (1/5 natürliche Grösse).

Riesen-Halb-Edel-Dahlie

Rheingau. (G. & K.) Hohe, über das Laub ragende kräftige Stiele tragen in stolzer Haltung die sehr grossen, dekorativen Blumen, halbgefüllt, in Edeldahlien-Form lang ausstrahlend, scharlachrot, in zinnoberrot übergehend. Der Blumendurchmesser ist 17-18 cm. Ein prachtvolles Material für Schmückung grosser Vasen.

Knollen 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-, 100 St. M 75,-

Halskrausen-Stern-Dahlien.

Diadem, Leitstern, Neuheiten für 1911, Seite 66.

Capella (G. & K. 1910). Die Blumenblätter sind glänzend dunkelkastanienrot, von ihnen hebt sich der schneeweisse Kragen leuchtend scharf ab, eine äusserst frische Farbenwirkung. Auf festen Stielen reich und frei wie alle Sterndahlien über dem Laub blühend. Knollen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14.-

Comtesse Icy Hardegg (G. & K. 1909). Halskrausendahlie. In lachend frischer Farbenzusammenstellung leuchten die Blumen in klarem Karminrosa mit weissen Spitzen und heller Längsaderung; in der Mitte aber strahlt ein schneeweisser Kragen heraus 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— **Goldstern** (G. & K.). Gedrungen wachsend und kugelartig bedeckt

mit grossen goldgelben Blütensternen mit langfedriger gelber Krause.

Lichtblick (G. & K.). Die klarzitronengelben Blüten sind von zierlich sternartiger Tulpenform mit lichtgelbem Kragen.

Meteor (G. & K.). Sehr grosse, leuchtend karmesinrote Blütensterne mit weissem Federkragen auf straffen, kräftig langen

Rheinkrone (G. & K.). Samtigbraunrot ist der Stern, während die Krause lang federartig wie eine Krone hochsteht, rot mit weissen Lichtern durchsetzt mit weissen Spitzen.

Letzte 4 Sorten, Knollen: 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-,100 St. M 55,-

Wodan. (G. & K. 1910.) Trotz ihrer riesigen Grösse von 18–20 cm Durchmesser zeigt sich die herrliche Blüte doch gefällig und locker auf 25 cm hohen, straffen Stielen frei über dem Laub. Die Blumenblätter sind Gloriosa-ähnlich geröhrt. Die Farbe ist orangerosa mit altgoldgelber Mitte. Ein prachtvolles Schmuckmaterial für grosse Vasen.

Vater Rhein. (G. & K. 1910.) Die 20 cm im Durchm. haltenden Riesenblumen stehen auf wuchtigen festen Stielen frei über dem Laubwerk. In der Mitte lachsfarben, laufen dieselben nach aussen zu in lilarosa aus auf golden durchschimmerndem Grund.

> Diese 2 Sorten, Knollen: 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-, 100 St. M 120,-.



Nerthus (G. & K.).

(G. & K. 1909.) Bringt wahre Prachtblumen Nerthus. in auffallend schöner Form in der Grösse von 15 cm im Durchmesser auf sehr kräftigen Stielen. Die wirkungsvolle Blume ist rosakarmin, nach aussen zu lilarosa und in Silberspitzen auslaufend, während in der Mitte ein leuchtend gelber Schein die Farbenwirkung stark hervorhebt.

(G. & K. 1909). Sehr zierlich nadelspitz ge-Frigga. strahlt in voller Form, cremeweiss in ausserordentlich reicher Menge an festen Stielen blühend, für den Schnitt sehr geeignet.

> Diese 2 Sorten, Knollen: 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-, 100 St. M 80,-.

Unsere eigenen Edel-Dahlien-Züchtungen, die ihren bleibenden Wert erwiesen haben.



Parzival (G. & K.).

- "Balmung". Leuchtend zinnoberrot, langstielig und reichblühend. 120 cm hoch.
- "Berlichingen". Karminrosafarbene Blüten mit Silberspitzen. 140 cm hoch.
- "Brunhilde", leuchtend pflaumfarben. 100 cm. "Frute", die Pfirsich-Dahlie! Aussen weichrosa, nach innen in cremefarben verlaufend. 180 cm.
- "Geiselher", der zierlichste Edeldahlien-Typus, rubinrot. 120 cm hoch.
- "Gotelinde". Zierlich gestrahlt von rein goldgelber Farbe. 110 cm hoch
- "Hagen". Dunkelkastanienbraun. 140 cm hoch.
- "Hildegunde". Hellfliederfarben mit feiner, haarscharfer Liniierung in Längsäderung. 140 cm hoch.
- "Kriemhilde". Frischrosa mit creme Mitte auf kräftigen, festen Stielen. 140 cm hoch. "Parzival". Grosse weisse Edel-Dahlie von kreisrunder Form, auf
- drahtharten Stielen in grosser Menge frei über dem Laube blühend. 140 cm.
- "Rother". Vom frühen Sommer bis in den späten Herbst blüht diese Sorte in samtigscharlachroter Fülle über dem Laube.
- "Volker". Edelgestrahlt, goldgelb auf langen, gelben Stielen. 140 cm hoch
- "Walthari". Gedrungen wachsend. Cremefarbene Blumen und von erstaunlicher Reichblütigkeit. 90 cm hoch.

Obige Sorten kosten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Edel-Schmuck-Dahlien.

Wir haben uns seit einigen Jahren bestrebt, eine neue Richtung in der Zucht der Edel-Dahlien zu verfolgen, die darauf hinausgeht, Sorten zu erzielen, die in der Blüte bei gedrungenem Wuchse eine dichte Farbenmasse zeigen sollen.

Diese neue Gruppe, die unter anderem auch dazu dienen soll, bei grösseren Anlagen durch einfaches Auspflanzen in hundert oder mehr Knollen einer Sorte ohne störende Stäbe ein weithin wirkendes, einheitliches Farbenbild zu schaffen, nennen wir Edelschmuck-Dahlien.

- "Freigebigke t". Gedrungen wachsend, leuchtend rot. 90 cm hoch.
- "Füllhorn". Dunkelkarminrot, sehr reichblühend. 130 cm hoch.
- "Lawine". Eine reinweisse Edelschmuck-Dahlie, grossblumig, in reicher Fülle über dem Laube blühend. 120 cm hoch.
- "Quelle". Zwergsorte, orangerot. 80 cm hoch.
- "Ueberfluss". Langstrahlig, fein geformt, hell ziegelrot. 130 cm hoch.
- "Verschwendung". Ganz besonders leuchtendrot mit violetten Lichtern durchsetzt, ungemein reichblühend. 130 cm hoch.

Weitere Edel-Schmuck-Dahlien.

Coronation. Reichblühend, leuchtend scharlach, feinstrahlig. 110 cm hoch. Edelweiss (06). Frei und reichblühend auf straffent Stielen elfenbeinweiss. 50 cm 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Glückauf (09). Grossblumig leuchtend hellscharlach, Petalen gut gedreht und lang gestrahlt. Der Wuchs straff und gedrungen. 90 cm hoch. Gruppenkönigin. Ueber der kompakt wachsenden Pilanze stehen die spitzstrahligen samtig dunkelroten Blumen in reicher Fülle. 110 cm.

Marianne. Breitstrahlige Blumen stehen auf straffen Stielen und sind altgold gefärbt. 120 cm hoch . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
Puck. Eine der besten reichblühenden Schmuck-Dahlien, niedrig scharlach-orange. 80 cm.

Sämtliche Schmuck-Dahlien kosten, wenn kein Sonderpreis angegeben: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Pompon=Dahlien.

Durch Zierlichkeit des Wuchses, grossen Blütenreichtum und Reiz der Formen ausgezeichnet, bilden die Pompon-Dahlien gutes Material zur Ausschmückung von Rabatten und in Gärten. Die kleinen runden Blumen sind dicht gefüllt und stehen auf straffen Stielen frei über dem Laube.

Cardinal. Purpurrot. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-.

Frau Dr. Knabbe. Milchweiss. Frau Helene Lambert. Gelb.

Flossy. Weiss.

Ganymed. Orange mit lila Hauch.

Hermann Zindel. Rot.



Verschwendung.

Lilian. Fliederfarben.

Puppenfee. Neu! Reinweiss, niedr. bleib., sehr reichblüh. 1 St. M 1,25 Sunset. Goldorange. 10 ,, ,, 12,-

Alle nicht mit Preisen versehenen Pompon-Dahlien kosten: 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 45,-

Die besten englischen Edel-Dahlien-Neuheiten für 1911.

- Bridal Robe. Sehr feine edle Kaktusform von zart elfenbeinweisser Farbe auf langen straffen Stielen stehend. Blumendurchmesser 15 cm, leider etwas im Laube blühend. 150—160 cm Höhe.
- Conquest. Frei über dem Laub und auf starken langen Stielen in vorzüglicher edler Form stehen die dunkel samtig roten Blumen, die einen Durchm. von 18 cm haben. 120-130 cm hoch.
- Florabella. Die mattziegelroten Blumen sind von edler Kaktusdahlienform. An guten Stielen blühend, jedoch etwas geneigt, kompakt wachsend. 100-120 cm.
- Gwendoline Tucker. Eine ganz vorzügliche Sorte. Auf festen starken Stielen in guter Haltung stehen frei über dem Laub die lang ausstrahlenden lockeren Blumen, in der Mitte elfenbeinweiss, nach aussen zu in rosa-lila auslaufend. Der Durchmesser beträgt 18—20 cm. In Form die edelste aller englischen Neuzüchtungen.
- Jolanthe. Die Blütenfarbe ist eine Mischung von Karmin nach den Spitzen in orange verlaufend; in der Mitte der Blume herrscht der gelbe Farbenton vor.

- Die grossen edlen Blumen werden von festen, | Lightship. straffen Stielen frei über dem Laub getragen. Die Aussenblätter der Blüten sind hellterrakotta mit rosa, nach der Mitte kanariengelb. 170 cm.
 - Mary Purrier. Durch eine äusserst feinstrahlige Blütenform von wunderbar schön blutroter Färbung ist diese Neuheit ausgezeichnet. Die straffe Haltung und die Blütengrösse, 17 bis 18 cm, sind weitere gute Eigenschaften.
 - Penguin. An sehr festen Stielen frei über dem Laub blühend. Farbe der Blumen gelborange. 130 cm.
 - Red Admiral hat eine feinstrahlige Kaktusform. Blüht wohl frei über dem Laub, doch hängen die 16 cm im Durchmesser gemessenen Blumen etwas, da deren Stiele im Verhältnis zu schwach sind. Die Farbe ist feurigrot; wird 150 cm hoch.
 - Una. Von überaus zarter rosalila Farbe und sehr edler fein zerschlitzter Progenitorform; leider hängend.

Knollen von obigen besten englischen Neuheiten für 1911 kosten 1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50.

Die besten englischen Edel-Dahlien-Neuheiten von 1910 und 1909.

- C. E. Wilkins. Auf riesigen Stielen eine prachtvoll geformte Blume, klar lachsrosa mit gelb überlegt. 180 cm. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-
- Debutante. Zartestes Lilarosa, nach den Spitzen zu fast weiss, in der kralligen Form an ein Chrysanthemum erinnernd. 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,-
- Delicatissima. Zart apfelblütenrosa, lang ausstrahlend, frei über dem Laub. 140 cm..... 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—
- Dr. G. Grey. Dunkelblutrot, formvollendete, sehr krallig gebaute Blume, reichblühend 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-
- Dorothy. Die tief gebaute Blume ist silbrig rosa. 150 cm. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—
- Echo. Von edler, feinstrahliger Blumenform. Die Farbe ist lilakarmin. 120 cm 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-
- Glory of Wilts. Die sehr grossen goldgelben Blüten sind von edelster Form, ungemein reichblühend.
 - 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,-

- Harold Peerman. Gedrungen wachsend, rein reichgelbe Blumen, die tief und langstrahlig gebaut sind. 1 St. M 1,25 10 St. M 10,—
- Mauve Queen (09). Feinstes Lavendellila, in Form und Farbe
 - gleich vorzüglich, namentlich für Binderei geeignet. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-
- Miss Hessey. Sehr reichblühend, lebhaft rosa, nach der Mitte zu heller 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—
- Mrs. Alfred Dyer, In der Mitte lichtzitronengelb, läuft diese ungemein zarte Färbung in weiches rosa und weissen Spitzen hinaus. 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—
- Mrs. T. J. Woodall. Rein zitronengelb, nach den Spitzen zu zart karminrosa abgetönt. Lang und dünngedrehte Blumen. 130 cm. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-
- Snowdon. Schneeweisse Blüten mit lang ausstrahlenden Petalen; sehr zu empfehlen 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,-
- Spanish Prince. Rosanelkenfarbig, nach der Mitte zu creme und einwärts gekrümmte Form. 170 cm 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Aeltere englische Dahlien.

- Acrobat. Reichblühend auf festen Stielen; zweifarbig, am Grunde reinweiss, nach aussen leuchtend karmin. 110 cm.
- Alexander. Tief karminfarbene Blumen, in feinröhriger Form. 110 cm.
- Ambassador. Rein weiss, sehr reich blühend. 180 cm.
- Aunt Cloe. Dunkelsamtig rot. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Countess of Lonsdale. Frei über dem Laub stehen die lachsfarbenen Blumen 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Countess of Malmesbury. Zart pfirsichrosa, sehr spitz gedreht. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- **Gracie.** Reichblühend, in zarter, wechselnder Farbenmischung, ziegelrot und reinweiss auf gelblichem Grunde.
- J. H. Jackson. Edelste und schönste schwarze Dahlie, tiefsamtig schwarzrot. 120 cm. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Kathleen Bryant. Tiefsamtig schwarzbraun in prachtvoll edler Form, reichblühend, doch hängend an den Stielen. 100 cm. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

- Mrs. Macmillan. Tiefgebaute Korallenblume, innen weiss, rosalila auslaufend.
- Mrs. George Stevenson. Die grossen, dünn ausstrahlenden Blumen sind leuchtend gelb, getragen von drahtartigen Stielen. 150 cm. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Perle de Lyon hat grosse weisse Blumen in der Form der beliebten Progenitor. Vorzüglich zur Kranzbinderei. 160 cm. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- Pink Pearl. Lebhaft rosa, nach der Mitte und dem Rande in licht fleischfarben übergehend. 140 cm.
- Recam. Tief schwarzbraun, in edler, grosser Blume an festen Stielen. 130 cm.
- Spotless Queen. Schöne reinweisse und reichblühende Sorte. 120 cm.
- Star. Gekrümmte Blumenform. Die Farbe ist gelb mit bronze. 130 cm.
- Stella. Schön lebhaft rote und reichblühende Sorte. 110 cm.
- Uncle Tom. Tiefsamtig schwarzbraun. 130 cm. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Edel-Dahlien-Neuheiten von 1910

von deutschen Züchtern.

Bismarck. Petalen sind leicht einwärts gebogen und von leuchten-. . . 1 St. M 1,50 der feurigroter Farbe. .

Cattleya. Die Blumen sind von guter strahliger Form und von brillantlila oder Fliederfarbe. Wertvoll als Bindeblume. 1 St. M 2,—Galathea. Schöne Schnittdahlie von delikatester Fleischfarbe.

Petalen am Grunde breit auslaufend 1 St. M 2,-

Magnet. Eine Mischung von rosa u. lachs mit einem stark hervortretenden bläulichen Hauch, Frühblühend, 1,20 m. 1 St. M 1,25

Modell. Grundfarbe hellschwefelgelb, nach den Spitzen zu heller und zarter, schliesslich in rosa übergehend. . 1 St. M 1,-

Modern. Die gutgefüllten mittelgrossen Blumen haben eine eigenartige Farbenmischung von chamois mit feinem lila und aurora bedeckt, tief im Grunde gelblich hervorschimmernd. 1,40 m 1 St. M 1,75 Phänomen. Incarnatrosa, am Grunde der Petalen bronzegelb, an den äussersten Sp.tzen blass-schwefelgelb, reichblühend, 1 St. \mathcal{M} —,75, 10 St. \mathcal{M} 6,— Piccolo. Eine Zwerg-Edel-Dahlie mit dunkel scharlachroten Blüten.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Rosaeflora. Reichblühend und von reinrosa Farbe mit weisser

Rosenelfe. Die Färbung ist ein reines frisches Rosa. Reichblühend

auf straffen Stielen über dem Laub 1 St. M 2,— Stormarn. Die Farbe der grossen Blumen ist mattrot mit fein gerollten und gewölbten Petalen 1 St. M 1,50

Trautlieb. Grosse, leicht einwärts gebogene Blume; äussere Petalen zartrosa nit lila vermischt, nach dem Zentrum zu allmählich in helleren Farbenton übergehend, kompakt wachsend 1 St. M 1,75

Aeltere deutsche Züchtungen früherer Jahrgänge.

Arlstokrat (08). Deckt mit den straff aufrechten karminroten Blumen das Laub völlig. 100 cm.

Aurora (05). Zart hellgelblich rosa mit weissen Spitzen und goldener Mitte in prachtvoller Form. 140 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Bornemanns Liebling. Reinrosa reichblühend. 140 cm.

Erecta (09). Fein gestrahlte Blumen, purpurrot. Aussenpetalen kastanienbraun 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—
Feronia (06). Auf straffen Stielen reichblühend in zart nelkenrosa Farbe. 90 cm.

Freudenfeuer (08). Tiefes glühendes Scharlach, langgestielt u. grossblumig. Eine Gartenschmuck-Sorte. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-

Goldland (07). Ist überschüttet mit leuchtend chromgelben Blumen.

Havel (06). Reizvolle Seerosenform. Klar lachsfarben blüht diese prächtige Sorte reich auf starken Stielen. 90 cm.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Ideal (09). Zierliche und edle Form, von leicht oranger Färbung-Johannes Mortensen (08). Im Grunde orange, nach den Spitzen dunkelrot.

Königin Luise (07). Als Gruppensorte und für Blumenschnitt wertvoll, feinstrahlige Blumen stehen frei aufrecht, zartrosa mit silberiger Mitte. 150 cm 1 St. M 0,60 10 St. M 5,— Mikado bringt sehr edelgeformte Blumen v. karminrot. Farbe. 150 cm.

Pastor Neumann (08). Die Blumen sind feinstrahlig, feurig dunkelrot mit karmesin Schein 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—
Parade (09). Leuchtend feuerrot auf langen starken, festen Stielen.
Poesie (09), helles Kanariengelb verfärbt sich nach der Mitte in

zartlilarosa. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-Rakete (01). Mittelgrosse Blumen sind leuchtend rot. 120 cm.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Rosa Siegerin (09). Malvenrosafarbig, spitzstrahlig und frei über dem Laub blühend 1 St. M 1.25, 10 St. M 10,— Sonnenstrahlen (1900). Von herrlich lichtgelber Farbe. 150 cm.

Stern (06). Sattes, tiefes Gelb, die Haltung der Blumen ist ideal aufrecht.

Vestalin, Fliederfarben, mittelgrosse Blumen. 120 cm.

Wolfgang v. Goethe (09). Eine dunkle Aprikosen-Tönung mit zartester violetter Schattierung. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Obige Sorten kosten, wenn kein Sonderpreis angegeben: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-.

Begonien: Die wertvollsten Gruppensorten.

Von den immerwährend reichblühenden, kleinblumigen Gruppensorten, die durch ihre erstaunliche Blüten- und Farbenpracht so sehr bestricken, bieten wir hierunter einige der wertvollsten und erprobtesten in Knollen an.

Bavaria. Zart Rosakarmin, überschüttet mit Blüten. Selten! 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-, 100 St. M 80,-

Bertini. Leuchtend scharlach zinnoberrot, einfach sonnenhart. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Frau Helena Harms. Hellgelb, gefüllt, sehr reich blühend.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-, 100 St. M 55,
Graf Zeppelin. Leuchtend scharlacht, d. 25 gefüllt. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,- Lafayette. Blendend scharlach zinnoberrot, gefüllt; eine der schönsten Sorten. 1 St. \mathcal{M} -,75, 10 St. \mathcal{M} 6,-, 100 \mathcal{M} 50,-

Leuchtfeuer. Feurigrot, für sonnige Gruppen. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,— 100 St. M 50,—

Phosphorescent. Korallenrot, halbgefüllt. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 65,-

Gladiolen.

Die Zwiebeln werden im April bis Mai bis zu 10 cm tief ausgepflanzt und im Herbst nach dem Abblühen aus dem Boden genommen und in frostfreiem Raum überwintert.

Gladiolus gandavensis-Hybriden, Prachtmisch. aller Farben . 10 St. M 1,20, 100 St. M 10,-, 1000 St. M 80,-Eine Mischung von nur weissen und hellen Farben.

10 St. M 2,-, 100 St. M 14,-

Gladiolus Brenchleyensis, rot . 10 St. M 0,80, 100 St. M 7,50

Gladiolus Childsi-Hybriden. Grosse Blumen mit herrlichem Farbenspiel, deren Schlund fein genetzt und punktiert ist 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—

Gladiolus Childsi-Hybriden. Auslese. Besonders grossblumig. 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—

Gladiolus Lemoinei-Hybriden . 10 St. M 0,80, 100 St. M 7,50

Neuere Sorten:

Amerika. Fleischfarbig rosa.'

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—, 100 St. M 25,—

Baron Josef Hulot. Veilchenblau . . . 1 St. M 0,50,

10 St. M 4,—, 100 St. M 35,— Herbstgruss, (G. & K.), scharlachrot.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-, 100 St. M 55,-

Gladiolus princeps. Amaryllisblumige Gladiole, scharlachrot . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Primulinus. (Spezies.) Neu. Klar gelb. . . 1 St. M 2,50 Wiesbaden. (G. & K. 1911.) Lichtlilarosa mit dunkelrosa punktiertund getuscht. 1St. M1, -, 10St. M9, -

Angaben und Zusammenstellungen der Blütezeit der schönsten Stauden und Gehölze für Farbenblütengruppen.

Wo zu einer bestimmten Jahreszeit bestechende Farbenwirkungen in grösseren Gruppen gewünscht werden, sei es nun in Beetpflanzung oder in Gruppierung vor Gehölzen, um durch Massenanwendung die herrliche Wirkung leuchtender Blütenfarben so recht zur Geltung zu bringen, da empfehlen wir für solche Zwecke die nachfolgende Auswahl.

Erklärung der Zeichen:

• für den Blumenschnitt geeignete Pflanzen.

o = diejenigen Pilanzen, welche mit Knospen gut verpflanzbar sind.

*= so'che Stauden, die sich besonders für grosse Blütengruppen eignen.

Bei der Höhenangabe ist bei Sträuchern zu verstehen unter Bei den Stauden unter

niedrig eine Höhe bis zu 1 Meter, halbhoch bis zu 2 Meter, hoch bis zu 3 Meter und baumartig über 3 Meter.

niedrig bis zu 40 cm, halbhoch bis zu 80-100 cm und hoch über 1 Meter.

Die Reihenfolge der Namen gibt auch die Folge der Blüte an.

März: Stauden.

Hepatica, in blau, rot und weiss, niedrig bis Anfang April.

Aubrietien, in blau, rot, rosa und weiss, niedr g, b s Mitte April.

Megaseen, rosarot, halbhoch, bis Anfang Mai.

or ** Arabis alpina-Arten, weiss, niedr., bis Antang Mai.

> Anemone sylvestris, weiss, niedr., bis Anfang Mai.

Primula acaulis-Hybr., in Farbengemischt, niedrig, bis Mitte Mai.

> acaulis coerulea, blau niedr., bis Mitte Mai.

Erste Hälfte April: Sträucher.

Ribes-Sorten, inpurpurrot, gelb, fleischfarben, halbhoch, bis Ende April.

Forsythien-Sorten, gelb, hoch und niedrig, bis Ende April.

Amygdalus persica-Sorten, in rosa, rot und weiss, halbhoch, bis Ende April.

Prunus Pissardi und Moseri fl. pl. rosa, baumartig, bis Ende April

Von den vorhergehenden Stauden blühen noch:

Aubrietien, Megaseen, Arabis alp.= Arten, Anemone sylvestris, Primula acaulis-Hybr. u. coerulea, ferner noch:

* Frühjahrsphlox, in blau, lila. rot, rosa und weiss, niedrig, bis Anfang Juni.

*o Primula acaulis, in gefüllt. Sorten, in rot, gelb und weiss, niedr., bis Ende Mai.

Primula Cashmeriana, in blau und weiss, niedr., bis Mitte Mai.

Cashmer. "Rubin", rubinrot. elat. alba gig., weiss niedr.

bis Mitte Mai. elatior aurea grdfl., gelb, niedrig, bis Mitte Mai

elat. gig.=Hybr., in Farben gemi cht, niedr., bis Mitte Mai.

Orobus vernus und varius. Pulmonaria saccharata, blau, rubra, rot, bis Mitte April.

Primula rosea grdfl., rosa, niedr., bis Mitte Mai.

or Arabis alp. fl. pl. und alp. fol. var., weiss, niedrig, bis Ende Mai

Or Doronicum cordifolium, gelb, halbhoch, bis Anfang Mai.

Omphalodes verna, blau und weiss, niedrig, bis Mitte Mai.

* Viola cornuta = Sorten, in blau, lila, gelb und weiss, niedrlg, bis zum Herbst.

Zweite Häfte April: Sträucher.

Von den vorhergehenden Sträuchern blühen noch:

Forsythien, Ribes, Amygdalus persica, Prusus Pissardi und Moseri fl. pl., ferner noch:

Amygdalus nana, rosa, niedrig, bis erste Hälfte Mai.

Magnolia=So ten, in weiss, rosa und rot, hoch und niedrig, bis erste Hälfte Mai.

O Spiraea Thunbergi, weiss, niedr., bis erste Hälfte Mai.

Kerria jap.-Sorten, goldgelb, halbhoch, bis erste Hälfte Mai.

Cydonia jap. - Sorten, in weiss, rosa, rot und orange, halbhoch, bis

Prunus triloba, rosa, niedrig, bis erste Hälite Mai.

Mahonia aquifolium, gelb, niedrig, bis erste Hälite Mai.

Spiraea arguta, weiss, niedrig, bis Mitte Mai.

prunifolia fl. pl., weiss, halbhoch, bis Mitie Mai.

Prurus sin .= Sorten, in rosa und weiss, halbhoch, bis Mitte Mai.

Rhododendron praecox, lilarosa. niedrig, bis Mitte Mai.

Stauden.

Von den vorhergehenden Stauden blühen noch:

Megaseen. Arabis alp.=Sorten, Arabis alp. fl. pl., Anemone sylv., Primel = Arten Frühjahrsphlox, Doronic. cauc., Omphalodes verna, Viola cornuta, Orobus vernus, Orobus varius, ferner noch:

Or Doronicum plantag. excels., gelb, halbhoch, bis Mitte Mai.

* Phlox amoena, rosa, niedrig, bis Mitte

Epimedium-Sorten, in weiss, gelb und rötlich, niedrig bis Ende Mai.

⊙o Trollius=Arten, gelb und orange, halbhoch, bis Ende Mai.

Or Phlox div. "Laphami" und div. canadensis, hellblau, niedrig, bis Mitte Juni.

Iberis semperv.=Sorten, weiss, niedr., bis Ende Mai.

Alyssum saxatile und Varietäten, einfach und gefüllt, gelb bis Mitte Mai. or * Erica carnea und carnea alba, rosa und weiss, niedrig bis Ende Mai.

Saxifraga hypnoides und irrigua, weiss, niedrig, bis Ende Mai.

hypnoides purpurea, Rhei, Rhei superba und muscoides, rosa, niedrig, bis Ende Mai.

Iris pumita-Sorten, in hellblau, blau, gelb und weiss, niedrig, bis erste Hälfte Mai.

Erysimum pumilum, gelb, bis Mitte

Erste Hälfte Mai: Sträucher.

Von den vorhergeh. Sträuchern blühen noch, Prunus-Sorten, Spiraea prunif. fl. pl. arguta und Thunbergi, Cydonia jap., Kerriajap., Ribes, fern. noch:

Staphylea, weiss, hoch, bis Ende Mai. Pirus-Sorten, in weiss, hell und dunkelrosa, bis zweite Hälfte Mai.

Cytisus elongatus, gelb, halbhoch, bis zweite Hälfte Mai.

Berberis, hellgelb, hoch u. niedrig, bis Ende Mai.

Ribes alp., grünlichweiss, halbhoch, bis Ende Mai.

• Exochorda grdfl., weiss, halbhoch, bis Ende Mai.

Caraganen, gelb, h. u. ndr., b. Mitte Juni. Rhodod. Hybr., in weiss, rot, rosa, lila und blau, niedrig, bis Ende Juni.

Sambucus racemosa=Sorten, weiss, hoch, bis Ende Mai.

Cytisus purp., lilarosa, hoch und niedrig, bis Ende Mai.

Prunus Padus und Prunus virg., weiss, hoch, bis Ende Mai.

Rhodotypus kerr., weiss, halbhoch, bis Anfang Juni.

Viburnum Lantana und tomentosum, weiss, hoch, bis Anfang Juni.

Syringa vulg., in weiss, lila u. lilarosa, halbhoch und hoch, bis Mitte Juni.

Lonicera tatarica, in weiss, rosa und rot, hoch, bis Aufang Juni.

Azalea mollis, in rot, orange und gelb, niedrig, bis Anfang Juni.

Weigelia praecox, rosa, halbhoch, bis Mitte Juni.

Xanthoceras sorbif., weiss mit rötlichgelb, halbhoch, bis Anf. Juni.

Cercis siliqu., tiefrosa, baumartig, bis Anfang Juni.

Paeonia arb., in weiss, rosa, rot und fleischfarben, niedrig, bis Anf. Juni.

Rubus deliciosus, weiss, niedrig, bis Anfang Juni.

Von den vorhergeh. Stauden blühen noch: Anemone sylvestris, Frühjahrsphlox, Primel-Arten, Arabis, Omphalodes verna, Viola cornuta, Doronicum, Phlox amoena, div. "Laphami" u. div. canad., Epimedien, Trollius, Iberis sempSorten, Erica carnea und carnea alba, Saxifragen, ferner noch: Alyssum, Erysimum.

Iris pumila hybr. - Sorten, in blau, creme, gelb und weiss, niedrig, bis zweite Hälfte Maj.

Polemonium Richardsoni, in blau und weiss, niedr. u. halbh., b. Anf. Juni. ③** Aquilegia=Sort., in blau, rötlich gelb u. weiss, niedr. u. halbh., b. Ende Juni.

Stauden.

Geum Heldreichi, rot, niedrig, bis Mitte Juni.

Viola cucullata grdfl., blau, niedrig, bis Anfang Juni.

Papaver nudic. u. alpinum, in orange, gelb und weiss, niedrig, bis Juli. Ranunculus, in weiss und gelb, halbhoch, bis Anfang Juli.

Hieracium rubrum, oranger., Juni.

Primula Sieboldi, in blau, rot, rosa

und weiss, niedrig, bis Anf. Juni.

** Europaeische Paeonien, in rot, rosa und gelb, halbhoch, bis Ende Mai.

Armeria Laucheana, rot, niedrig, bis Ende Juni.

①* Iris interregna, in blau, creme, gelb und weiss, halbhoch, bis Anf. Juni.

*O Pyrethrum hybridum, in rosa, fleischfarben, rot und dunkelrot, halbhoch, bis Ende Juni.

Centaurea mont.-Sorten, in blau, rosa, und weiss, halbh., öfter blühend.
Asperula odorata, weiss, bis Mitte Mai.

Calamintha alpina, lila, bis Anf. Aug.

Mimulus luteus × cupreus, orange, bis August.

Saponaria ocymoid., rosenr., Ende Mai. Dielytra eximia, rot, bis August.

Thymus Serpyllum, rosa u. weiss, bis Mitte Juni.

Zweite Hälfte Mai: Sträucher.

Von den vorhergehenden Sträuchern blühen noch:

Berberis, Pirus-Sort., Cytisus elong.,
Ribes alpin., Exochorda grdfl.,
Rhodora canadensis, Sambucus racem., Cytisus purpureus,
Prunus Padus u. virg., Syringa
vulg., Azalea moll., Xanthoceras
sorbif., Paeonia arb., Rubus deliciosus, Rhodotypus kerr.,
Viburnum Lantana u. toment.,
Lonicera tatar., Weigelia praecox, Cercis Siliqu., Kerria jap.,
Staphylea - Sorten, Caraganen,
Rhod.-Hybr., ferner noch:

Deutzia gracilis-Sorten, weiss, niedr., bis Mitte Juni.

Crataegus oxyac. - Sorten, in weiss, rosa und rot, hoch, bis I. Hälfte Juni. Laburnum vulg., gelb, baumartig, bis

erste Hälfte Juni.

Spiraea thalictroides u. van Houttel, weiss, halbhoch, bis Anfang Juni.

Calycanthus floridus, braun, niedrig, bis Anfang Juni.

 Viburnum op. sterile, weiss, hoch, bis Mitte Juni.

Weigelia rosea-Sort., in weiss, rosa, rot u. dunkelrot, halbh., bis Ende Juli. Syringa Jos., viol., hoch, b. I. Hälfte Juni. Deutz. discol. u. grac. Lem. - Hybr., weiss, niedrig, bis Ende Juni.

Spiraea Reevesi fl. pl., weiss, halbhoch, bis Mitte Juni.

Crataegus Carrièrei, weiss, hoch, bis Mitte Juni.

 Philadelphus coronarius-Sort., weiss, halbhoch bis hoch, bis Ende Juni.

Lem. Hybr., weiss u. weiss mit rot gefleckt, niedr., bis Ende Juni.

Robinia hisp,, rosa, niedr., b. Ende Juni.

" Ps. Acacia, weiss, baumartig, bis Mitte Juni.

Genista scoparia fl. albo, weisslich, halbhoch' bis Ende Juni.

Stauden.

Von den vorhergeh. Stauden blühen noch:
Asperula, Calamintha, Mimulus,
Saponar., Dielytra, Thymus,
Hieracium, Viola cornuta, Doronicum plantag. excels., Frühj.Phlox, Epimedien, Phl. amoena,
div. Laphami u. canad., Trollius,
Iberis semp.-Sort., Erlca carnea
u. carnea alba, Saxifragen, Iris
pumila hybr., Polemon. Rich.,
Aquilegien, Geum Heldreichi,
Viola cuc. grdfl., Papaver nud.
u. alp., Ranunculus, Prim. Sieb.,
Europaeisch.Paeonien, Armeria
Laucheana, Iris interregna,
Pyreth. hybr., Centaurea mont.

Sorten, ferner noch:

germanica, in blau, weiss, rosa,
gelb u. mehrfarbig, halbhoch, bis
Mitte Juni.

** Frühjahrs=Astern, in blau, weiss, rot u. lilarosa, niedrig, bis Mitte Juni.

 Lupinus polyphyllus, in blau, weiss und rosa, hoch, bis Ende Juli.
 Eremurus, in weiss u. rosa, hoch, bis

Mitte Juni.
Chrysanth. max. Davisii, weiss, halb-

hoch, bis Ende Juni.

Veronica spicata, blau u. rosa, niedrig,

bis Anfang Juli.
" incana und amethystina, blau,

niedrig, bis Anfang Juli.
" alpina u. rupestris, blau, niedrig,

bis Ende Juni.

Erigeron grdfl. elat., mattlila, niedrig, bis Ende Juni.

Anthericum=Sorten, weiss, halbhoch bis Mitte Juni.

• Heuchera, in rot, rosa und weiss, niedrig, bis Anfang August.

Thalictrum aquilegifolium purp., rot, hoch, bis Ende Juni.
 Papaver orientale, in rosa, rot und orange, hoch, bis Mitte Juni.

** Lychnis visc. spl. fl. pl., magentarot, niedrig, bis Mitte Juni.

** Dictamnus, in rosarot u. weiss, halb-

hoch, bis Mitte Juni.

Silene alpestris, weiss, niedrig, bis

Mitte Juni.

Hemerocallis flava, gelb, halbhoch, bis Mitte Juni.

Delphinium nudicaule, rot, niedrig, bis Mitte Juni.

Inula glandulosa, gelb, halbhoch, bis Ende Juni.

Gypsophila repens und monstrosa, weiss, bis Mitte Juni.

Horminum pyrenaicum, bis Anf. Juni.
Clematis recta, weiss, bis Ende Juni.

Dianthus suavis, weiss, bis Mitte Juni.
 Tradescantia, lila u. purp., bis Herbst.
 Geranium, lila, rosa, weiss, b. Mitte Juli.
 Hypericum lysimachioides, gelb, bis Mitte Juni.

Erste Hälfte Juni: Sträucher.

Von den vorhergehenden Sträuchern blühen noch:

Calycanth. floridus, Caraganen, Rhododendron - Hybriden, Rhodotypus kerr., Viburn. Lantana, V. opulus sterile, V. toment., Syringa vulg., Weigelia praecox, Crataeg. oxyac., Weigelia rosea, Crataeg. Carr., Spiraea thalict., Laburuum vulg., Spiraea

v. Houttei, Syringa Josikaea, Spiraea Reveesii fl. pl., Deutzia gracilis, D. discolor, D. grac., Lem. Hybr., Genista scop.fl.albo, Phil. coronar., Robinia Ps.=Aca= cia, Phil. Lem. Hybr., ferner noch:

Spiraea opulifolia, weiss, halbhoch, bis zweite Hälfte Juni.

Rhamnus frangula, weiss, hoch, bis zweite Hälfte Juni.

Sambucus nigra-Sorten, weiss, hoch, bis Ende Juni.

Cytisus Schipkaënsis, weiss, niedrig, bis Anfang August.

Hedysarum multijugum, rot, niedrig, bis Ende Juli.

Amorpha fruticosa, violett, hoch, bis Ende Juni.

Colutea arborescens, gelb, mit braunrot, hoch, bis Anfang Okt.

Von den vorhergehenden Stauden blühen noch:

Viola cornuta u. G. Wermig, Phlox amoena, Aquilegien, Phlox div., "Laphami" u. div. canad., Geum Heldreichi, Papav., nudic.u. alp., Ranunculus, Primula Sieb. ,Armeria Laucheana, Pyreth. hybr., Centaurea mont.=Sort., Iris ger= man., Frühjahrsastern, Lupinus polyph., Eremurus, Chrysanth. max. Davisii, Veronica alp., Erigeron grandifl. elat., Anthericum, Heuchera, Thalictrum aqui= legif. purpur., Papaver or., Lychnis visc. spl. fl. pl., Dictamnus, Silene alpestr., Hemerocallis flava, Inula gland., Hypericum lysimachioides, Geranium, Asphodelus, Mimulus, Tradescan= tia, Horminum, ferner noch:

Spiraeapalmatau. pal. alba, in purpurr. u. weiss, halbhoch, bis Ende Juli.

Dabeocia polifolia Var., in weiss u. rot, niedrig, bis Herbst.

Anchusa italica superba, blau, hoch, bis Ende August.

Gillenia trifoliata, weiss, halbhoch, bis Anfang Juli.

Stauden.

Digitalis, in verschiedenen Farben, hoch, bis Mitte Juli.

* Paeonia sin., in rot, rosa, creme, fleischfarbenu. weiss, hoch, bis Ende Juni.

Incarvillea Delavayi u. grandiflora, rosa, halbhoch, bis Ende Juni. Iris sibirica-Sorten, in blau u. weiss, halbhoch, bis zweite Hälfte Juni.

Pseud - Acorus, gelb, halbhoch, bis zweite Hälfte Juni.

Verbascum olympicum, gelb, hoch, bis Ende Juni.

Veronica amethystina, blau, niedrig, bis Ende Juni.

* Delphinium hybr.-Sorten, in hell-und dunkelblau, hoch, bis Mitte Juli.

Camp. pusilla, blau u. weiss, niedrig, bis Mitte Juli.

Erica Tetralix, in rot u. weiss, niedrig, bis Mitte Juli.

* Federnelken, in weiss, rosa u. farbig,

niedrig, bis Anfang Juli.

Rheingauer Gaillardien, gelb mit rot, halbhoch, bis zum Oktober. Linum-Sort., gelb, niedrig, bis Ende Aug.

Geum atrosanguin. fl. pl., rot, niedrig, bis Mitte Juli.

* Camp. persicif.-Varietäten u. grandis, in blau, hellblau u. weiss, halbhoch, bis Anf. Juli.

Scabiosa caucasica, blau, halbhoch, bis zum Herbst.

Aconitum, in blau, weiss u. zweifarbig, hoch, bis Mitte August.

Centaurea dealbata, rosa, halbhoch, bis Anfang September.

Ligularia speciosa, gelb, hoch, bis or Helenium Bigelowi, gelb, mit schwarzem Auge, halbhoch, bis Ende Juli.

*Spiraea Aruncus, weiss, hoch, bis Anfang August.

Camp. glomerata dahurica u. acaulis, blau, niedrig, bis zweite Hälfte Juli.

Salvia splendens-Sorten (nicht winterhart, müssen im Mai ausgepflanzt werden) rot, niedrig, bis Oktober (siehe Frühj.-Ergänzungsliste).

GeumHeldreichi magnificum, orange, bis Ende Juni.

Asphod. luteus, gelb, bis Ende Juni. Camp. pulla, C. Portenschlagiana u. Bavaria, blau, bis Ende Juni.

Astilbe chinensis, Astilbe Queen Alexandra, Beach Blossom, rosa, bis Ende Juni.

Delphinium Belladonna u. Varietäten, blau, bis September.

Potent. atros., Gibsoni, rot, bis Aug. lris ochroleuca, Monieri u. Monspur., weiss, blau u. gelb, bis Ende Juni.

Zweite Hälfte Juni: Sträucher.

Von den vorhergehenden Sträuchern blühen noch:

Rhod.-Hybr., Robinia hisp., Weigelia rosea,Deutzia grac.,Lem.=Hybr., Deutzia discol., Phil. coronarius und Phil. Lem., Hybr., Genista scop. fl. albo, Spiraea opulifolia, Rhamnus frangula, Sambucus nigr., Cytisus Schipk., Hedysar. multij., Amorpha fruticosa, Colutea arboresc., ferner noch:

Robinia viscosa, hellrosa, halbhoch, bis Mitte Juli.

Ptelea trifoliata, weiss, hoch, bis erste Hälfte Juli.

Deutzia crenata=Sorten, in weiss und rosa, halbhoch, bis Mitte Juli. Spiraea callosa-Sort., in weiss, rosa u.

rot, niedr. u. halbhoch, bis Ende Juli. Syringa jap., cremeweiss, halbhoch, bis Mitte Juli.

Spiraea Bumalda-Sorten, in rot und rosa, niedrig, bis zum Oktober.

Spiraea Bill., rot, halbhoch, b. Mitte Aug. ariaef., weiss, halbh., bis Mitte Juli. Douglasi, rosa, halbhoch, bis Mitte

August crispifolia, rosa, niedrig, bis Ende

August. Potentilla fruticosa, gelb, niedrig, bis Ende August

Buddleia variabilis-Sort., violettblau, halbhoch, bis zum Oktober.

Ceanothus = Sorten, in blau, rosa und lila, halbhoch, bis zum Oktober.

Stauden.

dealbata, Ligularia spec., Helenium Bigelowi, Salvien, Asphodelus, Camp. pulla, Portschl. 11. Bavar., Astilben, Delphinium Belladonna, Pot. Gibsoni, Iris ochroleuca, Monieri u. Monspur., Mimul., Clemat. recta, Calamintha, Geran., ferner:

Oenothera = Sorten, gelb und weiss, niedrig, bis September.

①* Delphinium chin., in dunkel-u. hellbl., halbhoch, bis Mitte August.

Potentilla hybr. fl. pl., in rot, orange u. gelb, halbhoch, bis Anfang Aug. Hemerocallis major u. fulva, gelb, halbhoch, bis Mitte August.

* Chrysanth. max.=Varietäten, weiss, halbhoch, bis Herbst.

Telekia speciosa, gelb, hoch, bis Ende Juli.

⊙o Camp. carp. compacta, blau, niedrig, bis September.

Chelone barbata cocc., rot, hoch, bis Ende August.

Thalictrum flav., gelb, bis Ende Juli.

Coreopsis=Sorten, gelb, halbhoch, bis zum Herbst.

Erica Watsoni u. Tetr. Mackayi, rot, 0 niedrig, bis Ende Juli.

①* Erigeron mesagr. spec. grdfl., blau, halbhoch, bis zum Herbst. Lathyrus latifol. albus, weiss, hoch,

bis Ende August. Digitalis ferruginea gigantea, braun,

bis Mitte Juli.

Von den vorhergehenden Stauden hlühen noch:

Viola cornuta, Aquileg., Armeria Laucheana, Papaver nud., Py-rethrum hybr., Lupinus polyph., Chrysanthem. max. Davisii, Ve= ronica alpina, Erigeron grandifl. elat., Heuchera, Thalictr.=Sort., lnula gland., Silene alpestris, Spiraea Aruncus, Daboecia polif.=Var., Anchusa, Paeonia sin., Incarvillea, Verbasc., Veron. ameth., Delph. hybr., Campa= nula=Arten, Erica Tetralix u. Tetr. alba, Federnelk., Rheingauer Gaillardien, Linum, Geum atrosang. fl. pl. u. Heldr. magn., Scabiosen, Aconitum, Centaur. Erigeron macranthum, hellila, halbhoch, bis Mitte Juli.

Centaurea ruthenica u. Tourneforti, gelb, hoch, bis Mitte August.

Pentstemon hybr. (nicht winterhart, müssen im Mai ausgepflanzt werden), in weiss, rosa, rot und dunkel-

Von den vorhergehenden Stauden

Weigelia rosea, Cytisus, Schipk., He-

Von den vorhergehenden Stauden

Viola cornuta, Papaver nudic., Heu-

chera, Anchusa, Digitalis, Delph.

hybr., Camp. pusilla, Erica Te-

tralix und Tetralix alba, Rhein-

gauer Gaillardien, Lupinus po-

lyph., Linum, Geum atrosang.

fl. pl., Camp. pers. Var. und

grandis, Scabiosa cauc., Aconi-

tum, Centaurea dealbata, Ligu-

laria spec., Helenium Bigelowi,

Camp. glom. dahurica u. acau-

lis, Hemerocallis, Salvien, Po-

tentilla, Buphthalmum spec., Chrysanth. max.-Sorten, Camp.

carp.compacta, lris ochroleuca-

Sorten, Oenothera-Sorten, Che-

lone barb. cocc., Thalictr. flav., Coreopsis-Sorten, Erica Wat-

soni u. Tetr. Mackayi, Erigeron

mesagr.spec.grdfl.u.macranth.,

Lathyrus latif. albus, Centaurea

ruth. und Tourneforti, Pentste-

dysarum multij., Robinia visco-

blühen noch:

blühen noch:

rot, halbhoch, bis zum Oktober (siehe Frühjahrs-Ergänzungsliste).

*Spiraea jap.-Varietäten, im Farbenspiel von weiss bis rosa, halbhoch, bis Ende Juli.

♂米 Astilben in Sorten; weiss, rosa, rot halbhoch bis Ende Juli.

* Knollen-Begonlen (nicht winterhart, müssen im Mai ausgepflanzt werden), in rot, rosa, gelb, weiss und dunkelrot, niedrig, bis zum Oktober (siehe auch Frühjahrs-Ergänzungsliste).

Erste Hälfte Juli: Sträucher.

sa, Deutzia crenata-Sorten, Spiraea callosa u. Bumalda-Sorten, Spiraea Billardi, ariaefolia, Douglasi, crispif., Potentilla frutic.,

Colutea arbor., Buddleia var.-Sorten, Ceanothus, ferner noch: Cytisus nigricans, gelb, niedrig, bis Ende Juli.

Stauden.

mon hybr., Spiraea jap. Var., Astilben, Knollenbegonien, Delph. Belladonna-Varietäten, Calamintha, Mimulus, Digitalis, Geranium, Astilbe grandis, Potentilla Tradescantia; - ferner noch:

Yucca filamentosa, weiss, hoch, bis Mitte August.

Harpalium, gelb, hoch, bis Mitte Sept. Liatris-Sorten, lila u. purpurrosa, niedrig und hoch, bis Ende August.

Phlox decussata, in blau, rot, rosa und weiss, halbhoch u. hoch, bis zum Herbst.

Gypsophila paniculata und pan. fl. pl., weiss, halbhoch, bis Mitte August.

Camp. pyramidalis, in blau und weiss, hoch, bis Mitte August. Camp. alliariaefolia, weiss, hoch, bis

Mitte August. **Chornelken in allen Farben, halbhoch,

bis Mitte August. Monarda didyma, rot, halbhoch, bis Mitte August.

* Wahlenbergien, in blau und weiss, halbhoch, bis Ende August.

Veronica Hendersoni, blau, halbhoch, bis Ende August.

Cimicifuga racemosa, weiss, hoch, bis Anfang August.

Bocconia japonica, weiss, hoch, bis Ende August.

* Astilbe Arendsi, im Farbenspiel von weiss bis purpurrosa, halbhoch, bis Mitte August.

* Astilbe Davidii, purpurrosa, hoch, bis Mitte August.

* Helenium pum. magnificum, gelb, halbhoch, bis Anfang September.

Euphorbia polychroma, gelb, bis Sept. Heliopsis comp. florib., gelb. bis Sept. Chelone Lyoni, rosa, bis Anfang Aug.

Astilbe grandis, weiss, bis Ende Juli. Potentilla hybr., in orange, gelb und dunklen Farben, bis Ende Juli.

Cyclamen europaeum, rosenrot, bis

Senecio, gelb u. orange, bis Ende Juli.

Zweite Hälfte Juli: Sträucher.

Von den vorhergehenden Sträuchern blühen noch:

Weigelia rorea, Hedysarum multij., Colutea arboresc., Spiraea-Sorten, Potentilla fruticosa, Buddlela var., Ceanothus, Cytisus nigric., Cytisus Schipk., ferner noch:

Von den vorhergehenden Stauden

Viola cornuta, Heuchera, Anchusa,

Lupinus, Spiraea, Salvien, Rhein-

gauer Gaillardien, Linum, Sca-

biosa cauc., Aconitum, Centaurea dealbata, Helenium Bi-

gelowi, Oenothera, Delph. chin.,

Potentilla hybr. fl. pl., Hemero-

callis, Chrysanth. max.-Sorten,

Camp. carp. comp., Chelone

barb. cocc., Erica Watsoni und

Tetr. Mackayi, Erigeron mesagr.

spec. grdfl., Centaurea ruth. und

Tourneforti, Lathyr. latif. alb.,

Pentstemon hybrid., Spiraea

blühen noch:

Tamarix gallica, rosa, baumartig, bis Ende September.

Tamarix hisp. aestivalis, rosa, halbhoch, bis Ende August. Amorpha canescens, violettblau,

niedrig, bis Mitte August. Sambucus pubescens max., weiss, hoch, bis Anfang September.

Desmodium pendulifl., violett, niedrig, bis zum Oktober.

Koelreuteria paniculata, gelb, baumartig, bis Mitte August.

Hydr. paniculata u. arb. grdfl. alba weiss, niedr., bis Ende Sept.
Spiraea sorbifolia, weiss, halbhoch, bis Mitte August.

Stauden.

begonien, Yucca fil., Harpalium, Liatris, Phlox dec., Gypsophila, Camp. pyr. u. alliariaefol., Chornelken, Monarda didyma, Wahlenberg., Veronica Henders., Cimicifuga racemosa, Bocconia jap., Astilben, Helenium pum. magnif., Pot. Gibsoni, Euphorbia, Mimulus, Delph. Belladonna u. Varietäten, Tradescantia, Chelone Lyoni; ferner noch:

⊙★ Gladiolus, in blau, rosa und hellfarbig, hoch, bis Mitte September.

* Rudbeckia Neumanni, gelb, halbhoch bis Ende September.

Stenanthium robustum, weiss, bis Mitte August.

Rudbeckia purpurea, purpurrosa, hoch, bis zum Herbst.

Malven, in weiss, rosa, rot und gelb, hoch, bis Ende August.

Statice-Sorten, blau, halbhoch, bis Ende August.

♂* Calluna vulg.-Sorten, weiss und rosa, niedrig, bis Ende August.

Polemonium Rich. (2. Blüte), in blau und weiss, halbhoch, bis Ende August.

Blüten=Canna, grossblumige Sorten (nicht winterhart, müssen im Mai ausgepflanzt werden), in allen Farben ausser blau, hoch und halbhoch, bis zum Oktober.

jap.-Varietät., Astilben, Knollen-Erste Hälfte August: Sträucher.

Von den vorhergehenden Sträuchern blühen noch:

Colutea arboresc. Spiraea Bum .-Sorten, Spiraea Billardi, Douglasi und crispif., Buddleia var., Ceanothus, Tamarix gallica, Tamarix hisp. aestiv., Amorpha canesc., Sambucus pub. max., Desmodium pendulifl,, Koelreuteria pan., Hydrangea ar boresc. grdfl. alba, Hydr. pan., grdfl., Spiraea sorb., ferner noch:

Hibiscus syriacus, in blau, weiss, rot und rosa, halbhoch, bis zum Okt.

Von den vorhergehenden Stauden blühen noch:

Viola cornuta, Heuchera, Anchusa, Gaillardien, Linum, Rheingauer Scabiosa cauc., Aconitum-Sorten, Centaurea dealbata, Salvien, Stenanthium, Tropaeolum, Oenothera, Delph. chin., Chrysanthemum max.-Sorten, Camp. carp. comp., Chelone barb. cocc., Coreopsis, Erigeron mesagr. spec. grdfl., Lathyrus latif. alb., Pentstemon hybrid., Centaurea ruth. und Tourneforti, Spiraea jap.

Variet., Knollenbegonien, Hemerocallis, Yucca fil., Harpallum, Liatris, Phlox dec., Gypsophila, Camp. pyr., Monarda didyma, Wahlenbergien, Veronica Henders., Bocconia jap., Astilben, Helenium pum. magnif., Gladiolus, Rudbeckia Neumanni, Rudbeckia purp., Malven, Statice. Calluna Sorten, Polemonium Rich.,

Canna, ferner noch: Silene Schafta, rot, bis Ende August, Solidago - Sorten, gelb, halbhoch und hoch, bis Ende Sept.

Rudbeckia nitida und laciniata-Sort., gelb, hoch, bis Ende Sept.

* Edeldahlien (nicht winterhart, müssen im Mai ausgepflanzt werden), in allen Farben, halbhoch und hoch, bis zum Oktober.

Helianthus-Sorten, gelb, hoch, bis Ende September.

of Aster Am. Framfieldi, blau, halbhoch, bis Ende September.

ib. Ultramarin, blau, halbhoch, bis Ende September.

modium pendula, Hydrangea arb.

grandiflora alba, Hydrangea panicul.

Eupatorium purpureum, rot, hoch,

bis Ende September.

bis Ende September

Tritoma, rot, hoch, bis zum Okt.

* Herbst-Anemonen, in weiss, rosa und

♂ Herbst - Astern, in blau, weiss, lila,

und hoch, bis Oktober.

rot, halbhoch, bis z. Okt.

Pyrethrum uliginosum, weiss, hoch,

rot und rosa, niedrig, halb-hoch

grdfl., Hibiscus syriac.

Zweite Hälfte August: Sträucher.

Stauden.

Von den vorhergehenden Sträuchern blühen

Colutea arboresc., Spiraea Bum.-Sorten,

noch:

Viola cornuta, Anchusa, Rheingauer Gaillardien, Linum, Scabiosen, Centaurea dealb., Salvien, Oenothera, Camp. carp. comp., Chelone barb. cocc., Coreopsis, Erigeron mesagr. spec. grdfl., Lathyrus latif. alb., Potentilla Gibsoni, Cephalaria, Del-phinium, Delph. Belladonna und

Von den vorhergehenden Stauden blühen

Es blühen noch folgende Sträucher:

Colutea arboresc., gelb mit braun, hoch.

Spiraea Bum.-Sort., rosa, rot, niedr.

Es blühen noch folgende Stauden: ** Rheingauer Gaillardien, in buntem Farbenspiel, halbhoch.

Salvia splendens-Sorten (nicht winterhart, müssen im Mai ausgepflanzt werden), rot, niedrig, Frühjahrs-Ergänzungsliste). (siehe Oenothera missour., gelb, niedrig.

Coreopsis-Sorten, gelb, halbhoch.

*Erigeron mesagr. spec. grdfl., blau, halbhoch.

* Pentstemon hybr. (nicht winterh., müssen im Mai ausgepflanzt werden), in rot, rosa, weiss und dunkelrosa, halbhoch (siehe Frühj.-Ergänzungsliste).

Es blühen noch:

Colutea arboresc., gelb mit braun, hoch. Spiraea Bum. - Sorten, rosa und rot, niedrig.

Es blühen noch:

Salvia splendens, rot, niedrig (siehe Frühj.-Ergänzungsliste).

* Pentstemon - Hybriden, in rot, rosa, weiss und dunkelrot, halbhoch (siehe Frühjahrs-Ergänzungsliste). Spiraea crispifolia, Potentila fruticosa, Buddleia Var., Ceanoth., Tamarix gallica und hisp. aestivalis, Sambucus pubescens maxima, Des-

Var., Heliopsis, Artemisia, Euphorbia, Pentstemon hybr., Knollenbegonien, Harpalium, Liatris, Phlox dec., Wahlenbergien, Veron. Henders., Bocconia jap., Helenium pum. magnif., Gladiolus, Rudbeckien, Malven, Statice, Calluna-Sorten, Polemonium Rich., Blüt.-Canna, Edel - Dahlien, Solidago, Helianthus, Aster Am., Framfieldi, Aster ib., Ultramarin,

September: Sträucher.

ferner noch:

Buddleia-Sorten, violettblau, halbhoch. Ceanothus-Sorten, in hell- und dunkelblau undrosa, halbhoch.

Tamarix gallica, rosa, hoch. Desmodium pendulifl., violett, niedrig. Hydrangea arb. grdfl. alba und pangrdfl., weiss, niedrig.

Hibiscus syr.=Sorten, in blau, rosa, rot und weiss, halbhoch.

Caryopt.mastacanth.,dunkelbl.niedrig.

Stauden.

Delphinium Belladonna u. Var., hellblau und blau, hoch.

Liatris=Sort., purpurlilarosa, halb-hoch und niedrig. Phlox dec., in blau, rot, rosa u. weiss,

halbhoch und hoch. Gladiolus, in rot, rosa und hellfarbig,

hoch. Blüten-Canna (nicht winterhart, müssen im Mai ausgepflanzt werden), inallen Farben, ausser blau, halb-

hoch und hoch. * Edel-Dahlien, (nicht winterhart, müssen im Mai ausgepflanzt werden), in allen Farben, halbhoch u. hoch.

Solidago, gelb, hoch.

Rudbeckien, in rot und gelb hoch.

** Rudbeckia Neumanni, gelb, halbht. Helianthus = Sorten, gelb, hoch.

* Aster Am. Framfieldi und ib. Ultramarin, blau, halbhoch.

* Herbst-Astern, in dunkel- u. hellblau, rot, rosa, lila u. weiss, hoch u. niedr. Eupatorium purpureum, rot, hoch, bis Ende September.

Tritomen, rot, hoch. Herbst=Anemonen, in rot, rosa und weiss, halbhoch.

Pyrethrum uliginos., weiss, hoch. *Winterharte Chrysanth. Indic., in rot, rosa, orange, gelb und weiss, halbhoch.

Diplostephium amygdalinum, weiss, bis Oktober.

Oktober: Sträucher.

Buddlela-Sorten, violettblau, halbhoch. Ceanothus = Sorten, in rosa, hell- und dunkelblau, halbhoch.

Desmodium pendulifi., viol., niedrig.

Hibiscus syr., in blau, rot, rosa und weiss, halbhoch.
Caryopteris mastacanth., dunkelblau,

niedrig.

Stauden.

Blüten-Canna, in allen Farben, ausser blau, halbhoch und hoch.

** Edel - Dahlien, in allen Farben, halbhoch und hoch.


Or Herbst = Astern, in dunkel- und hellblau, rot, rosa, lila und weiss, hoch und niedrig.

Diplostephium. weiss, hoch.

Tritomen, rot, hoch.

* Herbst=Anemonen, in rot, rosa und weiss, halbhoch.

Winterharte Chrysanthemum indicum, in rot, rosa, orange, gelb u. weiss, halbhoch.



Clematis (Waldrebe).

Um den vollen Genuss der herrlichen Schönheit der Clematis-Blüte zu haben, pflanze man:

1. die richtigen Sorten, 2. vermeide man die heisse Mittagssonne für die Pflanzen und 3. dürfen die Pflanzen niemals zu nass werden.

Beachtet man diese 3 Faktoren genau, so hat man nicht mehr den Aerger über das plötzliche Absterben der Blütenranken.

Die richtige Sortenauswahl geben wir untenstehend an. Als Standort ist die Ostseite des Hauses die beste; Süd- und Südwestseite wähle man nicht, oder nur dann, wenn das Terrain zugleich abschüssig ist.

Unter keinen Umständen darf Wassertraufe die Pflanzen treffen. Jeder Standort im Garten, der nicht feucht und mittags Schatten, morgens aber Sonne gewährt, ist günstig.

Man gebe beim Pflanzen kräftige Düngernahrung, ist der Boden undurchlässig schwer, so mische man ihn mit Kies zum Wasserabzug.

Angewachsene Pflanzen vertragen im Frühjahr den Rückschnitt gut bis kurz über den Boden, nur die am alten Holze blühenden Sorten der patens- und florida-Klasse dürfen nicht kurz abgeschnitten werden, da sonst das Blütenholz entfernt würde.

Wo es angängig ist, raten wir, kräftige, junge Topfpflanzen mitten im Wachstum Anfang August auszupflanzen. Doch ist letzteres nicht unbedingt erforderlich.

Besonders widerstandsfähige Clematis.

Aus der grossen Sortenwahl der Clematis haben wir nur die besten, widerstandsfähigen ausgesucht in den verschiedenen Farben.

Comète, halbgefüllt, weiss mit rosa Aussenrand.

Colette Deville, purpurrot.

Countess of Lovelace, bläulich lila gefüllt.

Countess of Onslow. Eine Coccinea-Hybride. Blüten krugförmig, leuchtend rosa, dunkel gebändert.

Duchess of Edinburgh, weissgefüllt.

Duke of Edinburgh, dunkelblau.

Henryi, reinweiss und besonders grossblumig.

Jackmanni, die bekannte, reichblühende Sorte, violettblau, ist immer ausserordentlich dankbar.

Jackmanni superba, dunkelpurpurviolett.

Integrifolia Durandi, die bekannte Eisern-Kreuz-Clematis. Stahlblau, in Büscheln blühend und nur ca. 3 m hoch wachsend.

Lady Caroline Neville, weiches Hellblau, dunkel gebändert.

Lady Northcliffe, dunkellavendelblau, weisse Staubfädenbündel. Lanuginosa, blaugrau.

Lucie Lemoine. weissgefüllt.

Mad. Edouard André, leuchtend samtig amarantrot, reichblühend. Mad. Baron Veillard, lilarosa.

Marcel Moser ist eine gesundbleibende Sorte mit sehr grossen Blumen; hellblau mit rötlich violetten Mittelstreifen.

Max Leichtlin, reinweiss, reichblühend.

Miss Strick, gefüllt, violett, später sich lila färbend, aussen grün gestreift.

Proteus, lilarosa, gefüllte und einfache Blumen.

Ramona, lavendelblau.

The President, dunkelblau.

The Queen, zart lavendelblau.

Velutina purpurea, samtig purpurviolett.

Ville d'Angers ist eine herrliche Sorte, deren grosse, aus gewellten Blättern geformte, lichtlavendelblaue Blumen dicht gedrängt stehen.

Ville de Lyon ist eine prächtige, rote Clematis. Diese verbindet mit kräftigem, widerstandsfähigem Wachstum grossen Reichtum herrlicher, leuchtend karmesinroter Blumen. Grossblumig.

Ville de Paris, sehr grosse, weisse Blumen mit rötlichen Adern.
Viticella kermesina, sehr gesund wachsend und reichblühend, karmesinrot.


Xerxes, violett mit rot gestreift.

Der Preis der Sorten ist nach Bestellers Wahl: 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—, 100 St. M 90,—. Clematis in Sorten unserer Wahl kosten: 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—.

Schlingpflanzen: Clematis (Waldrebe). Neuheiten.

Clematis viticella "Abendstern" (G. & K.), Neuheit dieses Jahres, siehe Seite 10.

- "Jackmanni rubra". Obwohl keine eigentliche Neuheit mehr ist diese herrliche Clematis leider noch so wenig bekannt und verbreitet, dass wir nicht unterlassen möchten, sie ganz besonders zu empfehlen. Die Blütezeit fällt 8 bis 10 Tage vor der bekannten blauen Jackmanni und dauert wie bei dieser mehrere Wochen. Die Farbe ist ungemein vornehm, leuchtend samtig weinrot, ohne in der Sonne zu verblassen. Reichblühend und hart 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—
- Lasurstern (G. & K.). Prachtvoll rein tiefblau ist der 6—8 blättrige Blütenstern, in dessen Mitte sich ein weisses Strahlenbündel von Staubfäden in leuchtend scharfer Farbenwirkung abhebt. Die zahlreichen Blumen haben selbst an jungen Pflanzen bis 16 cm Durchmesser. Die Neuheit gehört zur Patens-Klasse und eignet sich wegen ihrer frühen und reichen Blüte ganz besonders gut zum Treiben in Töpfen . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—
- blühende Clematis für das Frühjahr. Seit langem ist uns keine so wertvolle Pflanze beschert worden wie diese Neueinführung aus der Mandschurei. Absolut winterhart in dichter Fülle reinrosa, April-Mai blühend, mit mittelgrossen Blüten von 8 cm Durchmesser ist sie eine starkwachsende Schlingpflanze mit rötlichen Trieben und rötlich schattiertem Laube. Zum Treiben ganz besonders geeignet.





Clematis Lasurstern. (Ausschnitt aus nebenstehendem Bilde.)

- montana perfecta. Aus einer Kreuzung von Clematis mont. grandifl. mit Clematis mont. rubens. Die Blüten sind wenig grösser als Clematis mont. grandifl. und zeigen licht azurblaue Färbung

Vier überall und schnell gedeihende Clematis.

Clematis montana grandiflora

(für die Blüte im April-Mai)

wächst am kräftigsten von allen Clematis und bildet starke Holztriebe, daher zur Laubenbildung und Berankung grosser Flächen besonders geeignet. Die berankten Stellen sind dann im April bis Mai überschüttet mit 4—5 cm grossen, schneeweissen Blüten.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Clematis orientalis tangutica

(für die Blüte im Juni).

Die langgestielten goldgelben Blüten bedecken in reicher Fülle die Enden der Blütentriebe. Die Sorte ist starkwachsend. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Clematis paniculata

(für die Blüte im September-Oktober)

eine japanische Schlingpflanze von kräftigem Wuchse, die sehr schnell die zu berankende Fläche mit schönem, glänzend grünem Laube bedeckt. Die kleinen Blüten sind reinweiss und überschütten — in Büscheln blühend — in unglaublicher Menge das Laub mit einer weissen Schicht von köstlichem Wohlgeruch. Die Blütezeit ist im September 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Clematis repens

(für die Blüte im August).

In ihrer äusseren Erscheinung (besonders im Wuchs) an Clematis montana erinnernd, sind die ebenfalls weissen Blüten dieser schönen Art bedeutend grösser als die der ersteren und zeigen sich im August 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—

Die vier Sorten haben den grossen Vorteil, dass sie niemals durch Krankheit zu leiden haben, sondern kerngesund und üppig wachsen.



Ampelopsis Veitchi.

Selbstklammernde Schling= pflanzen.

Nicht nur kahle Hauswände, Mauern und unschöne Schornsteine werden durch diese rasch wachsenden und sich selbst anklammernden Schlingpflanzen in angenehm wirkende, gleichmässig grüne Flächen oder grüne Säulen umgewandelt, sondern auch zur Belebung der Architekturbei Villen, Kirchen oder Brücken finden diese schönen Pflanzen immer mehr Anwendung.

In rauhen Gegenden oder für besonders grosse Flächen ist es ratsamer, Ampelopsis hederacea oder Engelmanni zu verwenden, während für sonnige Lagen und für architektonischen Schmuck die Ampelopsis (Vitis) Veitchi-Arten anzuraten sind.

Ampelopsis dumetorum laciniata. Eine neue stark wachsende Art mit gefiederten Blättern und tieflappigen Blättchen 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Ampelopsis (Wilder Wein).

Ampelopsis Veitchi (Vitis Veitchi).

Eine zur Bekleidung von Wänden nicht genug zu empfehlende Rankpflanze, die sich mit kleinen zierlichen Klammern wie mit kleinen Füsschen festhält und die berankte Fläche mit einer dicht übereinander liegenden Blattschicht bedeckt, die sich im Herbst blutrot färbt. Im ersten Winter verlangt die Pflanze Schutzdeckung. Sonniger Standort ist notwendig.

Pflanzen mit Topfballen:

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-, 100 St. M 80,-

- Ampelopsis Veitchi gigantea ist in allen Teilen stärker wachsend, mit grösseren Blättern und stärkeren Trieben als die vorige. Diese ins gröbere übersetzte Form ist für alle besonders hohen Mauern oder Schornsteine zu empfehlen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
 - "Veitchi purpurea ist eine auffallend zierliche, japanische Form, deren junge Triebchen in Laub und Holz rot und deren ältere Blätter braunrot gefärbt sind und die alle eine prachtvoll rote Herbstfarbe bekommen. Diese Sorte ist ihres zierlichen Wuchses wegen für niedrige Wandflächen zu empfehlen . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
 - " radicantissima (= hederacea hort.), der festhaftende, selbstkletternde, wilde Wein, der sich im Weiterwachsen selbst festklammert. Die dunkelgrünen Blätter haben fast die Grösse des wilden Weines.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

" radicantissima Engelmanni ist eine schöne, ebenfalls selbstklammernde Form des vorigen, hat aber kleinere Blätter und ausgeprägte, braunrote Herbstfärbung.


1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,—

Ampelopsis Henryana (Neu!) der buntblättrige wilde Wein ist eine prächtige Neuheit, die aus China eingeführt worden ist. Die dunkelgrünen Blätter sind an der Unterseite bronzekarminrot und oben in scharfen Linien silberweiss geadert. An älteren Pflanzen bekommen die Klammern Haftfüsschen und klammern sich dann selbst fest. Die Neuheit ist im Alter gänzlich winterhart, doch raten wir die jungen Pflanzen noch gut zu schützen. Ein Bedecken der Pflanzen mit Tannenreisig ist zu empfehlen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein). Der bekannte wilde Wein sollte überall dort angepflanzt werden, wo es sich darum handelt, ein rasches Wachstum selbst bei geringer Pflege zur Bildung von Lauben oder zur Mauerdeckung zu erzielen . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Extra starke, bis über 3 m hohe Pflanzen:

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

Hedera. - Lonicera.



Weissbunter Efeu.

Wie die obenstehende Abbildung zeigt, kann auch dem kleinsten Hausgarten durch die veranschaulichte Verwendung der vielgestaltigen Efeu-Formen ein dauernder auffallender Schmuck verliehen werden. Als Umrahmung von Sitzplätzen oder als Deckung gegen die Hauswand, besonders an schattigen Stellen, eignen sich die Efeu-Kästen ungemein. Deren Herstellung ist sehr einfach und in guter nahrhafter Erde entwickeln sich die Pflanzen sehr rasch und können, wenn man hier und da mit flüssigem Dünger noch nachhilft, mehrere Jahre in den Kästen verbleiben.

Letztere überwintert man am besten in einem hellen, wenn auch nur eben frostfreien Raum im Wohnhause, wo sie dann auch während der Wintermonate zierend wirken können.

Alle nachgenannten Efeu-Varietäten eignen sich für diesen Zweck, ganz besonders aber die herrliche, weissbunte Hedera madeyriensis, ebenso auch die kleine Hedera elegantissima variegata.

Wir liefern Pflanzen aus Töpfen zum Auspflanzen in die Kästen.

Hedera Helix hibernica. Grossblättriger Efeu, der für alle Zwecke immergrüner Flächenbekleidung, insbesondere auch im Schatten, sich stets eignet und an Gebäuden, Mauern, Säulen, Gräbern, vielfach Verwendung findet. Starke Topfpflanzen mit 4—5 Ranken . . 1 St. 16 0,75, 10 St. 16 6,—

" Helix arborea speciosa. Eine völlig winterharte. weissbuntblättrige Efeuart, die sehr gut im Freien aushält, 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Helix madeyriensis. Ein leuchtend weissbuntblättriger Efeu, der seiner herrlichen Blattfärbung wegen ganz besondere Empfehlung verdient, doch muss er im Winter in einem geschützten Raume stehen . 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Helix elegantissima var., der kleinblättrige, weissbunte Efeu ist vollkommen winterhart und bei seiner leuchtenden Färbung in der zierlichen Form der Blättchen und Triebe zur Berankung niederer Mauern besonders zierend.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

" atropurpurea, dunkelblättrig.

" digitata, mit fingerförmigen Blättern.

" "Clouded Gold" mit gelbgewölkten Blättern.

"Emerald Gem" tief dunkelgrün, grossblättrig.

, " Golden Blotch, mit goldgelben Flecken.

" gracilis, fein und zierlich.

, hibernica varieg., grossblättrig, gelbbunt.

" laciniata, zierliche, geschlitzte Blätter.

.. .. maculata, bunt.

" " **microphylla elegans**, sehr zierliche, tief eingeschnittene Belaubung.

" obovata rhomboidea.

Obige Sorten kosten: 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Lonicera oder Caprifolium (Geissblatt)

Jelängerjelieber.

Die volkstümliche Beliebtheit dieser duftenden, schönblühenden Schlingpflanzen hat sie wie mit einem poetischen Hauche umgeben. — Lauben, Guirlanden oder Säulen- und Geländerumrankungen von Jelängerjelieber dürfen in keinem deutschen Garten fehlen.

Lonicera brachypoda aureo-reticulata ist ein schönes, goldbuntblättriges Geissblatt, das ebensowohl als Schlingpflanze, wie auch als rankende Pflanze für Felspartien geeignete Verwendung finden kann. . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

, Caprifolium, das Gartengeissblatt, blüht im Juni mit zahlreichen rötlich-weissen, duftenden Blütendolden.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

fuchsioides, das reizende fuchsienblütige Jelängerjelieber ist von allen feineren Arten die härteste, die bis in den Spätherbst dankbar blüht und besonders schön ist durch seine granatroten Blüten, die innen einen gelben Schlund haben.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Halleana mit köstlich duftenden weissgelben Blüten in verschwenderischer Fülle. . . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Periclymenum ist ein schönes wohlriechendes Geissblatt mit gelblichen Blüten, vom Juni bis September blühend.

1 St. # 0,75, 10 St. # 6,—

" sempervirens flava nova mit hellgelben Blüten.

1 St. M 1,40, 10 St. M 12,50

grünem Laube und roten Blüten. Sehr reichblühend und nicht stark wuchernd. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Akebia. — Aristolochia. — Bignonien. — Glycinen. — Periploca. Polygonum.



Glycinen-Laubengang (aus unseren Anlagen).

Akebia quinata ist eine Schlingpflanze mit zierlichen, blaugrünen Blättern, die Anfang Mai in violetten Trauben blüht 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Aristolochia Sipho. Der Pfeifenschlingstrauch oder Osterluzei ist eine beliebte, stark- und raschwachsende Schlingpflanze, die mit ihren grossen, herzförmigen, dunkelgrünen Blättern eine dichte Wand bildet, und deren Blüten die Form einer kleinen Pfeife haben.

Starke Pflanzen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Bignonien. Die Bignonien mit ihren prächtigen Dolden grosser, trompetenartiger Blumen an den Endspitzen der Triebe, werden immer mehr beliebte Schlingpflanzen.

Bignonia sinens. grdfl. Princei coccinea, stark wachsend, mit leuchtend roten Trompetenblumen, 1 St. M 1,40, 10 St. M 12,50

- " sinens. grandiflora Mad. Galen, reichblühend und dunkler als grandiflora . 1 St. M 1,40, 10 St. M 12,50
- grandiflora speciosa, sehr reichblühend mit orangefarbenen Trompetenblumen. Diese Sorte verlangt Schutz im Winter 1 St. M 1,40, 10 St. M 12,50
- radicans grdfl. ist eine Form der starkwachsenden Ursprungsart mit grösseren Blüten. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Periploca graeca, die griechische Schlinge mit dunkelgrünen Blättern und braunen wohlriechenden Blüten. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Glycinen (Glycine oder Wistaria). Pflanzen aus dem freien Lande.

Glycine sinensis alba, eine prachtvolle Abart der vorigen mit reinweissen Blütentrauben.
Starke Pflanzen 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—

multijuga alba hat die langen Blütentrauben der multijuga in weisser Farbe. Extra starke Pflanzen mit 2-3 m langen Ranken . . 1 St. M 2,50, 10 St. M 20,-

Glycinen-Topfpflanzen.

Die Topfpflanzen der Glycinen haben zwar nicht so starke Ranken wie die Freilandpflanzen, dafür aber den Vorteil des leichteren Anwachsens.

Glycine sinensis (siehe oben).
Extra starke Pflanzen mit Topfballen 1 St. M 3,50

- sinensis alba (siehe oben).
 Extra starke mit Topfballen 1 St. M 3,50
- multijuga alba.

 Dreijährige Topfpflanzen 1 St. M 2,50
- Polygonum Baldschuanicum, ist eine sehr starkwachsende, prächtige Schlingpflanze, deren Zweigspitzen von August an bis zum Herbst in reicher Fülle leichte, fedrige, weisse Blütenrispen mit rosa Anhauch tragen.

 1 St. M 1,25—1,75, 10 St. M 10,00—15,00
 - Aubertii. Neu! Eine ungemein stark wachsende Art, die in einem Jahre über 4 m Höhe erreicht. Vorzüglich um grosse Flächen schnell zu bekleiden. Die zahlreich an den äussersten Triebenden erscheinenden Blütenrispen haben eine reinweisse Farbe. Die jungen Triebe dieser Sorte sind bräunlich gefärbt 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Schling- und Kletterrosen siehe unter Rosen Seite 120-121.

II. ABTEILUNG:

OBSTBAUMSCHULEN!

Sie finden auf Seite:

83-92 Obstbäume und Fruchtsträucher
94 Magnolien
94-95 verpflanzte Zierbäume
96 Allee- und Trauerbäume
97-98 Schmuck-Halbhochstämme
99-100 Neuheiten
101-110 Alphabetisches Verzeichnis
111 Zusammenstellungen
112-118 Koniferen
110-121 Rosen und Schlingrosen

122 Inhalts-Verzeichnis



Bei Anlage von Obstgärten und grösseren Baumpflanzungen vorherige Kostenberechnung.

ZUR NEUANLAGE VON GÄRTEN

machen wir auf unsere grossen Vorräte

verpflanzter Zierbäume

(S. 94-96) und auf unsere herrlichen Bestände prachtvoller Koniferen besonders aufmerksam.

Wir laden Interessenten freundlichst zur Besichtigung unserer

BAUMSCHULEN

ein.

Unser Angebot in Grassamen erscheint in der Frühjahrsliste.

Unsere Firma ist Mitglied des Verbandes der Baumschulbesitzer der Provinz Hessen-Nassau und des Grossherzogtums Hessen, sowie des Bundes der deutschen Baumschulbesitzer.

Diese Vereinigungen nehmen nur solche Firmen als Mitglied auf, deren Betrieb Gewähr dafür bietet, dass sie durch Lieferung erstklassigen Materials Nutzen stiften.

Verkaufs= und Versandbedingungen

der Mitglieder des Bundes der Baumschulenbesitzer.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieserant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

— Mit dem Erscheinen des neuen Katalogs verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung.

- 1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto.
- 2. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Tausendpreis bei 500 Stück.
- 3. Portoabzüge sind unstatthaft.
- 4. Nach dem Ausland wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
- 5. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Niederwalluf.
- 6. Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetzte Abmachungen vorliegen. Langjährigen Kunden wird 3 Monate Ziel gewährt. Nach Verstreichung dieser Frist wird der Betrag gegen Quittung durch Nachnahme erhoben.
- 7. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Kataloges nicht massgebend, werden vielmehr dem Werte der gewählten Exemplare entsprechend geändert.

Versand.

- 1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- 2. Für auf dem Versand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar,
- 3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung.

- 1. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet.
- 2. Emballagen werden nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn und zum Schiff trägt der Besteller und wird dasselbe als Barvorschuss nachgenommen.

Bürgschaft.

- 1. Bürgschaft für das Anwachsen muss abgelehnt werden.
- 2. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.

Ersatz.

1. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten ist.

Muster und Maasse.

- 1. Muster sollen nur Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
- 2. Maasse sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beschwerden.

- 1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben
- 2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Obstbäume.

Hochstämme mit prachtvollen, starken, geraden Stämmen und guten Kronen.

Zwergformen, sorgfältig gezogen, mit kräftigen Trieben.

Sorten - echt! - auf eine Auswahl der besten beschränkt.

Das Pflanzen der Obstbäume.

Eine nicht sorgfältig ausgeführte Pflanzung stellt den ganzen Erfolg in Frage, weshalb wir unsere Kunden bitten, folgende Winke genau zu beachten:

- 1. Die Herbstpflanzung ist, wenn tunlich, entschieden der Frühjahrspflanzung vorzuziehen.
- 2. Vor dem Pflanzen lasse man die Baumlöcher auswerfen, für Hochstämme immer wenigstens 1 m im Durchmesser und 80 cm tief.
- 3. Ein kräftiger, glatter Pfahl wird vor dem Pflanzen fest in das Baumloch gesteckt: derselbe muss bis an die Krone nicht aber hinein reichen.
 - 4. Die Wurzelenden werden glatt geschnitten, mit der Schnittfläche nach unten.
- 5. Der Baum darf und das ist das wichtigste von allem um nichts tiefer zu stehen kommen, als er in der Baumschule gestanden; besser um ein Weniges höher, weil er sich noch setzt.
- 6. Nach dem Pflanzen darf man den Baum vorläufig nur leicht anheften, nicht fest anbinden, weil er sich sonst beim Setzen leicht am Pfahl aufhängt und dann nur kümmerlich anwächst.
- 7. Nach dem Pflanzen decke man die Baumscheibe mit verrottetem Dung; ist der Boden nicht sehr reich, so mische man für Kernobst beim Pflanzen verrotteten Dünger unter, für Steinobst nicht.
 - 8. Steinobst muss im ersten Frühjahr schon geschnitten werden, Kernobst aber immer erst im zweiten.


Sollten die Ballen — bei eintretendem Frost während der Reise — in gefrorenem Zustande ankommen, so packe man sie nicht aus, sondern lasse sie erst in frostfreiem Raume (Keller) vollständig auftauen.

Preise der Hochstämme und der Formobstbäume.

Hochstämme	1 St.	10 St.	100 St.
in kräftiger, junger Ware mit gutem Wurzelvermögen.			
Aepfel, in nur erster Wahl Birnen Reineclauden, Pflaumen, Mirabellen, Zwetschen Kirschen Aprikosen, je nach Stärke und Entwicklung der Krone und des Stammes Pfirsiche, je nach Stärke und Entwicklung der Krone und des Stammes	1,50 1,50 1,50 1,50 2,00—2,50 2,00—2,50	14,— 14,— 14,— 14,— 18—24 18—24	130,— 130,— 130,— 130,— 160—230 160—230
Halbhochstämme.			
Aepfel und Birnen	1,25 2,—	11,— 18,—	100,—
Pyramiden			
in herrlicher Ware, sorgfältig gezogen und formiert.			
Aepfel, je nach Stärke und Ausbildung, mit einer Serie sorgfältig formiert	1,50—1,80 2,50—3,— 1,50—1,80	24—27,50 14—16	130-150
,, , , , , , , , zwei Serien , , ,	2,50-3,-	24—27,50	230-260
Aepfel- und Birnen-Buschbäume. Als Buschbäume verkaufen wir regelrechte, einserige Pyramiden (siehe oben) als am besten dazu geeignet			100.—
Aprikosenbüsche	1,25 2,—	11,—	100,-
Pfirsichbüsche	1,25	11,—	100,
" extra starke, mehrjährige	1,—	9,-	80,—
Kirschenbüsche extra starke, mehrjährige extra starke, mehrjährige	1,50	14,—	120,—
Mirabellen-, Reineclauden- und Pflaumenbüsche auf 30 cm hohen Niederstämmen	-1,25	11,—	100,—

Preise der Obstbäume.


Spaliere.



10		10 Stuck	M Stuck
Aepfel mit einer Etage	1,50—1,80	14—16	130—150
	2,50—3,00		
Birnen mit einer Etage			
Pfirsiche und Aprikosen			
mit einer Etage	2,00-2,50	18-24	160-200
" zwei Etagen	3,00-4,00	27,50 - 35	260-330
" drei "			
			80—130
" " zwei Etagen	2,20-2,50	20-24	180-230
" " drei "	3,00-4,00	27,50—35	
Pflaumen mit einer Etage			
" " zwei Etagen	2,50—3,00	24-27,50	_

Unser gesamtes Formobst ist in der denkbar sorgfältigsten Weise

Kordons (Schnurbäume).



	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Aepfel und Birnen, einarmig mit Fruchtaugen.	1,25—1,75	11-16	
" " " zweiarmig mit Fruchtholz			
garniert	1,75—2,50	16-24	150—230
senkrechte Kordons von Aepfel	1,25—1,75	11—16	100—150
senkrechte Kordons von Birnen	1,25—1,75	11—16	100-150

U-Formen und Verrier-Palmetten.

(U-Form siehe Abbildung nebenan und Verrier-Palmetten siehe Abbildung Seite 85).

Apfel- und Birnen-U-Formen, Prachtware, mit Fruchtholz besetzt	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Apfel- und Birnen-U-Formen, Prachtware, mit Fruchtholz besetzt	2,00-2,50	18—24	_
Apfel- und Birnen-Verrier-Palmetten, tadellos gezogene und formierte Ware, 3—4jährig			
Ware, 3—4jährig	4,50	40,—	_

Einjährige Veredlungen.

Aepfel und Birnen, nur in besten Sorten nach unserer Wahl abgebbar

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,-




Zur Beachtung!

Um die Auswahl zu erleichtern, sind jeder Sorte kurze Angaben über besondere Eigenschaften und Reifezeit beigefügt; ferner ist durch besondere Kennzeichen ersichtlich gemacht, in welchen Formen die betreffende Sorte vorrätig ist.

Es bedeutet: H = Hochstamm, H₂ = Halbhochstamm, 수 = Pyramide, Y = Spalier, + Kordon, Y = Uform, Y = Verrier-Palmette, S = senkrechter Kordon, B = Busch, ① = einjährige Veredlung.

Aepfel.



In U=Formen und Verrier=Palmetten

sind hauptsächlich folgende Apfel- und Birnensorten vorrätig.

Apfelsorten.

Ananas-Rtte. Y, Baumanns Rtte. Y中, Berlepsch-Gold-Rtte. Y, Bismarck-Apfel Y, Canada-Rtte. Y里, Charlamowsky Y, Cox' Orangen-Rtte. Y型, Grosse Casseler Rtte. YΨ, Gelber Bellefleur YΨ, Gravensteiner Y, Kgl. Kurzstiel Y, Minister v. Hammerstein 丫里, Pfirsichroter Sommerapfel 丫, Renette von Zuccalmaglio Y, Ribston Pepping Yy, Schöner von Boskoop YΨ, Transparente de Croncels Y, Winter-Goldparmäne '무무', Weisser Winter-Kalvill '무무', Weisser Klarapfel Y.

Birnensorten.

Amanliser Birne 띡, Bergamotte, Esperens 닛띡, Butterbirne, Bacheliers 4, Butterbirne, Clairgeau 4, Butterbirne, Diels 丫빞, Butterbirne, Gellerts 丫, Butterbirne, holzfarbige 박, Butterbirne, Hardenponts 丫里, Christbirne, Williams' 丫里, Clapps Liebling ソΨ, Dechantsbirne, Vereins- ソΨ, Dechantsbirne, Winter Y中, Doktor Jules Guyot Y, Edel-Crasanne Y, Gute Louise von Avranches Y中, Herzogin von Angoulême 丫里, Le Lectier Y, Marguerite Marillat 丫里, Minister Dr. Lucius Y, Pastorenbirne 里, Regentin Y里.

Ganz besonders empfehlen wir folgende zwei Geisenheimer Züchtungen:

Gi

Mi	nister von Hammerstein. Diese neuere Sorte ist
	von Herrn Landesökonomierat Goethe in Geisenheim gezüchtet
	und wird zu unsern besten Tafeläpfeln gezählt. Die Frucht ist
	gross und glatt, wachsartig weissgelb, nach der Sonnenseite
	goldig mit rot angehaucht, reift auf Lager von Anfang Januar
	an und hält sich in voller Güte bis Ende April.
	Einjähr. Veredlungen auf Paradies

an tind nair bien in		0110	•	-		_		 			Ρ.			
Einjähr. Veredlungen	1	auf	F	ar	ad	ie	S						M	0,75
Hochstamm														
Halbhochstamm														
Pyramiden mit 1 Ser														
" mit 2 Serien.								٠	٠	٠	٠	٠	19	3,—
Spaliere mit 1 Etage														
" mit 2 Etagen .														
Kordons, senkrecht				٠	٠	٠	٠			٠			"	1,75

Kordons, emarmig																ere	1,00
" zweiarmig .																19	2,50
U-Form										٠						19	2,50
Verrier-Palmette																	
eheimrat Wes	er	10	r.	E	Bin	e	re	ich	ıtr	ag	en	de	,	mi	tte	elgi	osse
Gold-Renette, die	Ok	tob	er-		Ap	ril	r	eif	t.								
Einjähr. Veredlung	en															M	1,
Halbhochstamm .								٠	٠	٠			٠			19	2,—
Pyramiden, 1 serig	1.												٠		٠	17	2,50
" 2serig											٠		٠	٠	٠	19	4,
Kordons 2 armig																12	3,—

Ferner empfehlen wir die folgenden zwei neueren Sorten:

La Clermontoise. Frucht hellgelb, leicht gerötet, festfleischig, vorzügliche Marktfrucht, reift Dezember-März. Marbrée de Watervliet. Lebhaft rote Frucht mit gelben Zickzacklinien und feinem renettenartigem Fleisch.

Beide kosten, senkrechte Kordons . . 1 St. M 2,-

Allgemeine Apfelsorten.

Astrachan, roter, reift Mitte August, gute Marktfrucht. H4 个 " weisser. Sehr früher, ertragreicher Apfel. H

Bellefleur, gelber, vorzüglicher Tafel- und Wirtschaftsapfel von feinem Aroma und schönem Aussehen, für jede Zwergform zu empfehlen. November-März. H以全义工工 roter. H

Bismarckapfel, eine grosse lebhaft gefärbte, dem "Kaiser Alexander" ähnliche Frucht, die Sorte ist erstaunlich fruchtbar, da sie schon am einjährigen Holze trägt. Nov. bis Febr. 4-4S

Boikenapfel. Kalvillartig geformt, goldgelb mit rotem Anflug. Für rauhe Lage und jeden Boden passend. Jan.-Mai. H H/2

Bohnapfel, Friedberger, eine in der Wetterau sehr geschätzte Lokalsorte. H

Bohnapfel, grosser, ist ein ausgezeichneter Apfel, der im Dezember lagerreif ist und sich bis Juni hält. H H/2 Cellini ist eine sehr frühtragende gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Okt.-Nov. 수구 오단 Charlamowsky ist von den Sommeräpfeln einer der besten. Frucht gelb mit rot gestreift; sehr reichtragend. August-September. H 1/2 Y - Y

Cox' Orangen-Renette, ein sehr edler, tragbarer Tafelapfel.
November-März. H 1/2 Y - Y Y Y S

Cox' Pomona, sehr grosse Wirtschafts-, Schau- und auch Tafelfrught reichtragend.

frucht, reichtragend. 4S

Doberaner Borsdorfer Renette, neue, grünlichgelbe Frucht mit lackroten Bäckchen, mittelgross, von süssweinig gewürztem Geschmack. Die Sorte trägt sehr reich, wird nicht pilzfleckig und hängt fest am Baum. A 3

Allgemeine Apfelsorten.

- Elserapfel, roter, ein schöner, rotgestreifter Apfel, die besthaltbare Frucht. Januar-Sommer. HH2
- Ernst Bosch, ein weinsäuerlicher, schwachwachsender und reichtragender Tafelapfel. Okt.-Jan. ルターソS
- Flessers Erstling übertrifft an früher Fruchtbarkeit den Bismarck-Apfel. Die grosse, runde Frucht ist gelb mit rotgestreifter Sonnenseite; das Fleisch ist erfrischend weinsäuerlich. November-Februar. H/2
- Filippas Apfel, eine feine, neuere, dänische Tafel- und Wirtschaftsfrucht, die im November-Januar lagerreif wird. Δ
- Fürstenapfel, grüner, ein guter Winterapfel mit grasgrünen Früchten. Februar-Juni. HH/2
- Geflammter Kardinal, grosse Wirtschaftsfrucht, gelb mit roten Streifen. Oktober-Pebruar. H 1/2
- Gelber Edelapfel, grosse, goldgelbe Tafel- und Wirtschaftsfrucht, reichtragend und nicht empfindlich. Nov.-Dez. ルクェリ
- **Gelber Richard**, fruchtbare und schöne Marktfrucht. November-Dezember. 4S
- Grahams Jubiläumsapfel, grosse goldgelbe Frucht von festem Fleisch und gutem Geschmack. Sehr tragbar. Oktober-März. 女S
- Gravensteiner, sehr fruchtbare Sorte mit fein gewürzigen schönen Früchten; verlangt guten Boden. Oktober-Januar. H₩2♀S
- **Gustavs Dauerapfel**, festes Fleisch, lebhafte Farbe und süssweiniger Geschmack. Dezbr.-Mai. S
- Grossherzog Friedrich von Baden, dem weissen Winter-Kalvill ähnlicher grosser Apfel von feinem, säuerlichem Geschmack. Oktober-Dezember. ♀ℍS
- Himbeerapfel von Holowaus, von reinem himbeerartigen Geschmack, sehr reichtragend. Ein köstlicher Tafelapfel. November-Februar. 夕S
- Jakob Lebel, grosser, flachrunder gelber Tafel- und Wirtschaftsapfel; sehr fruchtbar. Okt.-Nov. HH/2
- Kaiser Alexander, ungewöhnlich gross; als Schau- und Marktfrucht zu empfehlen. Okt.-Dez. 버ի 수도 S
- Kalvill, weisser Winter-, ist die feinste Tafelfrucht, bedarf aber geschützter, warmer Lage. Nov.-März. 내소오노무니다S
 - "Aderslebener. Kalvillartige, vorzügliche Tafelfrucht. Anspruchsloser als der weisse Winter-Kalvill. Dez.-März. HH₂全乂士S
- Klarapfel, weisser (durchsichtiger Sommerapfel). Ein prächtiger wachsartig bereifter Frühapfel von süssweinsäuerlichem Geschmack. Juli. H地分早S
- Könlglicher Kurzstiel, ist eine vorzügliche Tafelfrucht, blüht sehr spät und trägt sehr reich. Jan.-Mai. H2个Y工YSH
- Langtons Sondersgleichen, ein ausgezeichneter Weinapfel. Oktober-November. H 1/2
- Lord Grosvenor, sehr grosse Frucht. Aug.-Sept. 州公子S
 - " Suffield, grosser, sehr geschätzter, weissgelber Tafel- und Wirtschaftsapfel, ausserordentlich ertragreich. Oktober-November. 州公S
- **Matapfel, brauner,** mittelgrosser, sehr guter Wirtschaftsapfel. Dez.-Mai. H
 - . leichter, gelbgrüner, rotgestreifter vorzüglicher Wirtschaftsund Mostapfel. HH⁄2
- Northern Spy, guter Tafel- und Wirtschaftsapfel, sehr widerstandsfähig gegen die Blutlaus. Jan.-Mai. H
- Ontario. Dankbar tragende, amerikanische Tafel- und Wirtschaftssorte; mittelgrosse, gute Frucht. Jan.-April. H 全 S
- Parmaine, Gold. Dieser Apfel ist als Tafel- und Marktfrucht von ganz hervorragendem Werte. Dez.-März. 日形全义主义学

- Pepping, Ribstons, der Baum wächst stark, ist selbst für trockene Böden zu empfehlen und trägt reichlich. Dez.-April. Vorzügliche Tafelfrucht. 버媛숙빛S
 - "Parkers, reich- und frühtragender, grauer Apfel von gelblich weissem, saftigem Fleisch. Dez.-April. 全S
- Peasgoods Sondersgleichen ist eine grosse, fruchtbare Tafelund Wirtschafts-Renette. Nov.-Jan. ♀S
- Renette, Ananas-, ein sehr saftiger, gewürziger Apfel, wächst kurz gedrungen und gedeiht auch in magerem Sandboden. HH44 ヤェソS
 - " Baumanns, mittelgrosse, braunrote Frucht, sehr empfehlenswert. Dez.-April. H州分子・ソビS
 - " Champagner», mittelgrosse, plattrunde Frucht von feinem gewürzigen Geschmack. H H/2
 - " Gold-, Berlepschs, ein sehr haltbarer Winterapfel, glattrund, hellgelb, etwas rot gestreift von süssweinigem Geschmack.
 Januar-März. HH々ケェソS
 - " Gold-, Blenhelmer, eine sehr schöne fruchtbare Sorte, für alle Zwecke gut und in jedem Boden gedeihend. November-März. H4分S
- Renette, graue, französische, eine sehr gute, lang haltbare graue Renette. Dezember-Mai. H H/2
 - " **graue Herbst**», ein wohlschmeckender Herbstapfel. Oktober. H H½
 - " grosse Kasseler, ist einer der vorzüglichsten Aepfel für alle Zwecke, die Früchte sind gross und dauerhaft. März-Juli. H뉴수도무별S
 - , Harberts, grosser gelber, gestreifter Apfel, der gut wächst und reichlich trägt. Dez.-April. H H_2
 - " Kanada-, ein sehr grosser, vorzüglicher, flachbreiter Apfel mit feinem, körnigem Fleische. Dez.-April. 버션수보고 Y보S
 - " Landsberger, sehr guter, gelbgrüner Apfel, für jeden Boden geeignet. Nov.-Februar. H $\frac{1}{2}$ S
 - " Orleans-, ist eine prächtige grosse Frucht, ein vorzüglicher Tafelapfel, der reichlich trägt, aber guten Boden verlangt. Dez.-März. H州2介S
 - " von Zuccalmaglio, ein sehr grosser, kugelförmiger Tafelapfel, goldgelb; sehr reichtragend. Sept.-März. ルタソS
- Rosenapfel, virginischer, ein reichtragender, gestreifter Sommerapfel. Anfang August. H州公子S
- Schöner von Boskoop, grosser gelber, sehr feiner Apfel für Tafel und Wirtschaft gleich wertvoll. Februar-März. H 1½ 숙보고 무별S
- Schöner aus Nordhausen. Die Frucht ist ähnlich der Kanada-Renette; ein prächtig gefärbter Tafelapfel. Das Fleisch ist zart und saftreich und hält sich bis April, ohne zu welken. Der Apfel soll in trockenen, wie feuchten Lagen gut gedeihen. Δ S
- Signe Tillisch, ein dänischer, neuer Apfel mit riesig-grosser Frucht, der sehr früh und ausserordentlich reich trägt. November-Februar. S
- Sommerapfel, Pfirslchroter, mittelgrosser, sehr schöner Tafelund Marktapfel. Aug.-Sept. チェソS
- Taffetapfel, weisser. Ein Mostapfel, mittelgross und plattrund, gelblich. Baum kräftig und fruchtbar. Okt.-Jan. HH/2
- The Queen, Königinapfel, gross, prachtvoll, goldgelb mit rot getuscht; sehr ertragreich. Oktober—November. AS
- Transparente de Croncels, sehr fruchtbarer feiner Tafel- und Wirtschaftsapfel. Sept. 노모나소의
- Welnapfel, roter Trlerscher, einer der vorzüglichsten Mostäpfel; Baum wüchsig, reichtragend. Okt.-Nov. HH2
- Winterstreifling, echter, eine vorzügliche Wirtschaftsfrucht: HH/2

is all there are a real condition

Birnen.

Ganz besonders empfehlen wir die Geisenheimer Züchtungen:

Frau Louise Goethe ist wohl die edelste der neueren Züchtungen von Winterbirnen. Das Fleisch ist sehr saftreich und schmelzend und von besonders feiner, reicher Würze. Die Schale ist dunkelgrün, bei der Reife in tiefgelb übergehend, mit zahlreichen charakteristischen Rostpunkten. Diese neue Birne verdanken wir den Züchtungen des Herrn Oekonomierat Goethe und sie erhielt das Wertzeugnis vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den königl. preuss. Staaten. Reifezeit Ende

Geheimrat Dr. Traugott Müller. Diese Birne ist eine sehr wertvolle Neuheit, auffallend reichtrag. mit mittelgrosser Frucht, grün, leicht gerötet und berostet, mit sehr saftreich., edelgewürztem Fleische. Ende Nov.-Dez. ♀ mit 1 Serie № 1,80, S № 1,75, ⊙ № 0,60

Neuere Birnsorten.

Comtesse de Paris ist eine sehr saftreiche, schmelzende, süsse Frucht, ziemlich gross. Dez.—Jan. H M 2, -, H₂ M 1,40, 1 serige ♀ M 2, -, 2 serige ♀ M 3,50

Doyenné Mad. Cornuau. Gross wie die Winterdechantsbirne mit sehr saftreich schmelzendem, feingewürztem Fleische.

Doyenné Mad. Th. Levavasseur ist eine sehr grosse, schöne Frucht von feingewürztem Geschmack, die sich bis in den Mai hält 1 serige $\oint \mathcal{M}$ 2,—, \mathcal{S} \mathcal{M} 1,75, 0 \mathcal{M} 1,—

Eva Baltet ist eine ausgezeichnete, französische Neuheit mit sehr grosser, schön gefärbter Frucht von saftreichem, schmelzendem Geschmack 1 serige ♀ M 2,—, ③ M 0,75

Jeanne d'Arc ist eine sehr saftreiche, grosse, edle Tafelfrucht, die süss und fein gewürzt ist. Der Baum ist reichtragend. Dez.—Jan. \bigtriangleup 1 serig $\mathcal M$ 2,—, 2 serig $\mathcal M$ 3,50, ① $\mathcal M$ 0,75 Louis Pasteur. Schmelzend, saftig süss, mit gelblicher, braun punktierter Schale; abgerundet, mittelgross.

1 serige \mathcal{L} \mathcal{M} 2,—, 2 serige \mathcal{L} \mathcal{M} 3,50, \mathcal{L} 2,—

Madame Bonnefond wird als vorzügliche Tafelfrucht sehr empfohlen. Das Fleisch ist sehr saftig, schmelzend und fein

fohlen. Das Fleisch ist sehr saftig, schmelzend und fein gewürzt. Nov.—Dez.

\$\times 1\ \text{ serig } \mathcal{N} 2,\top \text{ 2-serig } \mathcal{M} 3,50, \circ 1\ \text{ St. } \mathcal{M} 0,75, \text{ S } \mathcal{M} 2,\top \text{
Mortillets Bttb., grosse feine Tafelfrucht. Ende Aug.-Sept.

\$\times 1\ \text{ 1-serig } \mathcal{M} 2,\top \text{ 2-serig } \mathcal{M} 3,50, \text{ S } \mathcal{M} 2,\top \text{
Minister Viger, gross, hellgelb, auf der Sonnenseite rosa und rostfarbig punktiert, gewürzig und schmelzend süsses Fleisch.

Dezember—Ende Januar . . \$\times 1\ \text{ 1-serig } \mathcal{M} 2,\top \text{ S } \mathcal{M} 2,\top \text{ M } \mathcal{M} 1,25 \text{
Professeur Opoix. Abgerundete, ziemlich grosse Frucht, gelb punktiert und rotbraun gefleckt. Sehr saftreich, süss und gewürzig. Januar—März . . \$\times 2\ \text{ 2-serig } \mathcal{M} 3,50, \text{ S } \mathcal{M} 1,75 \text{

Allgemeine Birnsorten.

Amanliser Birne, eine schmelzende feine Herbst-Tafelbutterbirne. September. HK全业型S

Andenken an den Kongress. Grosse frühe Tafelfrucht. September. 4

Baronin von Mello, braunrostige, sehr schmackhafte Herbstbirne. 4S

Bergamotte, Esperens, mittelgrosse Frucht mit schmelzendem Fleisch. Januar—März. H H소오노모모S

Butterbirne, Bachellers, reichtragende, feine aromatische Sorte.

Oktober—November. 女里里S

Blumenbachs (Soldat laboureur), ist eine sehr feine Tafelfrucht und von starkem Wuchse. Oktober-November. 女里S

Clairgeau, grosse, würzige, orangerotgefärbte Frucht. November. 州分平 YS

Diels, sehr grosse, fein gewürzige Tafelbirne allerersten Ranges. November—Dezember. H州公平工工工

Gellerts, sehr saftreiche, schmelzende, reichtragende Herbstsorte, September—Oktober. ♀♀ェ♀SH⁄2

Giffards ist eine mittelgrosse, gute Tafel-Frühbirne. Ende Juli—Mitte August. 女 graue Herbst-, dicke übersaftreiche Frucht von säurigem

Gewürz. Oktober. AS

Hochfeine, grosse, gelb-grüne, reichtragende Birne von feinem Geschmack. Oktober. 4-S У

Holzfarbige, sehr fruchtbar, grosse, schmelzende Frucht. Oktober—November. タリュリS

Hardenponts, grosse, hellgelbe Frucht; die Sorte verlangt nahrhaften Boden. Nov.-Jan. H州4个Y工学学S

Liegels Winter-, eine zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlende, widerstandsfähige Sorte. Frucht mittelgross und sehr saftig. Oktober-November. H수

Butterbirne, Sternebergs, eine flaschenförmige Sommerbirne, zitronengelb, mit rot gestreift, von schmelzendem Geschmack. August. 全S
Christbirne, Williams', grosse, länglich bauchige schmelzende Frucht. Gut für jeden Boden. September. H 1/2 全 文 工 Y Y Clapps Liebling, grosse, vortreffliche Sommerfrucht für geschützte Lage. September. H 1/2 全 文 Y Y Y Y S
Dechants, Rote. Mittelgrosse Tafel- und Marktfrucht, reichtragend. Als Strassenbaum geeignet. Nur H
Dechantsbirne, Vereins=, eine schöne, gelbgrüne Tafelbirne mit leicht geröteten Backen. Für warme Lagen zu empfehlen. Oktober—November. 全 文 工 Y Y Y S

mit leicht geröteten Backen. Für wahne Lagen zu einpfelhen.
Oktober—November. 全义工程的
Winter-, eine für guten Boden und warme Lage sehr reichtragende Sorte mit grosser, fein schmelzender roter Frucht,
Dezember—März, 日境全义工程的
Doktor Jules Guyot. Eine frühe, sehr grosse und schöne Frucht.

Das Fleisch ist zart, schmelzend und süss. August bis Sep-

tember. YYSA Edel-Crassane. Grosse Frucht von edlem Geschmack, für geschützte Lagen passend. Januar-Februar. 44

Elerbirne, Sommer-(Bestebirne), sehr starkwüchsige, auf jedem Boden immer tragende Sorte. Frucht eiförmig, klein. August. H

Gute Luise von Avranches ist eine der besten Herbstbirnen von gewürztem Geschmack. Frucht rot punktiert. Sept.-Okt. 日境全生工程S
Herzogin von Angoulême, eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Frucht, von süssem, schmelzendem Geschmack. Oktober-November. 全集工程
Hofratsbirne, fruchtbare, feine Tafelfrucht für geschützte Lage. Okt.-Nov. 全S

Okt.-Nov. 4 S

Josephine von Mecheln, sehr gute, tragbare, gelbliche Winterbirne. Januar-März. ←S

Allgemeine Birnsorten (Fortsetzung).

Katzenkopf, grosser, eine sehr grosse Koch- und Mostbirne, eine der besten Wirtschaftsfrüchte. H

Köstliche von Charneu ist eine sehr reichtragende, grosse Tafelund Marktfrucht. Okt.-Nov. 수

Le Lectier. Eine köstlich gewürzige, saftreiche Winterbirne mit schmelzendem, weissem Fleische. Die Frucht ist goldgelb berostet. Dez.-Jan. AY + YSMad. Verté ist eine der wohlschmeckendsten, köstlichsten Tafel-

birnen von erfrischend saftreichem Geschmack und von den spätreifenden Sorten eine der wertvollsten. HH₂♀¥-

Magdalene, grüne, vorzügliche fruchtbare Sommerbirne. Juli-August.

Marguerite Marillat, eine grosse Ausstellungsfrucht mit sehr saftreich schmelzendem Fleische. Schale gelbrot gefleckt mit zimmetbraunen Punkten. Ende Aug.-Ende Sept. H/2 수 모델S

Martin, trockener, eine sehr reichtragende, längliche braunrote Wirtschaftsbirne. Dezember-Februar. H

Minister Dr. Lucius, Tafelfrucht mit feinstem, schmelzendem Fleisch, sehr gross, hellgelb mit rötlichem Anflug. Sept.-Okt. ATYS

Mostbirne, Weilersche, ist eine der besten Weinbirnen, der Baum ist stark wachsend und unempfindlich. November, H

Notair Lepin soll an Güte der Winterdechantsbirne gleich sein, aber auch noch in ungünstiger Lage reiche Ernten bringen. 4

Olivier de Serres, grünlich gelb, stark berostet, bergamotteförmig, mittelgross, fein gewürzig. Dezember-März. 🛧 🛨

Pastorenbirne, eine langgebaute, grünliche, halbschmelzende Tafel- und Kochbirne, die sehr reich trägt. Oktober-H 仝 Y Y SHA

Poiteau, eine reichtragende, delikate, grosse, längliche Birne. Oktober-November. HAS

Präsident Drouard, reichtragend und grossfrüchtig; Schale grün, in der Reife goldgelb. März S.

Regentin, eine mittelgrosse, vorzügliche Wintertafelbirne. Dezember. **소**¥노SY

Sparbirne, mittelgrosse Tafel- und Marktfrucht für warme Lagen. August. H

Stuttgarter Russelet (Stuttgarter Geisshirtle), vollsaftige Birne mit zimmetartigem Geschmack. Aug. 4S

Triumph von Jodoigne, sehr grosse, reichtragende Birne; gut für feuchten Boden. Frucht schmelzend, trüb-rötlich. Nov.-Dezember. _

Triumph von Vienne, eine sehr grosse, flaschenförmige Frucht, die wegen ihrer Grösse, Schönheit und Güte besonders empfehlenswert ist. Das Fleisch ist gelblich, saftig, angenehm gezuckert und aromatisch. Aug.-Sept. H/2 A

Neuere Pflaumen und Mirabellen.

Diese neueren Sorten sind in Hochstämmen abgebbar zu Mk. 2,— das Stück.

Mirabelle "Gloire de Louveciennes" ist weit grösser als die Mirabelle von Nancy, der sie sonst in Form und Farbe gleicht.

von Flotow ist eine mittelgrosse, schöne Frucht, die schon Ende Juli bis Anfang August reift. B M 1,50.

Satsuma ist eine der besten japanischen Pflaumensorten, sehr starkwüchsig, mit grosser Frucht, deren feines Fleisch vollständig blutrot ist. Die Schale ist karminrot.

The Czar ist eine ertragreiche, englische Sorte mit grossen,

dunkelpurpurfarbenen, gewürzigen Früchten. Zwetsche "Früheste der Welt", ist eine grosse, blaue Zwetsche, die schon am 20.-25. Juli reift. B M 1,50.

Allgemeine Sorten von Pflaumen, Zwetschen u. Mirabellen.

Preise siehe Seite 83.

Anna Späth, eine sehr reichtragende, zwetschenartige Pflaume.

Auerbacher Frühzwetsche, reift Mitte August, ist dicker und rundlicher als die Hauszwetsche, hat goldgelbes saftreiches Fleisch, löst gut vom Stein und wird auch der Fruchtbarkeit wegen sehr gerühmt.

Bunter Perdrigon, gross, violettblau und hellrot. Ende August. Eierpflaume, gelbe, Frucht sehr gross, gelb. September.

Frankfurter Pfirsichzwetsche, grosse schwarzblaue Tafel- und Marktfrucht. Mitte bis Ende Sept.

Frühzwetsche, Bühler, die beste aller Frühzwetschen, die durch ihr festes Fleisch, ihre frühe Reifezeit und ihren vorzüglichen Geschmack sehr empfohlen wird. Aug.

Wangenheims, ovale, dunkelviolette Zwetsche, sehr fruchtbar. Ende Aug.-Anfang Sept.

Zimmers. Ähnlich der Bühler Frühzwetsche, übertrifft diese jedoch durch Grösse der Frucht und 8-10 Tage früherer Reifezeit.

Grossherzog, sehr gross, blauschwarz, süss. Ende September.

Hauszwetsche, grosse, für jeden Zweck empfehlenswerte Frucht. Mitte-Ende September.

Herrenpflaume, gelbe. Mitte August reifend, goldgelb, sehr wohlschmeckend; auch in trockener Lage reichtragend. B

Jefferson, gelb mit rot ist die Frucht; saftreich und süss. Reichtragend. Anf. September. YB

Kirkes Pflaume, grossfrüchtige, runde, dunkel-violette Pflaume, die sehr reich trägt. Anf. September. ¥B

Königin der Mirabellen ist eine besonders grossfrüchtige Mirabelle, die Ende August reift. B

Königspflaume, dunkelrot, mit blauem Duft überzogen. Reifezeit Ende Juli.

von Tours, gross, bläulich-rot, reichtragend. Ende August.

Königin Viktoria, gelb mit rot; sehr grosse Frucht und reichtragend. Ende August. $\Psi \mathrm{B}$

Mirabelle, Herrenhäuser, mittelgrosse goldgelbe Frucht.

Metzer, ist die reichtragendste Mirabelle mit kleiner, gelber, rotgefleckter Frucht, die zum Dörren und Einmachen sehr zu empfehlen ist. B

Nancy, grosse, gelbe Tafelfrucht, gut zum Dörren und Einmachen. YB

Ontario, goldgelb, sehr gross. Mitte-Ende August. YB

Reineclaude, frühe, hat weiches, pflaumenartiges Fleisch und reift Mitte August.

grosse, grüne, sehr saftige süsse gewürzreiche Frucht. Aug.-Anf. Sept. $\ensuremath{\,\underline{\psi}\,} B$

Rote Nektarine ist eine schöne rote Pflaume. Anf. Aug. YB Rivers' Frühpflaume, schwarzblau und mittelgross. Ende Juli-Anf. August.

Zwetsche, grosse Zucker-, grosse, blauschwarze Frucht mit hellgelbem, süssem Fleische. Ende August.

Italienische, eine grosse, ovale, dunkelblaue Frucht mit grünlich-gelbem, saftreichem Fleische. Mitte September.

Washington, sehr grosse, gelbe Frucht mit goldgelbem, saftreichem Fleische; reineclaudenartig. Anf. Sept. YB

Pfirsiche.

Die Pfirsiche, von denen wir alljährlich mehrere Tausend in Spalier- und Strauchform heranziehen, bilden eine Spezialität unserer Obstbaumschulen, so dass wir darin besonders leistungsfähig sind.



Wahre Pfirsiche (mit wolliger Schale).

Neuheiten.

"Earliest of all" (Sneed), reift schon 8-10 Tage vor Amsden mit etwas grösseren, schön geröteten Früchten. Einetagiges Ψ . . \mathcal{M} 2,50, zweietagiges \mathcal{M} 3,50 dreietagiges . . . , 5,—, B , 2,50

Hochst. M 3,—

"Le Vainqueur" ("Der Sieger") wird wohl der beste
Frühpfirsich werden, da er noch vor "Earliest of all" reift, lebhaft gefärbte, feine Frucht hat und vollständig

steinlösend sein soll.

Einetagiges \(\psi \) M 4,—, B M 3,—, H M 4,—, Oberpräsident von Schorlemer", reift Mitte August zwischen den frühen und den französischen Pfirsichen, purpurrot gefärbt mit schmelzendem vom Stein lösenden Fleisch Einetagiges V M 2.50

den Fleisch Einetagiges Y M 2,50, zweietagiges Y M 3,50, dreietagiges Y M 5,—, B M 2,50, "Perle von Muffendorf", reift Ende August mit sehr grosser Frucht, grünlichgelb mit hellrot marmoriert.

grosser Fritcht, grunnengen intra lemot mannorett. Einetagiges Y M 2,50, zweietagiges Y M 3,50, dreietagiges Y M 5,—, B M 2,50.

"Reghs Liebling", grosse feine Frucht, purpurrot gefärbt. Anf. September reifend. Einetagiges Y M 2,50, zweietagiges Y M 3,50, dreietagiges Y M 5,—,

B M 2,50.

"Triumph". Frucht sehr gross, orangerot, an der Sonnenseite dunkler gefärbt; Fleisch goldgelb und saftreich. Reifezeit: erste Hälfte des August. Y M 2,50, B M 2,50

Bewährte alte Sorten:

Amsden, eine der frühesten Sorten, mittelgross, sehr reichtragend. Anfangs Juli.

Alexander, frühe, der Amsden an früher Reifezeit und Güte gleich. Anfangs Juli.

Beatrix, frühe, eine ausgezeichnete grosse Frucht und im Holz sehr widerstandsfähig. Juli-Anfang August.

"Früher York", weisslichgelb mit purpurkarmin Färbung; Steinlösend. Erste Hälfte August.

Rivers, frühe, sehr grosse, blassgelbe Frucht von fein schmelzendem Fleische. Juli.

Mignonne, grosse, frühe. Frucht sehr gross, von gewürzigem

Geschmack. Ende August. grosse, reift 15 Tage später als die vorhergehende. In der Güte ist sie gleichwertig. September.

Magdalenenpfirsich, rote, ein bekannter, mittelgrosser, purpurner Pfirsich. Ende August.

"Proskauer Pfirsich", braunrot, Ende August. Für rauhe Lagen empfehlenswert

Valparaiso - Pfirsich, rote Frucht mit blutrotem Fleisch, sehr saftreich, die zum Einmachen sehr empfohlen wird.

Ausser obigen Hauptsorten noch folgende:

Aprikosenpfirsich, Prachtvolle, Ende Sept. Arkansas, Ende Juli. Belle de Doué, Ende August. Bon ouvrier, Ende September. Briggs rote Mai, Anfang Juli. Cumberland, Ende Juni. Eiserner Kanzler, Ende August.

Frühe von Canada, Ende Juli. " von Hales, Anfang August. Galande, Ende August. Grosse Montagne, Ende August. Harpers frühe, August. Jessie Kerr, Ende Juli.

Königin der Obstgärten, Anf. September Leopold I., Mitte September. Lord Palmerston, Ende September. Prince of Wales, September. Venusbrust, Mitte September. Waterloo, Mitte Juli. Weisse Magdalene, Ende August.

Nektarinen (mit nackter Schale).

Die Nektarinen-Pfirsiche liefern äusserst gewürzreiche, saftige, Früchte und werden auch mit Vorliebe zur Treiberei verwandt. Lord Napier, Anfang August. | Elruge, Ende August. Advance, Ende August.

Aprikosen.

Ambrosia, sehr saftreich, prächtig gefärbte grosse Frucht, von edlem, süssem Geschmack. Juli-August.

Aprikose von Breda, mittelgrosse, feine Frucht, zum Einmachen sehr empfohlen. Anfang August.

von Nancy (Pfirsichaprikose), eine sehr saftige aromatische, grosse Frucht. August.

Frühe Moorpark, mittelgrosse, rundliche, weisslich-gelbe, rötlich angehauchte Frucht. Anfang August.

von Montplaisir, orangegelbe, rot getüpfelte Frucht mit rotem Fleische, sehr wohlschmeckend. Mitte Juli.

Grosse frühe, eine sehr grosse und reichtragende Aprikose, dabei eine der frühesten. Mitte Juli.

Holubs Zuckeraprikose, sehr grosse, vortreffliche böhmische Sorte. Anfang-Mitte August.

Königliche Aprikose, eine grosse Frucht mit fein schmelzendem,

süssem Fleische. Mitte August. Königin Olga von Württemberg, grosse ausgezeichnete, sehr tragbare Aprikose. Juli.

Luizet, orangegelb, rundlich ovale Frucht mit zartem schmelzen-dem Fleische. Ende Juli.

Mandelaprikose, sehr grosse, edle Frucht. Die Sorte wächst sehr üppig bei reicher Fruchtbarkeit. Juli.

Ungarische Beste, sehr grosse, zuckerige Frucht mit festem Fleische. Ende Juli.

Ausserdem sind noch folgende gute Aprikosensorten in beschränkter Anzahl vorrätig:

Ananas-Aprikose, Della Bella, Kesterter Schafnase, Red Muskadine, Rosenaprikose, Uhlhorns Wunder.

Kirschen.

Alle angeführten Kirschen-Sorten sind in Hochstämmen vorrätig. Die Zwergsorten sind besonders angegeben.

I. Süsskirschen (Herzkirschen).

Ramon Oliva. Diese neuere Kirschensorte hat sich ausserordentlich bewährt als besonders reichtragende, durch Grösse und Schönheit der Frucht sich auszeichnende, süsse Herzkirsche. Die Farbe ist glänzend schwarzrot.

Bettenburger, sehr süss, gewürzt; schwarz. Ende Juni.

Camper rote (Geisepeter), eine sehr früh reifende rote Kirsche. Anfangs Juni.

Flamentiner, grosse Frucht. Mitte Juni.

Frühe Kronenburger ist in den Kirschgegenden Rheinhessens die beliebteste Frühkirsche. Anfangs Juni. Y B

Frühe Maiherzkirsche, mittelgrosse, frühe Kirsche. Juni- ¥ B

Früheste der Mark, sehr reichtragende, schwarze Herzkirsche, eine der frühesten Kirschen. Anfang Juni.

Frühe schwarze aus Camp, frühe rheinische Herzkirsche. Anfangs Juni. Y

Frühe schwarze aus Werder, mittelgrosse, frühe schwarze Kirsche. Anfang Juni.

Kassins Frühe. Tiefschwarz, vorzüglich im Geschmack. Ende Mai. Schwarzer Adler, mittelgrosse schwarze Herzkirsche. Ende Juni. Weisse Wachskirsche, eine wachsgelbe, harte Kirsche von vorzüglichem Geschmack. Mitte Juni. Y B

Winklers weisse, sehr grosse, gelbe Kirsche, leicht rot getuscht von würzigem Geschmack. Mitte Juni.

Knorpelkirschen.

Büttners gelbe, glänzend gelb, festfleischig, saftig. Mitte Juli. Esperens, sehr gross, süss und saftig. Frucht gelb mit leichter Röte. Anfang Juli. Y B

Frauensteiner Hängelkirsche. Lokalsorte.

Grosse schwarze, gross und von vorzüglichem Geschmack. Juli. ¥ B Hedelfinger Riesen, sehr grosse, schwarzrote, haltbare Frucht. Anfang Juli. Y B

Leberkirsche, schwarzbraun, sehr vollsaftig und süss. Anfang Juli. Lauermanns Knorpelkirsche (Grosse Prinzessinkirsche), sehr schöne, grosse, bunte Frucht. Anfang Juli. Y B

Napoleons, sehr grosse, bunte Frucht. Ende Juni. Y B

von Lades, späte Knorpelkirsche, ist die späteste aller Süsskirschen, die erst im September reift und sehr reich trägt. Hellrot, von angenehmem Geschmack.

II. Sauerkirschen (Weichseln und Glaskirschen).

Sauerkirschen-Neuheit "Minister von Podbielski", eine verbesserte Ostheimer Weichsel, die wegen ihrer Grösse und ihres hervorragenden Wohlgeschmackes Aufsehen erregt.

Bettenburger Glaskirsche, Frucht gross, dunkelrot, beste zum Einmachen. Ende Juni. B

Grosse Schattenmorelle (Lotkirsche, Nordkirsche), langstielige, dunkelrote Weichselkirsche. Ende Juli. Y 坚B

Grosser Gobet, eine sehr grosse, kurzstielige, ausgezeichnete Glaskirsche. Juli. Y B

Gubens Ehre, allerfrüheste Weichselkirsche mit festem aromatischen Fleisch. Mai. Y B

Herzogin von Palluau, eine sehr empfohlene Glaskirsche. Y B Langsurer Prachtweichsel, sehr gross, dunkelrot. August. YB

Ostheimer Weichsel, schwarz. Mitte Juli. YB

Ravennerkirsche (Königin Hortensia), sehr gross, rot. Juli. YB

Schöne von Chatenay, gelb, rot gestreift und marmoriert, sehr saftig, mittelgross. Juli. B Ψ

Süsse Frühweichsel, kleine, sehr reichtragende Sorte von angenehm säuerlichem Geschmack. Juni.

Süssweichsel von Olivet. Eine feine, wohlschmeckende Kirsche für die Tafel und zum Einmachen von glänzend braunroter Farbe und süssweinigem Geschmack.

Verschiedene Fruchtsträucher.

Ouitten.

Halbstämme 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-Büsche 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-, 100 St. M 70,-Einjährige Veredlungen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,-

In den Sorten:

Apfelquitte, mittelgross, gelb; Apfelform.

Champion, früh- und reichtragend.

De Bourgeaut, birnförmig, gross, dunkelgelb, zartfleischig. Reas Mammouth, sehr grosse, orangegelbe, frühreifende Frucht.

Bereczki ist eine neue Sorte, ungewöhnlich gross, mit sehr mildem und süssem Fleisch 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Riesenquitte von Lescovac. Neu! Neueinführung von der Balkanhalbinsel, soll bis zu 1500 g schwere Früchte liefern. 1 St. M 1,50

Mispeln.

Büsche, 1 jährig 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Japanische Weinbeere

(Rote Himbeer-Hybride, Rubus phoenicolasius).

Diese Beere ist eine Art Zwischenfrucht von Himbeere und Brombeere, sehr reichtragend mit roter Frucht von erfrischendem 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-Geschmack.

Walnuss = Hochstämme.

1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50.



Brombeere Lucretia.

Brombeeren.

Die Brombeeren finden immer weitere Verbreitung, da sie bei gänzlicher Anspruchslosigkeit reiche Ernten ihrer köstlich erfrischenden und gewürzreichen, grossen Früchte liefern. Die Fruchttriebe des vergangenen Jahres werden stets wieder über dem Erdboden entfernt und die jungen Triebe zum Fruchttragen für das folgende Jahr aufgebunden.

Lucretia. Die Lucretia ist unter den erprobten Brombeersorten entschieden die beste. Die erstaunlich grossen Früchte sind von tiefschwarzblauer Farbe und von vorzüglichem, gewürzreichem Geschmack, dabei sind die rankenden Pflanzen von ganz ausserordentlicher Fruchtbarkeit.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-

Th. Reimers, strauchartig, nicht rankend.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Wilsons, junior 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Himbeeren.

Der ausserordentlich reiche Ertrag einer Himbeer-Anlage, auf den man sich in jedem Jahre verlassen kann, und die vielseitige Verwendbarkeit dieser erfrischenden Frucht sollte jeden Obstzüchter zur Anpflanzung derselben veranlassen. - Wir liefern starke, verpflanzte Ableger.

Fastolf, die Frucht ist süss und aromatisch; dunkelrot. Sehr reichtragend.

Gelbe Antwerpener, ziemlich feste, hell- bis rötlichgelbe, süsse Frucht. Sehr ertragreich.

Goliath. Die Frucht ist gross, dunkelrot, sehr süss und würzig, sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Hornet, sehr grosse, kegelförmige, spätreifende, dunkelrote Frucht.

Immertragende von Feldbrunnen, gross, rot, rundlich geformt, mit reichlicher, zweiter Ernte.

Neue Fastolf. Sehr gross, dunkelrot, reichtragend, besonders die zweite Ernte.

Superlativ, neu, spitzkegelförmig, dunkelrot, saftreich, süss. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Obige beste Himbeersorten in verpflanzten, reichbewurzelten Ablegern kosten (mit Ausnahme von Superlativ und Goliath) 1 St. M 0.30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 18,-.

Hasel-Nüsse.

Eine Anpflanzung mit grossfrüchtigen Haselnussträuchern ist eine ausserordentlich dankbare Anlage, da die Haselnüsse bei geringen Ansprüchen an Boden und Pflege reichen und sichern Ertrag bringen.

Wir liefern mehrjährige, kräftige, verpflanzte Ableger.

Bronswik Cub, sehr grossfrüchtig und reichtragend.

Dickschalige Nikita.

Gubener Barceloner, mittelgross, rundlichkantig, dichte Büsche bildend.

Hallesche Riesennuss, sehr grossfrüchtig, kugelige Form.

1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-Lambertnuss, rotfrüchtige, von feinem, mandelartigem Geschmack, mit karminroter Färbung der Kernhaut.

Lambertnuss, weissfrüchtige, mittelgross, spitz-eiförmig, dünn-

Lambertnuss, rotblättrige, ist durch ihr rotes Laub ein schöner

Zierstrauch.

Lange von Downton. Mittelgross, länglich. Strauch fruchtbar. Lange Landsberger, gross bis sehr gross, lang verkehrt-eiförmig Strauch fruchtbar.

Webb's Preisnuss ist eine sehr grosse Nuss, deren Kern die ganze, nicht dicke Schale ausfüllt und sehr wohlschmeckend ist. 1 St. M 1, 10 St. M 8,—

Wunder von Bollweiler, eine grosse, runde Frucht mit harter

Zellernuss, Ludolfs, eine grosse, ovalkantige, reichtragende Nuss.

Zellernuss, Truchsess, ist eine der grössten Nüsse, sehr lang gebaut.

Obige Sorten grossfrüchtiger Haselnüsse kosten in starker, verpflanzter, dreijähriger Ware (mit Ausnahme der

Stachelbeeren.

Wir liefern die Stachelbeersträucher in verpflanzten kräftigen Exemplaren zu 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-. 100 St. M 40,-

Wir liefern aus den roten, gelben, grünen und weissfrüchtigen die besten Sorten, wie:

Rote Triumphbeere, Sämling von Maurer, Hönings Früheste. Früheste Gelbe,

Golden Crown, Grüne Flaschenbeere, Hellgrüne Samtbeere, Grüne Riesenbeere,

Früheste von Neuwied, Weisse Volltragende, Triumphbeere.

Johannisbeeren.

Rote Sorten.

Kirschjohannisbeere, Beere gross, dunkelrot.

Versailler rote, äusserst saftreich, Beere gross, glänzend dunkelrot in langer, lockerer Traube. Besonders fruchtbar.

Fays new prolific, die Traube ist lang mit dunkelroten, grossen Beeren. Reichtragend. Kaukasische, dunkelrot.

Holländische rote, hellrot, sehr fruchtbar.

Weisse Sorten.

Weisse Holländische, gelblichweiss, von mildem Geschmack. Weisse Versailler, lange Traube mit grossen Beeren.

Schwarzfrüchtige.

Bang up, mittelgross bis gross, sehr fruchtbar. Lees Schwarze, grossbeerig und saftreich.

Kräftige, verpflanzte Exemplare kosten:

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 30,-



Stachel- u. Johannisbeer-Hochstämmchen in extra schöner, kräftiger Ware . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-100 St. M 130,-

Edelreiser

Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen:	Pfirsiche und Aprikosen:
Aeltere Sorten: 1 Reis 1 <	1 Reis
100 Reiser in 10 Sorten "12,—	

Neuere Sorten: 1 Reis 1/8 des Preises einer einjährigen Veredelung.

Besonders starke, verpflanzte Schaupflanzen.

Für neu anzulegende Gärten,



denen durch Pflanzung extra starker Einzel - Exemplare sogleich der Charakter einer fertigen Anlage gegeben werden soll, haben wir starke, verpflanzte Zierbäume und Gehölze vorrätig, die wir auf Seite 94 und 95 anführen.

Diese Bäume und Gehölze sind in weitem Abstande nochmals verpflanzt und gewährleisten durch ihr dadurch bedingtes reiches Wurzelvermögen ein leichtes Anwachsen und rasches Gedeihen.

Wenn in einer Neu-Anlage die Hauptmasse in Gehölzen gewöhnlicher Stärke (Bäume s. Seite 96—98, Sträucher s. Seite 101—110) gepflanzt ist, so genügen einige Hauptpunkte in extra starken Pflanzen, um dem Ganzen ein fertiges Gepräge zu geben.

Ausser diesen namentlich angeführten sind nun noch in unseren Anlagen besonders starke, mehrmals verpflanzte Schaupflanzen vorrätig, die bei Gelegenheit zu (dem Werte der Pflanzen entsprechenden), von uns vorher bestimmten Preisen abgegeben werden, und teilen wir Interessenten gerne näheres schriftlich mit. Diese letztgenannten Exemplare sind ihrer Grösse wegen nur bei Waggonladungbezug beizupacken.

Wir machen auch noch an dieser Stelle auf unsere reiche Auswahl regelmässig verpflanzter Koniferen in extra starken, schönen Solitärpflanzen aufmerksam (Seite 112–118).

Magnolien mit Blütenknospen.

Starke verpflanzte Exemplare mit Ballen.

	Starte verpitatize Enteripret
Ma	nolia Alexandrina, weiss, aussen braunrot 1 St. M 6,50
"	amabilis, weiss 1 St. M 6,—
12	Lenné, dunkelrot 1 St. M 8,—
	rustica flore rubro, dunkelrot 1 St. 16,50
**	Soulangeana, weiss, wenig braunrot gestreift 1 St. M 6,—
	speciosa, weiss, aussen blutrot gestreift 1 St. M 6,50
"	tripetala. Schirmmagnolie mit riesig grossen Blättern und
"	weissen Blüten. Verpflanzte Sträucher 1 St. M 3,-

Verpflanzte Ziersträucher und Pyramiden.

Ahorn-Pyramiden. Ohne Ballen.

Acer. Besonders die buntlaubigen Abarten der A. Pseudo-Platanus und Negundo (siehe Seite 101). 1 St. M 2,50, 10 St. M 24,—

Birken-Pyramiden.

Ohne Ballen.

		opurpurea (Blutbi					
" verri	ucosa laciniata	(geschlitztblättrige	Birke)	•	. }	.16	3,—

Ballenpflanzen.

11	Maximowi	czii		1,50-2,00 m hoch M 3,-
11	pubescens	atropur	ourea,	1,20—1,50 m hoch
				1 St. M 3, -, 10 St. M 27,50
	VORMITAGORA	alamane	Vound	200-300 m hoch # 5-

Haselnuss-Pyramiden.

Ohne Ballen.

Corylus	Avellana pendula	a (Trauerhasel)	1	St. M	2,50
extra s	tark		1	St. M	5,—
Colurr	a (Baumhasel)	. 2,50—3,00 m	hoch 1	St. M	3,50

Buchen-Pyramiden.

	Buenen-1 grannaem		
ag	gus sylvatica atropurpurea major (grossblä	ttr. Bli	utbuche),
	ohne Ballen 1,00—1,50 t	m hock	\mathcal{M} 2,50
	1,50—2,00	"	,, 3,—
		19 29	,, 4,50
	2,50—3,00	77 **	" 6,—
		,, ,,	,, 4,50
		,, ,,	,, 6,—
	2,50—3,00	22 12	,, 8,—
22	sylvatica asplenifolia (farnblättr. Buche)		
	1 00 1 70	,, ,,	,, 2,50
	1,50—2,00		,, 3,50
	2,00—2,50	" "	,, 5,—
	Ballenpflanzen 2,00	,, 1,	,, 6,—
22	sylvatica pendula (Hängebuche)		
	200 200	" "	,, 4,50
		,, ,,	" 6,—
	4,00—4,50)) 1)	,, 7,50
	4,50—5,00	19 99	,, 9,—
	Ballenpflanzen 3,50—4,00	12 11	" 8,—
	100 100	12 17	"12,—
	4,50—5,00	" "	,,15,
	5,00—6,00	"	"18,—
22	sylvatica tricolor (dreifarbige Buche)		
	ohne Ballen 1,00—1,50	22 22	,, 4,—
	4 = 0 000	,, ,,	" 5,—
	2,00—2,50	,, ,,	,, 6,50
	2,50—3,00))))	,, 8,—
lut	buchen-Sämlinge 1,00—1,50	11 17	,, 1,75
	150-200	"	2.50



Magnolia.

Fraxinus aucubaefolia	. 1 St. M 2,50, 10 St. M 24,
Forsythia intermedia	. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,
Morus alba aurea (goldbunte	
	1 St. M 2,50, 10 St. M 24,

" **pendula** (*Trauer-Maulbeere*), 2,50—3,00 m hoch 1 St. *M* 2,50, 10 St. *M* 24,—

Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum)

ohne Ballen							1	St.	.10	2,50—4,00
Ballenpflanzen									. 1	St. M 6,-

Mehlbeeren-Pyramiden.

Sorbus Aria chrysophylla, lutescens

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

Syringen, Flieder

in vielen Sorten, wie auf Seite 108 1 St. M 2,- 10 St. M 18,-

Tilia platyphyllos filicifolia (farnblättrige Linde)

1 St. M 2,50, 10 St. M 24,—

Ulmus Dampieri Wredei (Gold-Ulme), prächtige Schaustücke des Gartens 1 St. M 2,50 in Sorten, wie: effusa variegata, montana atropurpurea,

medio argenteo-variegata, van Houttei.

1 St. M 2,-, 10 St. M .18,-

Von diesen sehr starken, verpflanzten Sträuchern und Pyramiden liefern wir in betr. Zusammenstellung unserer Wahl:

10 St. M 20,-, 100 St. M 180,-

Verpflanzte Zierbäume und Gehölze.

Siehe Notiz auf Seite 93. — Volle Liste aller abgebbaren Zierbäume siehe Seite 96—98.

Bei Bäumen mit festen Wurzelerdballen (Ballen-Birken, Ballen-Buchen) machen wir darauf aufmerksam, dass dieselben naturgemäss durch das schwere Gewicht der Ballen bei der Höhe der Pflanzen im einzelnen nur auf kurze Entfernungen praktisch zu beziehen sind; auf weite Entfernungen jedoch ist deren Bezug nur als Beipack zu Waggonladung praktisch.

Der angegebene Stammumfang ist bei 1 Meter Höhe gemessen.

	Stamm- Umfang	1 St.	10 St.		Stamm- Umfang	1 St.	10 St.
Acer platanoides (Spitzahorn)	cm 10—12		18,—	Platanus occidentalis (Platane).	cm 10—12	2.50	22,50
platanoides (Spitzunorn)	12—14		22,50	Tatalias occidentans (7 mm)	12—14		
	14—16		27,50		14-16	4,	35,—
					16—18		
" platanoides Schwedleri (Rotblättriger					18—20		
Spitzahorn)	10-12				20—22	10,—	90,—
	12—14 14—16	,	30,— 40,—	Pohinia Parana (Parana Kura)			
	14—10	4,50	40,-	Robinia Bessoniana (Bessons Kugel-akazie)	10—12	2.50	22.50
" Pseudo-Platanus (Bergahorn)	12-14	2,25	20,—	uruzie)	12—14		27.50
"	14—16	2.75	25,—				
	16—18	3,50	30,—	" inermis (Echte Kugelakazie)	9-11	2,50	22,50
	18-20	4,80	42.50				
" " " purpureum	10—12	2 —	18,—	Tilia		4	
" " " " parparomini	12—14		22,50	Tilia platyphyllos (Grossbättrige Linde)	10-12		
	14—16				12—14 14—16		27,50
				· ·	16—18		45,—
" " " Leopoldi	10—12					,	,,,
	12—14	3,50	30,—	" tomentosa (Ungarische Silberlinde)			
" " " Simon Louis Frères	8—10	2.25	20 —		14—16		
" " " Simon Louis Frees	10—12		25,—		16—18 18—20		62,50 80,—
				" tomentosa horizontalis (Lockerzwei-	10-20	7,—	30,—
" " " tricolor	10—12			gige Silberlinde)	14-16	5,50	50,—
	12-14	,			16—18	7,—	62,50
	14—16	4,50	40,		18—20	9,—	80,—
" " " Worléei	10—12	2.75	25.—	" euchlora (Krimlinde)	8-10	2,25	20,—
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	12-14				10-12		
					12-14	3,75	35,—
Aesculus Hippocastanum (Weiss-	1			Y Y1			
bühende Kastanie)	12-14	2,—	18,	Ulmus campestris (Feldulme))	12-14	2,50	22,50
	14-16	2,75	25,—		14—16		
	16—18		35,—	" montana (Bergiume)	16—18	5,	45,
	18—20 20—24		45,— 67,50	" Pitteursi	10—12		22,50
	20—24	7,30	07,50	1	12—14	3,50	30,—
Ailanthus glandulosa (Götter-				" vegeta	10-12	2,50	22,50
baum)		4,50	40,—		12-14	3,50	30,—
				" camp. umbraculifera (Kugelulme)	10—12	3,—	27,50
†Betula pubescens purpurea (Blut-							
birke), Ballenpflanzen		5,—	-	" effusa variegata	10—12		
					10 12	0,	21,00
†Fagus sylvatica atropurpur. major				" montana atropurpurea			
Blutbuche), Ballenpflanzen		8,	_		10-12	3,—	27,50
· ·				" van Houttei	8-10		
Fraxinus excelsion (Esche)	12-14	2,25	20,—		10-12	3,—	27,50
				" Wheatleyi	8-10	2,50	22,50
" excelsior aurea	8-10	2,50	22,50		10—12	3,—	27,50

Allee-, Zier- und Gartenbäume.

Hochstämme von Trauerbäumen.

† Betula verrucosa elegans Youngi (Zierliche Trauerbirke). 1 St. M 2,50 Dieselben mit Ballen 1 St. M 5,— Caragana arborescens pendula (Hängender Erbsenbaum). 1 St. M 1,75 † Fagus sylvatica pendula (Trauerbuche) mit Ballen 1 St. M 8,— † " atropurpurea pendula mit Ballen. 1 St. M 10,— Fraxinus excelsior pendula (Traueresche) 1 St. M 2,— " excelsior pendula, starke, verpflanzte Bäume. 9—11 cm. 1 St. M 3,50 excelsior aurea pendula (Trauergoldesche) . 1 St. M 3,— Dieselben verpflanzt. 9—11 cm 1 St. M 3,50 Prunus Chamaecerasus pend. (Trauer-Zierkirsche). 1 St. M 2,— Trauerbäume in kräftiger Ware nach unserer	Sorbus aucuparia pendula (Trauereberesche) 1 St. M 3,— Salix alba vitellina pendula nova (Trauer- Dotterweide), verpflanzte Bäume 1 St. M 3,— Ulmus campestris suberosa pendula (Trauer-Korkrüster). 1 St. M 1,75 Dieselben verpflanzt, Stammunfang 10—12 cm 1 St. M 3,— 12—14 cm 1 St. M 4,— 14—16 cm 1 St. M 5,— montana pendula (Grossblättriger Trauerrüster) . 1 St. M 1,75 Dieselben verpflanzt, Stammunfang 8—10 cm 1 St. M 2,50 10—12 cm 1 St. M 3,— 12—14 cm 1 St. M 4,— Wahl
A	LE CONTRACTOR FOR A 1 Ct W1 50 10 Ct W1
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—	Fraxinus excelsior (gemeine Esche) 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,— "excelsior aurea 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—
" platanoides globosa (Kugelahorn) 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—	Laburnum vulgare (Goldregen) . 1 St. M 1,75, 10 St. M 14,—
" Schwedlerl (roter Ahorn), blutrote Zweigspitzen. 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—	Populus alba nivea (Silberpappel) 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—
	Dallana (Dunamidan Cilhamanna)
", Pseudo-Platanus (Berg-Ahorn). 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,— 100 St. M 130,—	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" Leopoldi (<i>Leopolds bunter Ahorn</i>), weissbunt mit rot- und weissbunten Jungtrieben.	Robinia Pseudacacia (gemeine Akazie). 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—
" " Simon Louis Frères (Simons bunter Ahorn), rosa und weissgrün.	" Bessoniana (starkwachsende Kugel-Akazie). 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—
" " tricolor (<i>dreifarbiger Ahorn</i>), weiss, grün und rosarot schattiert.	" " " inermis (dichte Kugel-Akazie). 1 St. N 1,75, 10 St. N 16,—
" Worléei (goldblättriger Ahorn), goldgelbes Laub. Obige 4 Sorten: 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—	" " " rubra (kurzzweigige Kugel-Akazie). 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—
Aesculus Hippocastanum (Rosskastanien). 1 St. M 1,60, 10 St. M 15,—	Sorbus aucuparia (Vogelbeere oder Eberesche). Allgemein bekannt durch seine leuchtend roten Fruchtdolden. Anspruchslos im Boden und Standort. 1 St. 16 1,50, 10 St. 14,—
Allanthus glandulosa (<i>Götterbaum</i>), grossgefiederte Blätter, starkwachsend 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—	", Aria lutescens 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,— Tilia tomentosa (Ungarische Silberlinde).
Betula verrucosa (Weissbirke) 1 St. M 1,60, 10 St. M 15,-	1 St. M 3,-, 10 St. M 27,50
", verrucosa laciniata (geschlitztblättrige Birke). 1 St. M 2,, 10 St. M 18,	" " horizontalis (lockerzweigige Silberlinde). 1 St. M 3,—, 10 St. M 27,50
Catalpa speciosa (<i>Trompetenbaum</i>), ausgezeichnet durch die schöne lichtgrüne Belaubung und die grossen weissen Blütendolden.	" euchlora (<i>Krim-Linde</i>), goldgelbes Holz, dunkelgrüne Blätter. 1 St. M 2,25, 10 St. M 20,—, 100 St. M 180,—
1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—	", platyphyllos (grossblättrige Linde). 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—
Crataegus media rubra splendens (Granat-Rotdorn), leuchtend rot, einfach blühend 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—	Ulmus hollandica (Pitteursi) (Holländische Rüster).
" monogyna kermesina plena (gefüllter Scharlachdorn), Pauls New Scarlet 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—	1 St. M 1,75, 10 St. M 16,— " glabra vegeta (starkwüchsige Rüster oder Huntingdon-Ulme). 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—
" " rubra plena (gefüllter Rotdorn). 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—	" campestris umbraculifera (Kugel-Ulme). 1 St. M 2,25, 10 St. M 20,—
" " rosea plena (gefüllter Rosa-Rotdorn). 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—	" mont. atropurpurea (blutrole Ulme). 1 St. N 2,—, 10 St. N 18,—
" oxyacantha alba plena (gefüllter Weissdorn), weissgefüllt blühend 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—	" montana lutescens van Houttei (goldgelbe Ulme). 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Zier-Hochstämme für den Garten

Schmuck-Halbhochstämmchen.

Da Zier-Halbhochstämmchen zum lieblichsten Schmuck des Rasens gehören, so haben wir von allen reizenden Gehölzarten, die sich dazu eignen, solche herangezogen und bieten in nachfolgendem eine reiche Auswahl derselben mit einer Stammhöhe von 1—1,40 m.

Acer (Ahorn). Die hier unter Halbstämmchen angeführten Ahorne sind sämtlich buntblättrige Sorten, die sich durch ihre leuchtende Färbung immer als ein besonderer Schmuck im Garten bewähren.

Negundo fol. marg. elegans. (Annutiger, goldbunter Ahorn).

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

" Odessanum. (Bronze-Gold-Ahorn),

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Pseudo-Plat. Prinz Handjery (Rosabunter Ahorn).

1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Amygdalus nana (Zwergmandel). 1 Stück M 1,75 persica dianthiflora. Kaiser Friedrich III. " 16,—

Klara Meyer.

Buxus arborescens (Buchsbaum). Die kleinen Kugelbuxus kommen heute in unseren Gärten wieder mehr in Aufnahme, besonders im regelmässigen Garten werden sie auf Rabatten gern verwendet, da die immergrüne Pflanze einen Winterschmuck bildet. Mit 35-55 cm hohem Stämmchen und 1 St. M 4,starker Krone .

Calophaca wolgarica, goldgelbe Blüten, graufilziges Laub.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,— Dieselbe verpflanzt

(Zwerg-Erbsenbaum). Die zwergigen Caraganen bilden auf Halbstämmchen schöne runde Kugeln, bedeckt mit der Fülle der zierlichen gelben Schmetterlingsblüten.

Chamlagu, mit dunkelgrünen bis spät in den Herbst haltenden Blättern 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

pygmaea, sehr feinzweigig . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Dieselbe verpflanzt 1 St. M 2,50

pygmaea aurantiaca erecta . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

jubata (braunzottige Mähnen-Caragane) . . 1 St. M 2,50

microphylla, kleinblättrig, sehr zierlich, 1 St. M 1,50, 10 St. Dieselben auch verpflanzt .

Cornus (Hartriegel).

alba marginata elegant., Blatt weiss gerandet sehr zierlich. Späthi, Blatt leuchtend goldgelb, leidet nicht in der Hitze. robusta, stärker wachs. Abart der vorigen, bronzefarb. Preis obiger 3 Sorten 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Corylus Avellana aurea (Goldhaselnuss),

Avellana pendula (Trauerhaselnuss),
Preis obiger 2 Sorten 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Crataegus (Rot- und Weissdorn). Zu den reich-blühendsten Garten- und Parkbäumen gehören unstreitig alle Rot- und Weissdorn-Arten. Zur Zeit der Blüte im Mai-Juni sind diese Bäume überschüttet von einfachen und gefüllten Blüten in weiss, rosa, rot bis dunkelrot, und gereichen daher jedem Garten zur Zierde. Wir haben Halbstämmchen herangezogen, die man besonders im kleinen Hausgarten gut verwenden kann.

media rubra splend. (Granatdorn), leucht. rot, einfach blüh. monogyna kermesina plena (Paul's new scarlet). (Ge-

füllter Scharlachdorn).

monogyna kermesina rubra plena (Gefüllter Rotdorn).

rosea plena.

Preis obiger 4 Sorten 1 St. M 1,25, 10 St. M 12,monogyna rosea plena Maseki, neu, grossblumig, gefüllt, lebhaft rosa . . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14, oxyacantha alba plena (Gefüllter Weissdorn). 1 St. M 1,25, 10 St. M 12,-

Fagus sylv. atropurp. tricolor, verpflanzt . . 1 St. M 4,— Forsythien schmücken den Garten im frühesten Frühling leuchtend, den Frühling verkünden.

Forsythia Fortunei, gewöhnl. Stärke 1 St. M 1,25, 10 St. M 12,—

intermedia, gewöhnliche Stärke. 1 St. M 1,25, 10 St. M 12,-Fraxinus Novae Angliae, americana fol. arg. marg., nur starke verpflanzte Bäume 1 St. M 2,50

Halimodendron (Silber-Salzstrauch).

argenteum, mit silbergrauem Laub und rosa-vio-letten Schmetterlingsblüten,

1 St. M 1.50, 10 St. M 14,—

", fl. purpureo, purpurrote Blüten,

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

1 St. M 2,50, 10 St. M 24,—


elben verpflanzt . . . 1 St. M 2,50, 10 St. M 24,— Dieselben verpflanzt

Hibiscus syriacus (Eibisch), gefüllte und einfach blühende Sorten 1 St. M 2,50

Hydrangea paniculata grandifl. . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Agustrum ovalifol. aureum elegantiss.

Der Gold-Liguster mit seinen lederartigen leuchtend goldbunten Blättern ist in der Kronenform als Halbstämmchen eines unserer wirkungsvollsten bunten 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,-



Halbstamm von Pirus Scheideckeri.

Pirus Scheideckeri (Gefülltblühender Zierapfel). Wunderbar schön. Wie die oben stehende Abbildung zeigt, ist dieser Zierapfel im Frühjahr mit Blumen geradezu überschüttet . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Pirus malus pendula "Elise Rathke". Dieser schöne Trauerbaum erfreut uns nicht allein durch reichen Blütenschmuck, sondern auch durch seine prächtig gefärbten Tafelfrüchte. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Schmuck=Halbhochstämmchen.



Zierkirsche "Hisakura".

Zier=Kirschen.

In ihrer überschwänglichen Blütenfülle, der Pracht ihrer lebhaft rosa und weissen Blüten, bilden diese Zierkirschen den edelsten Frühjahrsschmuck unserer Gärten.

Prunus Avium fl. pl. (Gefülltblühende Süsskirsche).

" Cerasus Rhexi fl. pl. (*Gefülltblüh. Sauerkirsche*). Beide Sorten: 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Japan. Zierkirschen.

Prunus serrulata (syn. Cerasus hortensis roseo pl.) 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—

- " serrulata **Hisakura**. Neue japanische Einführung, die mit ihren 5 cm breiten, halbgefüllten, lebhaft rosafarbenen Blüten, zu grossen Büscheln vereinigt, überall Bewunderung erregt.

 1 St. *M* 2,50
- " serrulata Benifugen, ähnlich der vorigen, mit Pr. triloba ähnlichen Blüten.
- " serrulata Yoshino, einfach schneeweissblühend, prachtvoll als Gegenstück zu den vorigen.
- " serrulata James H. Veitch, dichtgefüllt, rosafarb. Obige 3 Sorten: 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Hänge=Zierkirschen.

Prunus sinensis pendula. Japanische Blütenhängekirsche, in ihrer überreichen zart rosa Blütenfülle, die anmutigste Gartenzierde. Mit Recht eine Blütenfontaine genannt.

1 St. M 2,50

Zier=Mandeln.

Prunus triloba. Die gefüllte Mandel ist eines der beliebtesten Zierbäumchen, dessen Zweige rundum wie mit Rosenknöspehen dicht besetzt sind.

1 St. M 1,40, 10 St. M 12,—, 100 St. M 100,—

Dieselben mit ganz niedrigen, 30-50 cm hohen Stämmchen, sog. Fussstämmchen,

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—, 100 St. M 60,—

Prunus sinensis fl. albo pl. $1 \text{ St. } \mathcal{M} = 1,25,$ $0 \text{ roseo } 0, 0 \text{ for } 0 \text{ st. } \mathcal{M} = 1,25,$

Zier-Pflaumen.

Prunus cerasifera purpurea (syn. Pr. Pissardi),

Blutpflaume 1 St. N 1,25, 10 St. N 12,—

Dieselben, stark verpflanzt 1 St. N 1,75

" cerasifera purpurea Moseri (syn. Pr. Pissardi

Moseri fl. pl.), Gefülltblühende Blutpflaume.

1 St. N 1,75, 10 St. N 16,—

Dieselben, stark verpflanzt 1 St. N 2,25

Robinia hispida (Rotblüh. Akazie).

- " angustifolia elegans (Anmutige Akazie).
- " neomexicana, rosafarben, in aufrechten gedrungenen Trauben blühend.
- " viscosa (Kleb-Akazie), hellrosafarben.

Alle 4 Sorten: 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,-

Syringa vulgaris (Einfachblüh. Flieder), in besten Sorten.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

" fl. pleno, (Gefülltblühender Flieder), in besten Sorten, blau und weiss . . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Ulmus Dampieri Wredei (Gold-Ulme) 1 St. M 2,-

Viburnum Opulus sterile (Schneeball). Die weissen, grossen Blütenbälle erscheinen im Mai-Juni. 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—

Von buntblättrigen und Blütengehölzen liefern wir Halbhochstämmchen nach unserer Wahl 10 St. M 14,-, 100 St. M 120,-.

Wertvolle neuere Ziergehölze.



Buddleia variabilis Veitchiana (Frühjahrs-Pflanzung geboten).

Ganz hervorragende neue Ziersträucher sind die Buddleia variabilis-Varietäten. Sie blühen zu einer Zeit, wo wenige Blütensträucher den Garten beleben. Die Blütenrispen stehen in langen Endtrauben frei über dem Laubwerke. Jedes kleine Nebentriebehen bringt kleine Rispen und ist eine Pflanze im Schmucke ihrer dunkelpurpurvioletten Färbung von wunderbarem Effekt. Der Flor beginnt Ende Juli und dauert bis zum Eintritt des Frostes fort. Der Strauch wird bis 2 Meter hoch. Zur Einzelstellung im Rasen, wo sich die neigenden Zweige nach allen Seiten hin ausbreiten können oder auch zu ganzen Trupps vereinigt, sind sie durch ihren lang andauernden Flor während der Sommermonate von grossem Werte. Wenn auch gegen Winterkälte etwas empfindlich, so treiben sie doch von neuem aus dem Wurzelstock aus und blühen gleichwohl gut. Wir raten daher, den Boden um die Pflanze herum dick mit Laub zu decken und den unteren Teil der Pflanze mit Tannenreisig zu schützen.

Buddleia variabilis Veitchiana ist eine auffallend schöne neue Abart der aus Tibet eingeführten Stammform. Ueber dem weisslichgrünen Laube stehen dichte und glänzende Blütenähren, malvenlila mit orangegelber Mitte.

1 St. M 0,75, 10 St. 6,— M

variabilis magnifica ist eine verbesserte Varietät von B. var. Veitchiana und an Reichtum der endständigen Blütenrispen der ersteren gleichend, übertrifft sie diese durch den dunkleren Ton der purpurrosafarbenen Blumen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Buddleia variabilis superba. Diese herrliche Sorte übertrifft noch die vorige an Schönheit, durch die grössere Länge und intensivere Färbung der Blütenrispen. Letztere ist ein weiches Lilarosa. Die Blütezeit beginnt 2 Wochen später als bei Veitchiana und magnifica. 1 St. M 1,25, 10 St. 11,—

nivea. Neu! Diese neue, aus Westchina stammende schöne B. unterscheidet sich charakteristisch von den vorigen dadurch, dass die Triebe und die Unterseite der Blätter mit weisser Wolle dicht besetzt sind. Die Blüten sind lavendelblau und erreichen eine Länge von 15—20 cm. Pflanzen aus Töpfen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Hydrangea arborescens grandifl. alba.

Prachtvolle, völlig winterharte Neuheit aus Amerika. Die grossen Blütenbälle sind rein schneeweiss und blühen von Anfang Juni bis August, in der Form den Hortensien ähnlich . . . 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 8,— 100 St. \mathcal{M} 75,—

Hydrangea cinerea sterilis. Neu! Wie die vorige, ist diese neue Hydrangea völlig winterhart, Das Blatt ist breiter als bei der vorigen und dunkelgrün; die Blüten sehr gross, reinweiss. Der Strauch wächst sehr kräftig und gedeiht in jedem Boden. Junge Pflnnzen aus Töpfen 1 St. M 0,90

Lonicera pileata. Neu! Ein sehr zierlich wachsendes, immergrünes, kriechendes Geissblatt, das für Felspartien besonders geeignet ist. Die Blüten erscheinen in Menge achselständig an den Spitzen der Triebe, sind wohlriechend und gelblichgrün gefärbt. Pflanzen aus Töpfen 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—



Hydrangea arborescens grandiflora.

Wertvolle neuere Ziergehölze.

Deutzia discolor major, durch Veitch neu eingeführt aus Zentral-China. Diese Neuheit wächst gedrungen und blüht im Juni in Büscheln an der ganzen Länge der vorjährigen Zweige, die Blumen sind reinweiss und gross.

- " myriantha. Dünne Zweige mit grossen, verzweigten Dolden grosser, schneeweisser Blumen.
- " Vilmorinae, aus China neu eingeführt, mit aufrechten Zweigen, bedeckt mit Dolden schneeweisser Blüten.

Obige 3 Sort.: 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Philadelphus Lemoinei "Bouquet Blanc". An langen Zweigen, sehr reichblühend mit reinweissen gefüllten und halbgefüllten Blüten. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

- " Lemoinei "Nuée blanche". Aufrecht wachsend mit sehr grossen, runden, regelmässigen Blüten, schneeweiss. 1 St. M 1,—
- "Lemoinei "Rosace". Von leichtem, gefälligem Bau, trägt der kleine Strauch grosse, halbgefüllte, milchweisse Blüten, die einen sehr feinen Duft ausströmen. 1 St. M 1,—

" Lemoinei "Voie Lactée". Eine besonders edle Erscheinung unter den entzückenden Lemoinei-Hybriden. Die Riesenblüten sind schneeweiss und lassen die goldenen Staubfäden besonders klar hervortreten. 1 St. M 1,—

Prunus cerasifera purpurea Moseri ist eine neue Spielart von Prunus Pissardi, mit der gleichen purpurroten Belaubung wie diese, aber mit rosagefüllten Blüten.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Halbstämme davon

1 St. M 1,75, 10 St. M 16,—

Rhus typhina laciniata. Eine sehr wertvolle, aus Amerika eingeführte Neuheit. Die jungen Triebe sind karminrot behaart und stehen in wunderbar schönem Kontrast zu der farnähnlichen, äusserst fein zerschlitzten Belaubung, die sich im Herbste lebhaft rot färbt.

Kräftige Sträucher 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Rubus bambusarum (neu!) Halbschlingender Brombeerstrauch, der ausserordentlich rasch und stark wächst, die Blätter sind 3-5 teilig, oberseits glatt, unterseits mit dichtem dunkelbraun gefärbtem Filz bedeckt, Blüten endständig, im Herbst essbare schwarze Früchtchen.

Pflanzen aus Töpfen 1 St. M 1,50

Viburnum rhytidophyllum (neu!) Die ungemein edle feine Belaubung und der kräftige Wuchs werden diesen neuen Schneeball bald sehr beliebt machen. Die breiten lanzettförmigen Blätter sind 20—23 cm lang und 5—6 cm breit, oberseits dunkelgrün, unterseits mit wolligem, braunem Filz bedeckt; blüht in Dolden endständig gelblich-weiss. Soll völlig winterhart sein, doch raten wir zur Vorsicht.

Pflanzen aus Töpfen 1 St. M 2.50



Spiraea_sorbifolia_var. stellipeda.

Spiraea sorbifolia var. stellipeda. In jeder Beziehung ist diese neue Spiraea eine Vervollkommnung der alten bekannten Spiraea sorbifolia. In Farbe, Form und Belaubung der alten Sorte ähnlich, erreichen jedoch die Blütendolden dieser schönen Neuheit eine Länge von 40—50 cm und eine Breite von 25—30 cm. Auch erscheint die Farbe der Blüten reiner und weisser als die der Stammart.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 60,-

- Weigelia praecox "Bouquet rose". Grosse, gut geöffnete Blüten, rosa mit hellgelb gestreiftem Schlunde, blüht Anfangs Mai 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- "
 praecox "Fleur de Mai" blüht in den ersten Tagen des Mai mit hellrosa Blumen, auf der Aussenseite purpurrosa marmoriert 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- " praecox "Floréal" ist eine der ersten Weigelien, die schon Anfang Mai blüht mit grossblumigen Dolden, zartrosa mit lebhaft karmin im Schlunde. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- " praecox "Le Printemps" mit zahlreichen, aufrechten Blütendolden, zart fleischfarbigrosa.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Eine Auswahl schönblühender und buntblättriger Sträucher für Gruppen und zur Einzelpflanzung.

Acer, Ahorn.

Siehe auch unter "Hochstämmen" und "Halbstämmen" Seite 96-97 und unter verpflanzten Gehölzen Seite 94-95.

- dasycarpum (Silber-Ahorn) . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
- Wieri laciniatum. Ein Baum wie geschaffen zur Einzelpflanzung auf grossen Rasenplätzen; um mit seiner zierlichen, hochedlen Belaubung voll zur Geltung zu kommen, bedarf er vollkommen freien, sonnigen Stand-

- Ginnala (sibirischer Ahorn), mit dreilappigen Blättern, die sich im Herbst dunkelkarminrot färben 1 St. $\mathcal M$ 0,80, 10 St. $\mathcal M$ 7,—
- Negundo aureum Odessanum (Eschen-Gold-Ahorn), ist leuchtend sattgelb mit bronzefarbenen Trieben. Die herrliche Goldfärbung leidet auch bei starkem Sonnenbrand nicht 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-
- Negundo fol. arg. var. (silbr. Eschen-Ahorn), der bekannte, fiederblättrige, buntweisse Ahorn, dessen helles Laub weithin leuchtet 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- Negundo fol. aur. marg. elegans, leuchtend goldbunt gerändert. Die älteren Blätter werden weissbunt. 1 St. \mathcal{M} 0,75, 10 St. \mathcal{M} 6,—
- Pseudo Platanus Leopoldi (Leopolds Berg-Ahorn). Die jungen Triebe sind rot und weissbunt gefärbt. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- Pseudo Plat. fol. purp. Prinz Handjery. Die Oberseite der Blätter dieses Bergahorns ist rosa, in ziegelrot übergehend, grün und gelbgrau marmoriert. Wächst nur schwach und ist namentlich beim ersten Austreiben von eigenartiger Schönheit 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—
- Ps.=Pl. Simon=Louis-Frères. Die Blätter zeigen rosafarbene und weissgrüne Farbenschattierung, prachtvoll. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50
- Pseudo-Pl. tricolor. Blätterweiss, grün und rosenrot schattiert 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- Pseudo-Pl. Worléei. Die schöne konstante goldgelbe Belaubung, die sich auch bei grosser Hitze sehr widerstandsfähig zeigt, sichert dieser herrlichen Abart die grösste Beachtung 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- striatum mit leuchtend weiss gestricheltem Holze. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Alnus, Erle.

- glutinosa imperialis (Kaiserliche Schwarz-Erle), mit sehr zierlich geschlitzten Blättern . 1 St. $\mathcal M$ 0,90, 10 St. $\mathcal M$ 8,—
- - **fruticosa** (gemeiner Bastardindigo), dichte, violette Blütenähren über gefiederten Blättchen 1 St. $\mathcal M$ 0,40, 10 St. $\mathcal M$ 3,50

Amygdalus persica (Zierpfirsiche).

- persica alba plena, reinweiss gefüllt 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-
- " rubra plena, rot gefüllt . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- **dianthiflora**, mit halbgefüllten grossen lebhaft rosa Blüten 1 St. \mathcal{M} 1,— 10 St. \mathcal{M} 9,—
- magnifica, prachtvoll leuchtend karminrot gefüllt. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Amygdalus persica (Zierpfirsiche).

- " persica Kaiser Friedrich III. Neue sehr zierende Pfirsichsorte mit leuchtend rosa gefüllten Blüten, auch die Früchte sind wohlschmeckend . . 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—
- Klara Mayer. Grossblumig, ebenfalls leuchtend rosa gefüllt, ist von grösster Wirkung, hat gleichfalls Wert als Obstbaum 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,—
- fol. purpureis, die rotblättrige Pfirsich, die rosa blüht, und kleine, dunkelrote Früchte trägt. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Aristolochia, siehe Seite 80.

Aucuba japonica aurea var. (jap. Goldorange). Pflanzen mit festen Erdballen, 40-50 cm Höhe, 1 St. M 1,20 " 50—60 " "

- Azalea mollis. Ein Farbenspiel, wie es in solchem Reichtum kaum an einer anderen Pflanze gesehen werden kann, bieten die Azalea mollis in herrlicher Leuchtkraft in den Hauptfarben rot, orange und gelb in allen Tönen, Mischungen und Schattierungen. Blüte drängt sich an Blüte in verschwenderischer Ueberfülle. Eine Beimischung von Heideoder Moorerde ist den Azaleen lieb, jedoch gedeihen sie auch in jedem lockeren Gartenboden.
 - mollis sinensis ist eine herrliche, neue Azaleenart für das freie Land, deren Blüten weit grösser als Azalea mollis und die in der Leuchtkraft und der Verschiedenheit des Farbenspiels die Azalea mollis-Hybriden weit übertrifft. Beide Sorten starke Pflanzen . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—, 100 St. M 125,—

Berberis Thunbergi (Thunbergs Berberitze) hat korallenrote Früchte und prächtige, rote Herbstfärbung. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

vulgaris (gewöhnl. Berberitze), die gemeine Berberitze mit roten Beeren 1 St. $\mathcal M$ 0,40, 10 St. $\mathcal M$ 3,—

vulgaris fol. purp. (rotblättr. Berberitze) mit doppelpurpurfarbenen Blättern 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,—

Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeerbaum, starke Sträucher. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Betula, Birke.

Siehe auch Hochstämme und Trauerbäume und verpflanzte Gehölze, Seite 94-96.

- **Maximowiczii,** Einführung aus Japan, starkwachsend. 1 St. \mathcal{M} 1,—, 10 St. \mathcal{M} 9,— Ballenpflanzen 1,50-2,00 m hoch M 3,-
- pubescens atropurpurea. Die herrliche, tiefdunkelrote Belaubung im Gegensatz zu der schneeweissen Rinde der alten Stammteile gibt dieser schönen Birke höchsten landschaftlichen Wert 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Extra starke verpfl. Pyramiden 1 St. M 3,— Ballenpflanzen 1,20-1,50 m hoch 1 St. M 3,-, 10 St. M 27,50
- verrucosa (B. alba) (Weissbirke).

Starke Pyramiden 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

- laciniata (geschlitztblättr. Weissbirke). An Zierlichkeit kaum von einem andern Gehölz erreicht, Zweige leicht hängend. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— Extra starke verpfl. Pyramiden 1 St. M 3,-
- " verrucosa elegans Youngi (Hängebirke).

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Ballenpflanzen 2,00-3,00 m hoch 16 5,-

Bignonia (siehe Seite 80). Buddleia, siehe Neuheiten, Seite 99. Buxus (siehe Seite 113). Calycanthus floridus (Gewürzstrauch), mit braunen, gewürzartig riechenden Blumen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— " praecox (frühblühender Gewürzstrauch). 1 St. M 0,80, 10 St. M 7, Catalpa (Trompetenbaum). speciosa, eine neuere Abart des Trompetenbaumes, deren Blätter grösser sind, als die der gewöhnlichen syringaefolia. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Caragana (Erbsenbaum). Chamlagu 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,jubata (braunzottige Mähnen-Caragane), selten und eigenartig 1 St. M 1,25 pygmaea (feinzweigige Zwerg-Caragane). 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-" aurantiaca, eine feine Abart der reizenden Zwerg-Caragane mit braungelben Blüten. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,— Carpinus Betulus (Weiss- oder Hainbuche), Pyramiden: 75-100 cm

 hoch
 . 1 St. M. 0,60, 10 St. M. 5,—

 100—150 cm hoch
 . 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,—

 150—200 cm hoch
 . 1 St. M. 1,25, 10 St. M. 10,—

 200—250 cm hoch
 . 1 St. M. 1,75, 10 St. M. 16,—

 Dieselben verpflanzt: 100 – 150 cm hoch 1 St. M 1,25, 10 St. M 10, 150 – 200 cm hoch 1 St. M 1,75, 10 St. M 16, 200 – 250 cm hoch 1 St. M 1,75, 10 St. M 16,-Caryopteris mastacanthus ist ein herrlicher, spätblühender Herbststrauch, der im Oktober mit dunkelblauen Blütentrauben überschüttet ist. Da er noch spät im Herbst in Vegetation, so raten wir zur Frühjahrspflanzung.

Junge Pflanzen aus Töpfen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— Cercis Siliquastrum (gemeiner Judasbaum). 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Clerodendron trichotomum, japanischer Strauch, 150—200 cm hoch werdend, blüht im Spätsommer mit 3 cm breiten, weissen Blüten 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Colutea arborescens (baumartiger Blasenstrauch)

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Cornus (Hartriegel).

" marg. elegantissima (buntblättrig. Hartriegel), mit sehr konstanter, leuchtend weissbunter Belaubung, sehr zu empfehlen 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

alba var. Spaethi, die schönste der bunten Cornus-Arten, Blätter im Frühjahr bronzefarben, im Sommer gesättigt goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb, am schönsten in Gruppen von 2 bis 3 Stück vereinigt frei auf Rasenplätzen vor dunklem Hintergrund.

alba Spaethi robusta, kräftiger wachsend als die vorige, doch ist die Färbung der Blätter weniger bunt.

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—
mascula (Kornelkirsche) . . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
tatarica sibirica, mit leuchtend korallenrotem Holze.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Corylus (Haselnuss)

siehe auch Seite 92 u. 94.

Corylus Avellana laciniata (geschlitztblättrige Haselnuss) 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

" Avellana fol. purpureis, Blätter dunkelpurpur.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

" aureis (goldblättrige Haselnuss).

" pendula (Trauerhaselnuss) mit straff niederhängenden Zweigen 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,— Colurna (Baumhasel) 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Ceanothus, Sommer-Flieder oder Sommer-Syringen.

Die Ceanothus gehören mit ihrem fast den ganzen Sommer durch währenden Reichtum zierlicher Traubenblüten in dichter Menge über dem Laubbusch mit zu den schönsten Sträuchern. Zur Einzel- und Gruppenpflanzung zu empfehlen. Leider sind sie nicht ganz winterhart und bedürfen guten Winterschutzes.



Ceanothus hybridus azureus grandiflorus, himmelblau.

- " Ceres, hellrosa.
- " Gloire de Versailles, schönste himmelblaue.
- " Marie Simon, hellrosa.
- " Perle rose, dichtgedrängte Rispen von hellrosa Farbe, extra schön.

Frühjahrspflanzung geboten.

Crataegus (Weiss- und Rotdorn), in weiss, rosa und rot gefüllten und einfachen Spielarten.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,— " **Azarolus** 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

" Carrierei 1 St. M 1, -, 10 St. M 9,-

Cydonia japonica. Die japanischen Quitten gehören mit ihren leuchtenden, dichtbehangenen Blütenzweigen zu den schönsten Frühjahrs-Blütensträuchern. In verschiedenen Farben von weiss bis dunkelrot.

- " jap. candida, reinweiss.
 - " cardinalis, feurig scharlach.
- " " grandiflora rosea, rosa.
- " " Mallordi, hellrot.
- " " sanguinea plena, hellscharlach, leicht gefüllt.
 - " umbilicata, hellrosa.
- " " versicolor lutescens, gelblich rot.

Obige Sorten 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Cytisus elongatus blüht im Mai an langen Ruten gelb mit braun.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—



Kriechende Cotoneaster

(Zwergmispel).

Die kriechenden Cotoneaster sind mit ihren immergrünen

Blättchen und den roten Herbstbeeren die reizendsten, niederliegenden, wintergrünen Sträucher, insbesondere auch zum Schmuck der Felspartien.

Cotoneaster horizontalis breitet sich fächerartig flach und weit aus, Erde und Steine mit den zierlichen, immergrünen Zweigen dicht deckend, die im Herbst und Winter mit roten Früchten geschmückt sind.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 60,-

Cotoneaster microphylla. Kleinblättrige Zwergmispel mit ebenfalls roten Früchten, vorzügliche Pflanze für Fels-1 St. M 0,75, 10 St. M 6. buxifolia, niedrig, breitwachsend und immergrün mit runden Blättern und roten Früchten 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Cotoneaster (Zwergmispel). Strauchartige Cotoneaster Francheti, neu, mit hellgrünem Laube und orange-

gelben Früchten humifusa, neu! eine neue kriechende Art, zur Anpflanz. auf Felsengrupp. sehr geeignet. Früchte scharlachrot. 1 St. M 1,60 pannosa, mit schönen roten Früchtchen . . 1 " " 1,-

Cotoneaster pyracantha Lalandi (Feuerdorn). In dem reichen Schmucke der feurig orangeroten Früchtchen ist dieser Feuerdorn einer unserer schönsten Ziergehölze 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Alle vorgenannten Cotoneaster sind in Töpfen vorrätig und zu jeder Zeit lieferbar.

Deutzia (Deutzien): Neuere Hyriden.

Deutzia kalmiaeflora.

An grossen Dolden grosse, runde Blumen, weit geöffnet. deren Blättchen gekraust u. die weiss und zartrosa gefärbt sind . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Lemoinei "Avalanche". Schneeweisse Blüten, die den Strauch in vielblütigen Doldentrauben bedecken.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Lemoinei "Fleur de pommier". Die 60 cm langen Zweige sind bedeckt mit Dolden, die je 20-30 aufrechte Blüten tragen, zartrosa in weiss übergehend.

1 St. N 0,75, 10 St. N 6,

Lemoinei Boule rosè. Die runden Blumenblätter sind weisslich rosa gerandet 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

scabra (Thunberg), echt. Die echte Deutzia scabra bildet einen kleinen Strauch mit graugrüner Belaubung; die Blütchen bedecken die Zweige auf ihrer ganzen Länge und sind milchweiss mit orangegelber Mitte.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,— discolor grandiflora. Bei hellgrünem Laube lange Dolden grosser Blüten, weiss mit hellrosa und roten Knospen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

gracilis campanulata. Der buschige Strauch blüht sehr reich mit milchweissen Blumen in glockenartiger Form.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,

gracilis carminea. Der feinzweigige Strauch blüht sehr reich und sind die Knospen und die Aussenseite der Blütenglocken dunkel karminrot, während das Innere der Blüte zart rosa gefärbt ist 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-



Deutzia Hybrida.

Deutzia gracilis eximea. Die Blütchen sind innen weiss, aussen hellrosa mit karminroten Knospen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

gracilis venusta. Die langen Blütenrispen sind reinweiss und die für eine Deutzia sehr grossen Einzelblüten reizend geformt, da ihr Rand gewellt ist.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Weitere Deutzien-Sorten siehe nächste Seite!

Deutzia (Deutzien): Fortsetzung.

Deutzia crenata fl. pl. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-" candidissima fl. pl. . . 1 " " 0,50, 10 " " 4,— Pride of Rochester, sehr grossblumig, weissgefüllt 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

fl. roseo pl. 1 " " 0,50, 10 " " 4,—

Fortunei 1 , , 0,50, 10 , , 4,—

Desmodium penduliflorum, besonders als Solitärpflanze auf Rasen zu empfehlen. Die langen, rutenartigen Zweige bedecken sich im Herbst mit einer grossen Menge violetter Blütenrispen 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Dimorphanthus mandschuricus (Aralia spinosa). Schöne Einzelpflanze mit grossen gefiederten Blättern und mit starken Stacheln bewehrt 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Elaeagnus angustifolia, schmalblättrige Oelweide.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

argentea, Silberölweide mit silbrigen Blättern und hellgelben Blüten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Exochorda grandiflora (Sp. grandifl.). Eine unserer edelsten Spiraeen mit einer Fülle grosser reinweisser Blütentrauben.

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Evonymus europaeus, mit roten, aufklappenden Früchtchen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Buchen, siehe Seite 94—95.

Forsythia intermedia vereinigt mit dunklem Laube schr grosse, gelbe Blüten . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- " Fortunei. Die gelben Blüten erscheinen in verschwenderischer Fülle an den grünholzigen Zweigen vor den Blättern im März-April und machen die Pflanze so überaus wirkungs-. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- " Suspensa, mit überhängenden Zweigen, eignet sich zum Bepflanzen alter abgestorbener Baumstümpfe ca. 1 m hoch über dem Erdboden . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Fraxinus exc. elegantissima, zierlich gefiedert.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

americana fol. arg. marg., weiss gerändert. 1 St. \mathcal{M} 0,75, 10 St. \mathcal{M} 6,—

Novae Angliae, dunkelgrün. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-

pubescens aucubaefolia, goldbunt.

1 St. N 0,75, 10 St. N 6,-

- Halimodendron argenteum (Silberhaariger Salzstrauch). Die ganze Belaubung des schönen Strauches ist einfarbig silbergrau, im Juni blühend, mit rosa-violetten Schmetterlingsblüten 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- argenteum flore purpureo mit lebhaft purpur-1 St. M 0,75, 10 St. M 6,rosafarbenen Blütchen
- Hedysarum multijugum (Mannaklee). Winterharter Blütenstrauch, im Juni und Juli in langen, karminpurpurnen Blütentrauben blühend; der Bau des Strauches ist rundlich und fein verzweigt, Blätter graugrün-seidig, weiss behaart. Bedarf eines sonnigen Standortes.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Hydrangea pan. grandiflora, die grossblumige, winterharte Hortensie. Der schönste der Herbstblütensträucher mit mächtig grossen, reinweissen, im Verblühen rosa angehauchten dichten Blütenrispen. Der auffallenden Schönheit und Reichblütigkeit wegen bei gedrungenem Wuchs ist dieser Strauch auch sehr zu Gruppen oder Beetpflanzung zu empfehlen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

pubescens, weichhaarige Hydrangea, aus den Gebirgen von Peking stammend, winterhart. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Hibiscus=Eibisch.

Die verschiedenen Spielarten des syrischen Eibisch reichblühend mit grossen, glockenförmigen Blumen rund um die Zweige, in den schönsten Farben mit bunten Flecken am Grunde der Blumenblätter - sind ein prächtiger Schmuck für jeden Garten. In rauhen Lagen verlangen die Eibisch Winterschutz. Sie erfreuen uns mit ihrer reichen vielfarbigen Blüte zu einer Zeit — im August bis September — wenn fast alle anderen Gehölze keinen Blumenschmuck mehr zeigen. Wir besitzen eine reiche Auswahl gefüllt- und einfachblühender Sorten und erwähnen als beste die schönen einfachen: Rubin, fl. rubro, fl. albo, coelestis und totus albus 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—



Hibiscus syriacus.

Hydrangea quercifolia ist nicht neu, aber noch ziemlich selten. Der Strauch hat edles, eichenblattartig gezacktes Laub und blüht mit rötlich-weissen Rispen im Juli bis August. Besonders interessant macht die Pflanze der zimmetbraune wollige Ueberzug der jungen Triebe. Starke Pflanzen aus Töpfen: 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Kerria japonica fl. pl. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Koelreuteria paniculata, ist in der Jugend leider etwas empfindlich, gewährt aber namentlich in der Blütezeit im Schmucke seiner grossen endständigen gelben Blütenrispen einen prächtigen Anblick, wozu noch die zierliche Belaubung in hohem Maße beiträgt 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Laburnum vulgare, der gewöhnliche, bekannte Goldregen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Ligustrum ovalifolium 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

ovalifolium aureum elegantissimum. Eine vor einigen Jahren eingeführte Sorte, deren Schönheit Bewunderung erregt. Man denke sich die dichtgesetzten lederartigen Blätter des Liguster in prachtvoll leuchtender, goldbunter Färbung, die alle bisherigen Sort och die dichtgesetzten lederartigen bisherigen Sort och die über-. . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-(Siehe auch Halbhochstämme Seite 97-98.)

ianonicum tricolor 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— ", excelsum 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— vulgare 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Liriodendron tulipifera, der Tulpenbaum.

Verpflanzte starke Pyramiden: siehe Seite 94.

Lonicera Alberti, mit feinen hängenden Zweigen und rosa Blütchen, für Felsanlagen geeignet 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Ledebouri, Blüte rötlich gelb; die schwarzen Früchte sind von roten Deckblättern umgeben 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 tatarica alba 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 rosea 1 " " 0,40, 10 " " 3,50 virginalis grandiflora, mit grossen reinweissen Blüten. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Lonicera syringantha, neu, fein-zweigig,

dichtgedrängt mit syringenartigen Blütchen, die den vollen, süssen Duft der Hyazinthen haben. Reizend zur Vorpflanzung und auf Steinpartien.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Mahonia Aquifolium ist mit seinem immergrünen, glänzenden scharfgezähnten Laube ein immer gern gesehener Gartenschmuck, um so mehr, da er auch an allen Schattenstellen willkommene Verwendung findet. Blüten gelb; Beeren blaubereift . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

Morus alba (weissfrüchtige Maulbeere). 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

" aurea 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

" pendula, (Trauer-Maulbeere), deren lange Zweige mit grossem Laube glatt herunterhängen. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Starke verpflanzte Pyramiden siehe Seite 94.

Paulownia imperialis (Kaiserliche Paulownie).

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Pavia macrostachya (Strauch-Kastanie). Blüht im Sommer in grossen, weissen Rispen . . . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Philadelphus, Pfeifenstrauch (Jasmin).

Philadelphus coronarius (wohlriechender Pfeifenstrauch).

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" coronarius fol. aureis . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Philadelphus coronarius grandifl. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Philadelphus Lemoinei-Hybriden.

lst schon der liebe alte Jasmin unserer Gärten (Philadelphus coronarius) so erstaunlich reichblühend, so sind diese neuen Hybriden geradezu das Sinnbild der Verschwendung, wie untenstehende Abbildung zeigt.

Boule d'argent mit einer Fülle grosser, gefüllter weiss. Blüten. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Candelabre. Die Neuheit ist von einzigartiger Schönheit, niedrig und in der Blütezeit vollkommen überschüttet mit grossen, weiss. gewellten Blüten.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Conquête, Blumen gross, gefüllt, tulpenförmig, reichblühend. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Erectus, aufrecht wachsend, weiss blühend.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Fantaisie. Die langen Zweige dieser schönen Pflanze sind mit grossen, wohlriechenden flachen Blumen bedeckt, reinweiss mit zartrosa Mitte. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Manteau d'hermine.

Die ganze Pflanze ist mit einem milchweissen Blütenmantel völlig zuge= deckt von gefüllten und halbgefüllten Blumen. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,



Philadelphus Lemoinei-Hybride.

Mont blanc, kräftig aufrecht wachsend, reinweiss. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Pavillon blanc, starkwachsend mit grossen weissen Blumen. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Perle blanche 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Bouquet blanc.... Purpureo-maculatus Voie lactée

siehe Neuheiten Seite 100.

Zier=Aepfel.

Die zarte Schönheit der verschwenderischen Blütenfülle im Frühjahr und die grosse Zierde der gelben oder roten Aepfelchen im Spätsommer lassen die Zieräpfel zu den schönsten Schmucksträuchern gehören.

Pirus angustifolia flore pleno ist sehr reichblühend mit besonders grossen, hellrosa gefüllten, wohlriechenden Blumen. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

- baccata fructu luteo. Frucht gross, goldgelb.

 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- baccata floribunda atrosanguinea. Dieser Strauch zählt, wenn in Vollkommenheit, im Schmucke seiner zahllosen, leuchtend roten Blütenknospen zum schönsten, was uns der Garten bieten kann . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- Halliana (syn. P. Parkmannii). Zahlreiche Blüten, leuchtend rosa, halb gefüllt 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- Sargentii (ähnlich Pirus Toringo). Blüte reinweiss, Früchte gross, dunkelrot 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—
- Scheideckeri ist eine der schönsten Spiel-arten. Der Strauch ist überreich geschmückt mit den grossen, gefüllten, leuchtend roten Blüten, die mit den röschenartigen, dunkelroten Knospen gemischt stehen .1 St. M 1, -, 10 St. M 9,-
- spectabilis flore pleno, hellrosa gefüllt mit dunkelrosa Knospen 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
- Tenori carnea plena, hellrosa gefüllt. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- prunifolia fr. coccineo, scharlachfrüchtiger Wachsapfel, ist im Spätherbst eine grosse Zierde unserer Gärten. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-
- Zumi aus Japan, neu 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Populus (Pappel).

- alba nivea, echte Silberpappel 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- Bolleana, die Pyramiden-Silberpappel. i St. M 0,75, 10 St. M 6,-

in extra starken Pyramiden . 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,canadensis aurea, die Goldpappel.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

in extra starken Pyramiden . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Populus fastigiata, Italienische Pyramiden-Pappel, 2 m . . 1 St M 1,75, 10 St. M 16,-

Potentilla fruticosa 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Ptelea trifoliata, Hopfenstrauch . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4, aurea, mit herrlicher, sehr konstanter, goldgelber Belaubung, eignet sich ausnehmend als Solitärpflanze.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Prunus Padus, Traubenkirsche . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 " virginiana 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Zier=Pflaumen und Mandeln.

Prunus cerasifera purpurea (Pr. Pissardi) — Blutschönsten rotblättrigen Gehölze, das die dunkelblutrote Blattfärbung während des ganzen Sommers behält. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

cerasifera purpurea Moseri (Pr. Pissardi Moseri seri fl. pl.) ist eine neue Spielart von Pr. Pissardi mit der gleichen purpurroten Belaubung wie diese, aber mit rosa gefüllten Blüten 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

- Prunus sinensis fl. albo pl. Die weissgefüllte, japanische Strauchkirsche 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,
 - **fl. roseo pl.** folgt in der Blütezeit der Prunus triloba mit überreichlich blütengeschmückten Zweigen in dunkelrosa Farbe 1 St. \mathcal{M} 0,75, 10 St. \mathcal{M} 6,—
 - triloba fl. pl. (Ziermandel). Die gefüllte Mandel ist ein prachtvoller Blütenstrauch, dessen Zweige dicht mit rosagefüllten Blütchen wie mit kleinen Röschen bedeckt sind, ehe noch die Blätter austreiben . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeer.

Von diesem sehr dekorativ wirkenden Strauche, der sich zur Einzel- und Gruppenpflanzung sowohl als auch zur Zwischen-pflanzung zwischen Koniferen vorzüglich eignet und noch den Vorzug hat, auch im Schatten zu gedeihen, bieten wir starke, wiederholt verpflanzte Ballenpflanzen in verschiedener Grösse an. Die genauen Preise werden der Stärke und Schönheit der Einzelexemplare angemessen und sollen nachstehende Höhenangaben nur als Anhalt dienen:

Prunus Laurocerasus

VOI	1 40-50	cm	Höhe					. I	St.	M	1,	25	,	10	St.	M	10,
19	60 - 70	22	21				4							1	St.	M	1,75
21	80 - 90	91	11			٠								1	St.	22	2,50
	90-100	//	11											1	St.	77	3,
11	200-225	91	11	11.	20)()-	-2	225	CIII	Bi	ei	te	1	St	. A	10	-15
19	225 - 275	>>	"	"	1()()-]	150	11		22		1	St	. ,,	15	18

Laurocerasus Schipkaënsis

von 40-50 cm Höhe. . 1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—

Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Frangula, der gemeine Faulbaum.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Rhododendron-Hybriden.

Mit Knospen.

Durch ihre prächtigen Farben sind die Hybriden der Alpenrose sehr beliebt zu Gruppenpflanzungen. — In ungeschützter Lage tut man gut, sie mit Tannenreisig vor dem Erfrieren der Knospen zu hüten.

Starke Pflanzen . . 1 St. M 2,50-3,50, 10 St. M 20-30

Echte Alpenrosen.

Rhododendron ferrugineum, rostfarbige Alpenrose nach der Blattunterseite genannt, mit dunkelrosenroten Doldentrauben. 1 St. M 1,50-2,00

hirsutum. Almrausch, mit blassrosa Blüten. Beide Alpenrosen vorzüglich für Felspartien geeignet 1 St. 16 1,50-2,00

Rhodotypus kerrioides 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Rhus Cotinus, der Perückenstrauch 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

" atropurpureus, neu, mit blutroten Blüten.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

glabra laciniata, Abart mit fein geschlitzten, sehr zierlichen Blättern; sehr zu empfehlen zur Einzelpflanzung.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,typhina 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

" laciniata, siehe Neuheiten Seite 100.

Ribes alpinum, die Alpengoldtraube, ist ein vorzüglicher Strauch

- für schattige Lagen 1 St. \mathcal{M} 0,40, 10 St. \mathcal{M} 3,50 albidum, weisstraubig . . . 1 St. \mathcal{M} 0,50, 10 St. \mathcal{M} 4,—
- aureum, die echte Goldtraube 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 1 St. M 0,50, 10 St. M 4.-
- sanguineum. Die rotblühende Gold- oder Johannistraube ist mit ihrem Reichtum roter Blütentrauben ein immer beliebter Zierstrauch 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Zier-Gehölze.

Rubus deliciosus. Die Schönheit dieses Prachtstrauches ist bezaubernd, ist er doch im Mai mit grossen, 4-5 cm im Durchmesser haltenden Blumen dicht bedeckt. Er wird ungefähr $1^{1}/_{2}$ m hoch.

1 St. \mathcal{M} 0,80, 10 St. \mathcal{M} 7,—, 100 St. \mathcal{M} 60,—

Salix, Weide, siehe auch unter Trauerbäume Seite 96.

" alba vitellina (Gelbzweigige Dotterweide).

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

alba Britzensis (Blutrote Dotterweide), mit leuchtendrotem, einjährigem Holze.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

rosmarinifolia 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Sambucus (Holunder).

Sambucus nigra (Gemeiner Holunder) 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 nigra fol. luteis, goldgelb . . 1 St. M 0,50. 10 St. M 4,-

laciniata (Geschlitztblättriger Holunder)

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 variegata aurea . . .

pubens maxima (Riesenblumen - Holunder), August blühend mit 1/2 m grossen weissen Dolden. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Sambucus racemosa (Traubenholunder) 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 " plumosa 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Sambucus racemosa plumosa aurea (Goldgelbblättriger Holunder). Unter den bunten Gehölzen eines der besten. Die Blätter sind den ganzen Sommer über

goldgelb, treten daher vor und zwischen anderen Gehölzen stark hervor, sind aber nur für halbschattige Plätze geeignet, da sie in starker Sonne leicht ver-. . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,— 100 St. M 55,—

racemosa plumosa tenuifolia, neu, mit ganz fein geschlitztem farnähnlichen Laubwerk . . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Sorbus Aria lutescens. Blätter sind unterseits prachtvoll weissfilzig, in der Jugend hellgelb gefärbt, Beeren orangerot. Ausserordentlich wüchsig . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,starke Pyramiden

Aria chrysophylla, mit goldgelber Belaubung.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

" quercifolia (Eichenblättrige Mehlbeere).

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Extra starke Pyramiden 1 St. M 2,-

aucuparia fol. luteis var. Sehr schöne gelbbunte Eberesche 1 St. M 0,75, 10 St. M 6, aucuparia moravica laciniata, neu! . . . 1 St. M 1,50

Spiraea (Spierstrauch).

Mit ihren mannigfaltigen Vertretern ist diese, in ihren Blütengaben so verschwenderische Gehölzart vom Frühjahr bis zum späten Sommer der Liebling in allen Gärten.



Spiraea arguta.

Im Frühjahr blühende Spiraeen.

Spiraea arguta, ein entzückend reichblühender Strauch für das erste Frühjahr. Er ist eine Kreuzung von Sp. multiflora und Thunbergi und seine Zweige sind im April weiss überschüttet . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,media (Syn. Sp. confusa). In der ganzen Erscheinung der vorigen ähnlich, übertrifft sie diese durch noch grösseren . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-Blütenreichtum . opulifolia (Schneeballblättrige Spiraea). 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 prunifolia fl. pl., die dichtgefüllten weissen Blütendolden blühen an allen Zweigen . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Spiraea Reevesi fl. pl. Diese zierlich feinblättrige, blaugrün belaubte Spiraea ist mit ihrem Reichtum weisser Blütendolden besonders schön, verlangt aber etwas geschützten Standort.

1 St. M 0,50. 10 St. M 4,—
thalictroides (Sp. hypericifolia truncata). Mit ihren langen Rispen grosser weisser Blüten, die von Mai bis Juni blühen, gehört sie zu den schönsten ihrer Gattung. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Thunbergi ist besonders früh- und reichblühend, weiss. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

van Houttei folgt in der Blüte der vorhergehenden Thunbergi und ihre zierlichen Zweige beugen sich unter ihrer schneeweissen Blütenlast . . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Im Sommer blühende Spiraeen.

Spiraea ariaefolia, blüht mit grossen Rispen cremeweisser Blumen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Billardi mit roten Blüten Bumalda, blisht mit rosafarb. Dolden. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 "Anthony Waterer". Die Blüten sind weit leuchtender als die der Stammart; eine Pflanze von ausserordentlicher Wirkung, die gar nicht genug empfohlen werden kann, da sie von Ende Juni bis Mitte August blüht und in ihrer gleichmässigen Fülle sich vorzüglich zur Gruppen-Anpflanzung 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Bumalda Walluf (G. & K.). Diese neue Spiraea Walluf ist ein Sport von Spiraea Bumalda Anthony Waterer, sie hat die guten Eigenschaften der letztgenannten Sorte, sie bleibt niedrig und von kompaktem Wuchs, blüht ausserordentlich reich und lang, ist anspruchslos in der Kultur und . 1 St. 1.-, 10 St. M 9,dabei völlig winterhart callosa mit rosafarbenen Dolden. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 alba ist bei ihrem langdauernden Blütenflor und dem niederen Wuchs sehr zu Randpflanzungen geeignet.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50


"rubra, rotblühend . . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

canescens (syn. Sp. argentea) . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Douglasi rosea, eine nordamerikanische Spiraea.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Stephanandra flexuosa. Sehr zierlicher, aus Japan eingeführter Strauch mit überhängenden Zweigen und zahlreichen kleinen weissen Blütchen Juni . . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—
Tanakae. Obwohl stärker im Wuchs und grösser in der Be-

laubung wirkt diese schöne Sorte doch gleich zierend wie die vorige, zeichnet sich aber vor dieser durch die metallisch glänzende braunrot. Herbstfärb. aus. Juni. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Syringen oder Flieder.



Fliederdolde.

Einfachblühende Syringen.

Syringa Emodi ist gedrungen wachsend und hat eine schöne grossblättrige, lederartige Belaubung. Die Blüten sind lilaweiss und erscheinen im Juni 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

, **Josikaea**, mit grossen lederartigen Blättern und violetten Blüten. 1 St. *M* 0,60, 10 St. *M* 5,—

Rothomagensis (chinensis), rot violett. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

" Saugeana, eine herrliche, leuchtend rote Abart der vorigen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

vulgaris "Andenken an Ludwig Späth", ist ein prachtvoller Flieder mit sehr grossen, dunkelpurpurroten Blütenrispen.

" Charles X., mit dichten, blauen Rispen.

" Congo, prächtig dunkelrot, grossrispig.

" de Marly alba grandiflora, mit prachtvollen, grossen, weissen Dolden, sehr zu empfehlen.

" Duchesse de Nemours, silbrig graublaue Blütendolden, ist eine der allerfrühestblühenden von wunderbar zarter Farbe.

"
"Hyazinthenflieder. Aus der allbekannten Andenken an L. Späth entstanden, zeigt diese schöne Neuheit leuchtend purpurlila Färbung mit hellblauer Mitte. In ihrer ganzen Brscheinung ist die mächtige Blüte einer Hyazinthe täuschend ähnlich. 1 jähr. Veredlungen 1 St. M 1,50, 2 jähr. 1 St. M 2,50

" L'oncle Tom, neu! Dunkelviolettpurpur . . . 1 St. M 1,25

" Marie Legraye, der schönste weisse Flieder, mächtige Blütendolden, leicht cremegefärbt und von köstlichem Wohlgeruch.

" Professor Sargent, dunkelviolett mit weissem Schlunde.

Volcan, dunkelrubinrot 1 St. M 1,25

Die genannten Syringa vulgaris-Varietäten kosten, wenn kein besonderer Preis angegeben ist: 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Gefülltblühende Syringen.

Arthur William Paul, die grosse Rispe ist dunkelweinrot, mit heller Unterseite der Petalen.

Belle de Nancy, grossblumig, glänzend seidenrosa mit weissem Schlund.

Charles Joly, dunkelweinrot.

Dr. MastersDie grossen Rispen sind fast 30 cm lang
von gefälligem, leichtem Bau. Farbe lila, nach der Mitte
zu heller.

Edouard André, sehr dicht gebaute Rispen, zart lila-rosa, Knospen dunkler, frühblühend 1 St. M 1,25

Jeanne d'Arc, grosse Dolden schneeweisser Blüten, Knospen grünlich-cremefarben, erinnert an Levkojenblüten, blüht sehr reich und gern 1 St. M 1,75 Jean Bart, lange, starkgefüllte Rispe, rosaviolett.

Léon Simon, glockige Blütenform, blassrote Knospe, lila-blaue Blume.

Mad. de Miller, gross, alabasterweiss.

Mad. Jules Finger, lilarosa mit dunkelrosa Knospen.

Mad. Lemoine. Mit grossen 25 cm langen Rispen dichtgefüllter reinweisser Blumen von ganz besonders köstlichem Wohlgeruch. Mad. Casimir Périer ist die schönste der weissgegefüllten Syringen mit grossen und breiten Rispen.

Marc Micheli. Gabelige Rispen mit kugelförmig gefüllten Blüten von sehr zarter, lila-azurblauer Farbe.

Mr. Maxime Cornu, grosse verästelte Rispen, Knospen dunkelrosafarben, Blüten hellilarosa.

Michel Buchner, pyramidale Rispen, stark gefüllt, blass lilafarben, eine der besten Sorten.

" Miss Ellen Wilmot. Grosse lockere Rispe schneeweisser rundgebauter Blüten 1 St. M 1,25

Président Carnot, blasslila mit weissem Schlund.

Président Grévy, mit mächtigen breiten Rispen grosser heliotropfarbener Blüten. Sehr zu empfehlen!

Président Loubet, grosse mächtige Rispen; von der rötlichlila Farbe der aufgeblühten Blumen heben sich die karminfarbenen Knospen scharf ab; dadurch wird eine besonders schöne Wirkung erzielt 1 St. M 1,75

Virginité. Eine der allerschönsten. Leicht gebaute Rispen, herrliche zartrosafarbene Blüten. Strauch schwachwüchsig. Waldeck=Rousseau, zart lilarosa, Mitte weiss . . 1 St. M 1,75

Zier-Gehölze.

Staphylea colchica ist ein sehr schöner Blütenstrauch mit grossen, reinweissen Blüten von starkem Wohlgeruch.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

" pinnata (Gemeine Pimpernuss). 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— Symphoricarpus Heyeri, mit rosafarbenen Blüten.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

- " orbiculatus (Korallenbeere), mit blassroten Blüten und roten Beeren 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- " racemosus (gemeine Schneebeere).

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

" fol. aur. varieg. (goldbuntblättrige Schneebeere), die mit ihrem bunten Laube sehr zierend wirkt.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Tamarix (Tamariske).



Tamarix hispida aestivalis (Spiraeen - Tamariske).

Jeder junge Zweig dieser überraschend hübschen neuen
Tamariske ist im Juli-August bis zur Hälfte seiner Länge
mit den langen Rispen lebhaft rosafarbener Blütchen in ganz
lockerer, zierlicher Anordnung geschmückt.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

gallica (Tamariske) ist in ihrer ganzen Erscheinung ein edelwirkendes Gehölz mit seinen anmutig gebogenen, langen Zweigen und dem langgestreckten, nadelartig feinen Laube. Im Juli endigen die Zweigspitzen dann in grossen, lockeren rosafarbenen Blütenrispen. Liebt Halbschatten und nicht zu trockenen Boden, auch etwas geschützte Lage.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

" Odessana mit graugrünem, zierlichem Laube und zartrosafarbenen Blüten 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Linden, siehe auch Hochstämme u. verpflanzte Gehölze Seite 94-96.

Tilia platyphyllos filicifolia. Sehr hübsche elegante Linde mit farnähnlich geschlitzten Blättern.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Extra starke, verpflanzte Pyramiden.

1 St. M 2,50, 10 St. M 24,-

Ulmen (*Rüster*). Siehe auch Hochstämme und verpflanzte Gehölze Seite 94 – 96.

Ulmus campestris "Louis van Houtte", die buntgefleckte Ulme von ausserordentlich kräftigem Wuchs, mit goldgelber, grünlich gefleckter Belaubung . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Extra starke, verpflanzte Pyramiden.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

, campestris Berardi, die zierliche Ulme, mit dünnen, zierlich überhängenden Zweigen und dunkelgrünen Blättern.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

- campestris medio argenteo-variegata ist eine prächtige, weissbunte Ulme, die auch in der Sonne die weissbunte Färbung vorzüglich hält. Noch selten und kaum verbreitet.

 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- montana atropurpurea. Die blutrote Ulme, schöne dunkelrotblättrige Rüster, sehr empfehlenswert.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Extra starke, verpflanzte Pyramiden.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

, mont.fastigiata (exonlensis) (Schottische Pyramiden-Rüster).

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

montana fastigiata Dampieri Wredei, eine prächtige, gedrungen wachsende Pyramiden-Ulme mit leuchtend goldgelbem Laube; extra! Eines der schönsten Gehölze zur Einzelpflanzung. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Extra starke, verpflanzte Pyramiden.

1 St. M 2,50

, effusa fol. varlegatis (buntblättrige Rüster).

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Extra starke, verpflanzte Pyramiden.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

Viburnum (Schneeball).

- Blättern und grossen Dolden weisser Blüten, die später rote und violette Beeren ansetzen. 1 St. M 0,45, 10 St. M 3,50
- " opulus, starkwachsend, gelblich-weisse Blütendolden und korallenrote Beeren 1 St. M 0,45, 10 St. M 3,50
- " opulus sterile (gemeiner Schneeball). Ende Mai bis Anfang Juni ist die schöne Zeit, wenn der Schneeball blüht, und jeder kennt und liebt ihn, den Strauch mit den vielen, grossen weissen Blütenballen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Siehe auch unter Halbhochstämmchen Seite 98.

Weigelien.

Die Weigelien blühen ausserordentlich reich in dem mannigfachsten Farbenspiel von weiss durch das zarteste Rosa bis zum dunkelsten Rot, alle gleich schön in ihrer Art, und einige derselben den ganzen Sommer hindurch remontierend. Der Strauch selbst ist anspruchslos und gedeiht in jedem kräftigen, gutgedüngten Boden in freier Lage vorzüglich.



Frühblühender Weigelien-Strauch.

Weigelia praecox-Hybriden.

In den letzten Jahren ist besonders der herrlichen, 3 bis 4 Wochen vor den übrigen Arten blühenden Varietät hortensis praecox die grösste, wohlverdiente Aufmerksamkeit zugewendet, und ist es gelungen, von dieser ungemein lieblichen, schon Mitte Mai blühenden Sorte mehrere gleich reichblühende Abarten zu züchten, deren Blütezeit noch einige Tage früher, oft schon gegen den 10. Mai eintritt.

Weigelia praecox, japanischer Herkunft, starkwüchsig.

Die Zweige sind als Blütenruten mit den glockenartigen

Blumen dicht bedeckt 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

praecox Bouquet rose.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Fleur de Mai, blüht in den ersten Tagen des Mai mit hellrosa Blumen.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Weigelia praecox Floréal, Blüten zartrosa mit lebhaft karmin im Schlunde . . . 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

praecox Le Printemps, mit zahlreichen, aufrechten Blütendolden, zart fleischfarbig rosa.

1 St. M 0,75, 10 St. M 6,-

Neuere Weigelien-Sorten.

Von den so zahlreichen neueren Abarten der schönen Weigelia hortensis haben wir nach jahrelanger, sorgfältiger Prüfung eine kleine Zahl der allerschönsten herausgegriffen und bieten dieselben nachstehend an:

Weigelia hortensis Abel Carrière, lebhaft rosakarmin mit grossem, gelbem Fleck im Schlunde, sehr schön.

- " hortensis Alwine Roemer, neu, innen violettrot, aussen dunkler rot, besonders schön und reichblühend.
- . " Anton Rathke, leuchtend rot.
- , " Conquête. Die ganz besonders grossen Blüten sind tiefrosa, ausserordentlich schön.
- " " Descartes ist die dunkelste aller Weigelien und extra schön; die Knospen sind fast schwarz.
- " Eva Rathke, ist besonders reichblühend und die Blumen sind von intensiv leuchtender, karmesinroter Farbe.
- " " Obergärtner R. Müller, ähnlich der vorigen, nur etwas stärker wachsend und tlefer in der Farbe.
- " Prauster Perle. Die mittelgrossen, milchweissen Blüten bilden mit den lebhaft karminrosa Knospen einen äusserst lieblichen Gegensatz und machen diese Sorte dadurch besonders empfehlenswert.
- " **rosea nana variegata,** schöne, weissbunte Belaubung. Blüten hellrosa, niedrig wachsender Strauch.

Diese obigen Weigelien kosten: 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Aeltere Weigelien-Sorten.

Chamaeleon, reichblühend, karmin mit hellrosa.

Candida, bis jetzt noch die beste und härteste der reinweissen Sorten.

Isoline, hellrosa.

La Perle, starkwüchsig, Blüte gross, milchweiss mit lichtrosa. Pavillon blanc, weiss mit fleischfarbigem Anflug. Van Houttei, rosa mit weiss.

Obige ältere Sorten kosten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Xanthoceras sorbifolia — selten! — zählt im Schmucke seiner grossen, weissen, am Grunde rötlichen Blütentrauben und seiner überaus zierenden Belaubung zu unseren edelsten Gehölzen. Blütezeit Mai-Juni. Er bedarf in harten Wintern einer leichten Deckung von Laub und Tannenreisig.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Schützet unsere heimischen Vögel!



Aus "Lebensbilder aus der Tierwelt" von H. Meerwarth, mit gütiger Erlaubnis des Verlegers R. Voigtländer, Leipzig.

Segen und Nutzen zu erhalten!

Eine freundliche Bitte

an unsere verehrte Kundschaft!

Der rastlosen bahnbrechenden Tätigkeit des Freiherrn von Berlepsch und der mächtig einsetzenden Bewegung für zielbewussten Naturschutz zum Segen für Landwirtschaft, Wein-, Obst- und Gartenbau verdanken wir das immer mehr sich ausbreitende Interesse für "Vogelschutz".

Wer in der Pflanze und ihrer Entwicklung und Pflege eine seiner schönsten Lebensfreuden findet, dem ist ja die Liebe auch zu seiner heimischen Vogelwelt eigentlich wie selbstverständlich und er sucht - nicht zu seinem Schaden - dieselbe mit allen verfügbaren Mitteln an seinen Garten zu fesseln. Er erreicht dieses durch Aushängen künstlicher Nistkästen, durch Vertilgen der natürlichen Feinde, sowie ganz besonders auch durch richtige Anpflanzung der passenden Gehölze.

Aber auch weiter ausserhalb seines gepflegten Gartens wird der richtige Vogelfreund immer neue Anregungen geben zur Bepflanzung von Oedländereien, die bisher unverwertet dalagen, mit solchen Gehölzen, die namentlich den insektenfressenden Vögeln sicheren Schutz und Nistgelegenheit bieten. Die erst seit kurzer Zeit bereits in diesem Sinne ausgeführten Anpflanzungen haben schon befriedigende Erfolge gezeitigt und laden dringend zur Nachlolge ein. Möge es gelingen, unserer deutschen Heimat eine seiner anmutigsten und schönsten Zierden zu eigenstem

Nachstehend aufgeführte Gehölze eignen sich besonders zur Anpflanzung für Vogelschutzanlagen, teils durch ihren dichten, charakteristischen Wuchs, teils durch die Früchte, die von vielen Vogelarten mit Begier aufgesucht werden.

Berberis vulgaris

" Thunbergi Carpinus Betulus Caragana-Arten Colutea arborescens Cornus=Arten Corylus Avellana Cotoneaster-Arten Crataegus-Arten Cydonia japonica Deutzia-Arten Elaeagnus angustifolia Evonymus europaeus

Forsythia=Arten Halimodendron Hippophaë rhamnoides Ligustrum Lonicera-Arten Mahonia aquifolium Philadelphus=Arten Pirus-Arten Prunus Padus " virginiana

Mahaleb Ribes alpinum

" aureum

Rubus=Arten

Rhamnus cathartica

" frangula

Rhodotypus kerrioides

Sambucus nigra und Abarten

" racemosa und Abarten

Sorbus=Arten

Spiraea-Arten

Staphylea pinnata

Symphoricarpus

Viburnum Lantana

" Opulus

Auch diverse dichtwachsende Koniferen!

Zier=Gehölze.

Zusammenstellungen von Gehölzen für Park- und Garten-Anlagen. (Nach unserer besten Auswahl.)

Zur Gruppenpflanzung

Sträucher (Deck= nnd Vorsträucher): Gewöhnliche Auswahl 10 st. M 3,50 In reicher Sortenwahl mit Namen (nach unserer Wahl) 100 " " 30,— In reicher Sortenwahl mit Namen (nach unserer Wahl) 100 " " 40,— Feinste Auswahl in edlen Blüten- und buntlaubigen Gehölzen 10 " " 5,50

Pyramiden und Halbstämmchen feiner Gehölze zu Einzelpflanzungen 10 " " 14,-

Koniferen (Nadelhölzer).

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt und werden mit festen Lehmboden-Ballen versandt, auch sind unsere Pflanzen durch trocken-windige Lage abgehärtet, während sie durch reichliche Bewässerung einen herrlichen Wuchs haben.

Die beste Pflanzzeit ist für den Herbst im August bis Oktober und für das Frühjahr

April bis Mai.

Abies, Weiss- oder Edeltanne.

(Siehe auch Picea.)	Abies (siehe auch Picea),	Höhe in cm	1 St.	10 St.
	amabilis	270—300 40—60	30,— 0,80	7,50
	" brachyphylla	250-300	30,—	_
A SW	" "	310-350	35,—	_
	" cephalonica	220—240 300—330	15,— 30,—	_
	" Douglasi	60-80	1,25	11,—
	,, ,, ,, ,, ,, ,,	80—100 100—120	1,50 2,—	14,—
	79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 7	180-200	5,—	18,—
	7, 7,	200-220	5,50	-
	" "Colorado" (Pseudo-	300—320 40—60	12,—	11,—
	tsuga) (Douglas-Tanne), dich-	60-80	1,50	14,—
	ter wachsend als Douglasi	80-100	2,—	18,—
	" Douglasi glauca (blaugrüne	100—120	2,50 1,75	22,— 16,—
	" Douglas-Tanne)	80-200	7,—	
	,,	200—220	8,—	_
	" concolor	280—300 50—60	12,—	27,50
	" "	60-80	4,—	35,—
	77 78	80—100 100—120	6,— 8,—	
	79 77	120—140	10,—	
	,, ,,	140—160	12,—	110
	,, ,,	160—180 180—200	15,— 17,50	140
	27 37	200—210	20,—	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	220—230	25,—	_
	" "	230—250 250—260	27,50 30,—	=
	,, ,, ,, ,, ,,	270—290	35,—	-
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	300-320	40,—	
	,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	320—340 340—360	45,— 48,—	_
	, , , , , , , , , , , , , , , ,	400 - 420	55,—	_
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	" " pendula	400 30—40	75,— 2,50	24,—
	27	50-60	4,50	42,50
	" " "	60-80	6,—	_
	" " "	80—100 100—120	8,— 11,—	100
	" " "	120—140	12,50	110
	27 29 39	150-160	15,—	140
	99 99 99	170—180 180—190	17,50 20,—	
A STATE OF THE STA	" " "	200-210	24,—	_
	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	220—240 250—270	27,50 35,—	_
Abies concolor violacea.	- 39 99 99 • • • • • • •	280—300		_
Abies (siehe auch Diges) Höhe 1 St. 10 St. Abie	,, ,, ,, ,, ,,	300—350	45,—	
in cm # ADIC	S Nordmanniana (Nordmannstanne)	200—220	20,—	_
" magnifica glauca	,,	230 — 240 250—275	22,50 25,—	_
" nobilis glauca	,,	280—300	30-35	_
", Nordmanniana (Nordmannstanne)	,	310—330	40,—	_
" "	,,	330 - 370 $370 - 400$	45,— 50,—	
, ,	" (140 cm breit)	80-90	10,—	_
" " · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	insapo (Spanische Weisstanne)	80—100 100—120	5,—	_
, , ,	,,	120—140	7,— 10,—	
" " " · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	150—160	12,—	_
" " 110—120 6,— — " 120—140 8,— — " " " " " " " " " " " " " " " " " "	31	170—180 180—200	15,— 17,50	
" " · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	200—220	20,—	_
" "	,,	230—250 280—300	25,— 35,—	_
" " · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

					Ko	nit
Abi	es (siehe a	uch Picea).		Höhe in cm	1 St	10 St.
29	subalpina			220-230	20,—	
**	umbilicata			30—40	2,—	18,—
"	n · ·	. /		40 - 50	2,50	22,50
"	,,			50-60	3,—	27,50
99	,,			60-80	4,—	37,50
99				80-100	6,—	57,50
29	"			300-320	30,—	_
99	"			320 - 350	35, —	
99	27	1-		350-400	40,	-
22	"			400-450	45,—	
29	Veitchii .			280 - 300	22,50	
22				300-330	25,—	
29	" .	Dannag	(Duchehau		20,	1
Dor F	Buchsbaum	gehört nicht	(Buchsbau unter die Ko	HHI) miferen wi	r führe	n ihn
DCIL			rgrünen Belaub			
			8	H he	1 St.	10 St.
				in cm	\mathcal{H}	.16
Buxu	s sempervi	rens		30-40	1,25	11,—
22	,,			40 - 50	1.50	14,—
29	,,			50—60	1,75	16,—
99	,,			70—80	2,50	_
"	99 • •			100—130	4-6	35-55
"	,,			1+0-160	79	_
"		enbäumcher			4,—	_
"	"		nit goldbunten	50-60	2,50	_
77	,,		Blättern	60-70	3,—	27,50
	_			70-80	4,—	37,50
99	27 27	,,		80—90	5,—	_
99	27 29	,,		90-100	6,—	
99	29 33	,,				
99	" "	,,	frocht Wucho	110-12	8,	
n	" Hands	worthin.au	ifrecht.Wuchs	30-50	1,50	14,—
99	77 29			50-70	2,—	18,—
"	27 29			70-80	3,	_
"	" "			80-100	4,—	_
17	" "			100—120	5,—	_
29	27 10			140 - 160	8,—	_
99		phylla, gro	ssblätterig .	30—40	2,	18,—
"	29 29			40-50	2,50	22,50
"	" "			50-60	3.50	32,50
"	יי יי			60-90	4,50	
				140-160	10,	
"	77 77			180-190	15,—	
Ced		der).		.,,	,	
- Cu		uci).		300 350	10	
"	atlantica			300-350	18,—	
,,	" glauca	1		60-80	5,—	_
99	29 29			110-130	7,—	-
29	27			130—140	8,—	_
99	" "			150—160	10,—	
,,,	22 77			160—170	11,—	-
"	" "			170—180	12,—	-
		us (Kop	f-Eibe).			
oop		dori) cr		100-120	7	
99	Fortunei.				7,—	
29	27	641-1-4	(Dodossan	140-160	10,—	
99	peduncul.	fastigiata		50 70	3,—	-
			koraiana)	70—90	4,50	-
22	pp 22			140—150	10,—	-
17	22 22			150—180	12,—	_
11	,, 11			180—200	15,—	-
CI		ania (I	honshaue	<i>y</i> .		
Cha	amaecy	jaris (Le	ebensbaum	- Cypres	ssc).	
	Lawsonian	a (Cupress	us Lawsoni)	50-70	0,80	1 —
**		a (Cupiess	134 (130111)	70—90	1,25	_
"	" "					
29	,,			300—320	14,—	
99	,			360-380	20,—	_
29	" albo-s	spica		50-70	1,50	-
22	n n			70—90	2,—	-
"	" "			90-110	2,50	-
"		i,blaugrün,p	yramidenförm.	100 - 120	3,—	27.50
	" "			120-130	4,-	37,50
27	" "			130-150	5,—	-
77	77 77			1.0	1	1



Chamaecyparis Lawsoniana filifera.

Cha	ama	necyparis	Höhe in cm	1 St.	10 St.
	Law	soniana aurea, tief goldgelb .	50 - 70	2,50	22,50
27		,	70-80	3,25	30,
27	"	,,	80-90	4,50	_
99	"		60-70	2,—	18,—
"	99	Bowleri pendula	70-80	2,50	22,50
77		,,	70-80	2,30	22,30
22	22	erecta viridis, hellgrüne kom-	40-60	1,-	_
,,		pakte Pyramiden	60-80	2,—	18,—
		filifera, selten	30-40	1,50	12,50
"	"	,	4050	2,—	18,
"	"	,,	50-60	2,50	22,50
"	"	,,	60-70	4,—	37,50
"	"	,	70-80	5,-	45,—
22	"	,	80-90	6,	55,—
99	11	,,	90—100	7,—	
17	***	,,	100—120	9,—	
99	19	,,	140—160	14,—	_
"	99	,,	160 - 180	16,—	-
		filiformis	230-250	12,—	_
>>	"		260-280	14,—	_
99	>>	,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	20 40	175	15
99	>>	" compacta, 40-50 cm breit	30-40	1,75	15,—
99	22	" " 50—60 cm breit	40—50	2,50	22,50
22	27	" erecta zeichnet sich durch	40-50	2,-	18,—
"	"	" gr. Winterhärte vor erecta	50-60	2,50	22,50
		virid. aus. Vorzüglich! .	60-70	3,	-
		" Fraseri	60-80	1,75	15,—
"	99	,,	80-100	2,25	20,—
"	"	,,	100-120	3,—	
22	"	,,	120 - 140	4,-	-
"	"	,,	140-170	6,-	
"	,,		180-200	7,50	_



Chamaecyparis obtusa gracilis aurea.

Ch		aecyparis	Höhe in cm		St.
22	Lav	vsoniana glauca	60-70	1	i,—
. 99	99	glauca	80-90	1 '	3,
72	99	39	100-120	3,25	_
27	"	,,	120 - 140	4,—	_
79	22	,,	140-160	-	_
99	- "	,,	160-180	6,—	
29	29	,,	180-200		-
79	"	,,	200 - 220		_
99	"	,	280-300	16,	
77	99	gracilis	140—180	1,000	- 1
79	22	intertexta	60—80		,— [
79	***	,,	100-120		,50
"	22	99	120—140		,50
22	79	" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140—160		,50
99	27	"	160—180	- ,	-
79	22	" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	180-200	- 7	-
22	"	,	200—220		-
99	22	29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	220—240	,	
22	29	minima glauca	240-280	15—18 -	_
72	"		20—30 30—40	3,— 27,	50
"	"	monumentalis nova	150—160	3,50	_
"	"	, , ,	160—180	7,—	_
"	"	77 99	220—230	12,—	
"	"	patula "	60—70	1,75 16,	
**	22	72	70-80	2,50 22,	
99	"	,,	80—90	3,—	_
99	"	,,	90-100	3,50 -	_
19	"	,,	100-110	4,50 42,	50
77	22	,,	110—120	5,50 52,	
99	22	,	120—130	6,50 62,	
79	29	pyramidalis	170—180	7,—	-
**	29	,,	180—190	8,- -	-
"	99	,		10, -	-
77	"	Rosenthali	170—180	6,	-
**	79	,,	200—230	8,— —	
19	22	,,		10,— —	-
מ	22	,,		12,— —	-
"	99	,,		16,— —	-
99	22	" · · · · · · · ·	300—320	20,— —	-

h	am	aecy	paris				Höhe	1 St.	10 St.
22				r Queen	m. silbe	r-	in cm 40—60	1,50	14,—
				weisser	Spitzer	1	60—80	2,—	18,—
99	" "	"					120-140		_
79	"	22					140-160	,	45,
79	77	79					160 - 180		55,—
"	"	"					180—200 200—220		-
22	"	"				11	220270	,	
"	22	99				. 3	350 - 370		_
"	12	Triun	nph voi	Boskoo	p, prach	t-	80-100	2,50	22,50
			volle bl	aue Forn	n		100 - 120	,	27,50
77	99	"					20-140	1	40,—
22	22	99					40—160		60,—
22	27 37	"					.70—190 200 – 220		85,—
22	79	versio	color				80-100	,	18,—
77	"	27				. 1	00-120		22,50
"	79	79				- 11	20-140	,	32,50
"	79	"					20—240		
"	"	"		14.			50—280 00—320		
,,	37	West	ermann	ii, zierl.	gelbbuni	F 3	40-50	20,—	9,—
19	99	22					50—60	1,50	12,50
,,	22	"					60—70	2,—	18,—
9	"	22	• • • •				70—80		22,50
,	29	"					80-100		27,50
,	22	"				11	00 - 120 $20 - 140$	1	32,50 42,50
,	"	"					40—160	6,50	
,	79	Wisse	lii				50-70	1 , 1	16,—
,	39	22				. '	70—90	2,50	22,50
•	22	>>				11 .	90—110		35,—
,	22	22				11	10130		45,—
,	nutk	aënsis		psis bore	ealis)	- 11	30—150 40—70	6,—	16,—
,	"					11	30 - 100	2,50	
,	"					- 11	00—120	3,—	******
,	37			;		11	30 - 150	4,—	_
	>>					11	50—170	6,-	_
	"					11 .	00 - 220 50 - 270	10,	_
	"	compa	cta .				10-50		18,—
	22	,,				1 6	60-80	3,50	_
	99	,,				11	30—100	5,—	
	29	29				11	0—120	6,50	-
	77	glauca					0 - 140 $0 - 60$	8-10	-
	"	" .					0-80		6,— 8,—
	29	" .				11	0-100		24,—
	99	29 '				10	0-120	3,—	_
	"	" .					0-150		5,—
	"	"					0-170	6,—	_
	?? 	"				111	0-200	8,—	
	"	" .				11 -	0-270	15,—	
	"	,, .					0-300	18,—	_
	"	,, ,				30	0-320	20,—	
		lutea .				11	0-60		-18
	99 99	"					$0 - 160 \mid 0 - 230 \mid$	5,—	
		pendul:	a				0-60	1,75	6,—
	"	,, ,					0-90	2-3	3 bis
	22	,, ,						4,50-5,50 2	7,50
	"	"						6,50-8	_
	"	"						10,—	_
0	btus.	a "Crin	psii,	 goldgelbe	voll-)—320)—50	18,—	2.50
	1			nterharte.	neuere)-60		2,50 7,50
	"	"					70		2,50
	"	,, .				70	-80	4,- 35	i,—
	72	79 *					-90	0,	
	" 0	racili	s aure	9			-100	6.—	_
	" ≥						—50 —60		3,—
))))		,, .				-80		,50 ,50
	"		,, .				-100		,50
	"	29 3	, .				-120	,	_


Chamaecyparis	Höhe	1 St.	10 St.
obtusa gracilis aurea nova	in cm 80—100	3,50	M
97 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9	110—120 120—140	5, - 8,—	_
" " nana aurea	40-50	2,	18,
" n "	50—60 60—70	3,— 4,—	27,50 37,50
, , , ,	70-80 80-90	5,— 6,—	47,50 57,50
gracilis, 20—25 cm breit	15-20	2,-	18,—
" " " 25—30 cm breit	20-30	3, — 4,50	27,50
" " breite Pflanzen	120-140	6,—	-
" " " " " · · · · · · · · · · · · · · ·	140—160 160 – 180		=
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	220 - 240	22,—	
Juniperus (Wacholder.)			
" chinensis Pfitzeriana, 40-50 cm breit	_	2,50	22,50
" 50—70 " " · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ :	3,— 3,50	27,50
" " arg. variegata	40—50	1,50	14,
'y 77 'y	50-60	2,— 2,75	18,— 25,—
" " pendula	60-80	2,— 2,50	18,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	80—100 100—120	3,—	22,50 27,50
" " aurea	30-60	1,50 bis2,50	-
" " "	69—80	3,50	_
" commun. hibernica, säulenförmiger Wacholder	80-100	4,50 1,75	16,—
" " " Sautemorninger Wacholder	70-80	2,— 2,50	18,—
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	80-90 90-100	3,—	22,50 27,50
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	110—130	4,50	_
" " " von Nord-China	70—90	2,25 1,25	20,—
,, ,,		1,75 2,—	15,— 18,—
" "	_	2,50	-
" "	_	3,—	18,—
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	=	2,50 3,—	22,50 27,50
Sabina tamariscifolia, zierlich, feinlaubig, blau-			
grün, kriechend wachsend, 20—30 cm breit	=	1,25 1,50	11,—
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	60-80	1,75	16,—
,, ,,	80-100	1,50	14,—
, , ,	120—140	3,—	-
" " elegantissima	60-80 80-100	2,50 3,50	22,50 32,50
, , <u>,</u> ,	100 - 120 80 - 100	4,50 2,25	-
glauca, stahlblau	100-120	3,—	20,
,, ,, ₁₇ ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	120—140 140—160	4,— 5,—	37,50
" " globosa	20—30 30—40	2,— 2,50	18,— 22,50
" " " "	40-50	3,—	27,50
_ " pendula	60 - 80 80—100		14,— 22,50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100—120 120—140		32,50
" " polymorpha	80—90 90—100	2,75	_
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	100-120	5,—	-
" " tripartita 40 50 cm breit	120—140	1.25	11,—
" " 50-60 " " 60-70		1,50	14,— 18,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	2,—	22,50
Larix (Lärche).			
europaea (nemeine Lärche)	100—120	1,—	9,—
,, ,,	120—150 160—190	1,25	10,—
"	200 - 250	2,50	22,50
,, ,,	260—300 310—350	4,—	27,50 35,—
" "	350—400 400—450	8,—	55,— 75,—
" " " lentolenis (ignanische Lärche)	600	20,—	22,50
	250-300	3,—	27,50
, ,	. 300350	4,—	35,—



Picea, Solitär-Pflanze.

			-
Libocedrus (Kaliforn. Fluss-Zeder).	Höhe in cm	1 St.	10 St.
decurrens	240-300	15-20	_
,,	210 000		
		1	
Picea (Fichte, Rottanne)			
,		10	
" alb a	270-300	10,	mentura
" Engelmannii	50-60	2,	18,
,, ,,	70-80	2,50	22,50
	80-100	3,50	32,50
,, ,,	100-120	5,	
., ,,	120-140	7,—	
" " glauca	50-60	2,50	22,50
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	70-80	3,50	32,50
,,	80-100	5,—	100 c p.00
,, ,,	120-140	7,	-
" excelsa 100 St. % 50,—	40-60	0,75	6,
", ", ", · · · · · · · · · · · · · · · ·	60-80	1,—	9,
aurea	80-100	3,—	27,50
79 99 99	100-120	4,—	32,50
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	130-150	5,—	45,—
, , ,	150-170	6,—	
, , ,	170—190	7,—	
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	190-210	8,—	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	210—250	9-10	
" " Clanbrasiliana	20-30	1,50	12,50
,, ,, ,,	40-50	2,50	22,50
,, ,, ,,	50-60	3,50	
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	60-70	6,—	
, , , ,	7080	7,—	_
, , ,	80—90	8,	-
" Gregoryana 40-50 cm breit	30-40	4,—	
" " "	50-60	5,—	-
" " 50—60 cm breit	50—60 70—80	6,	
" " " 70 cm besit	80-90	7,—	
" " "	90—100	10.—	

Picea	Höhe in cm	1 St.	10 St.	Picea	Höhe in cm	1 St.	10 St.
" excelsa inversa, die Trauerfichte mit glatt am Stamm	80-90	2,50	_	" pungens argentaea	260-280		_
herunterhängenden Zweigen	90—100 140—160	3,—	_	" " Kosteri, die leuchtendste Form der	380—400 40—50	85,—	47,50
" " " "	230 - 250	12,—	_	" " Silber-Blautanne	50 -60 60 -70	6,-	57,50 77,50
49 99 49 49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	280—300 300—320		=	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	7080	10,	97,50
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	340-350	25,—	_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	80—100 100—120		=
" Maxwelli, niedr. krausstachelsp " " "	20—30	2.—	18,	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	1 0—140 140—160		=
60 cm br.	40 50	4,50 8,	_	" " " " "	160 - 180	35,—	
" " " 80—90 cm br. 150 cm br.	40—50	15,—		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	180 200	40,-	-
" " pygmaea	20-30	1,50	12,50	Pinus (Kiefer).			
n n	30—40 40—50	2,—	18,—		(0 00	1.25	1.1
" " extra breite Pflanzen	60-80	7,50	_	" Laricio austriaca (Schwarzkiefer) 100 St. M 100,—	60-80 80-100		11,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	90-100	10,—	-	", ", ", 200,— ", ", ", 250,—	100-120	2,50	22,50 27,50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	100—110 110—120	14,-	=	, , ,	140—160 160—180	4,	37,50 47,50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	120—150 170—180			" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	180-200	6,-	57,50
" Remonti	30-40	2,—	18,—	" excelsa (Tränenkiefer) 100St.M160.	200—250 60—80	8-10	18,—
" " " " " " · · · · · · · · · · · · · ·	40 50 60—70	2,50 3,50	22,50	, , ,	80-100		27,50
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	70-80	4,25	-	", ",	100—120 120—140		37,50 47,50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	80—90 90—100	5,—	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	140160 160180		55,-
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	100—120	1	_	, ,	180-200	8,—	70,—
" virgata (Schlangen- oder Rutenfichte)	100 - 120 $120 - 140$		27.50 37,50	, , ,	200—220 220—240	12,—	=
" " " "	130—140	1	_	9 9	250—270 350—400		=
17 19	140—160 160—180	10,—	-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	500 40—50	30,—	14,—
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	60-80	12,-		montana (Mughus, Knieholzkiefer), 40-60 cm breit	60-70	2,	18,—
" " Doumetti	80-100		_	Stephus (W. manthabiafan)	70-80	2,50	22,50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100—120 170—180		=	" Strobus (Weymouthskiefer)	80-100	2,25	20,—
" " Mariana. Wundervolle kegelförmige Konifere	4060	3,-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100-120		32,50 42,50
mit dichter Bezweigung und blaugrünen	60-80 80-100	5,-	_	glauca	50-60	1,50	14,—
Nadeln	180 -200		1 -	n ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , ,	60—80 100—120	2,—	18,—
" Omorica	5060	2,	18,—				
" " "	80-100		22,50	Taxus (Eibe).	1		
	200—220 220—230		=	" baccata (gew. Eibe), eine sehr wertvolle dunkel-	1		
,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	300—330 400—420	27,50	_	" laubige Konifere . Pflanzen (100 St. # 70,- 100 , , 80,-	30-40 $40-50$	0,80	7,50
orientalia :	20 50	4	12,50	" " Hecken 100 " 100,-	50-60	1,25	11,—
orientalis ist eine sehr zierliche Fichte mit glän- zend grünen, dünn- und feinzweigigen Ästen	50-70	2,-	18,—	" " 170,-	70—80	2,—	18,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	70-90 90-10	3,—	22,50 27,50		80 -90 90 -100		22,50 27,50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	110—120 130—150		37,50	", ", breite, dichtgebaute Pflanzen	90-100		_
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	150 - 170	0 9,-	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	130-140	7,50	70,— 90,—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	250-27	0 30,-	=	9 9	160-180	0 12,-	-
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	$\begin{vmatrix} 270 - 30 \\ 300 - 32 \end{vmatrix}$		=	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	180—200 200—220		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	340—36	0 40,-	_	" "		18,	10
, polita, aus Japan stammend, mit sehr starken, dicker			37,50 45,—	" " adpressa	20 40 40 60		18,— 32,50
,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 100-12	0 6,—	-	" " aureo=variegata	. 30-40		14,-
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 140-16	0 10,-	_	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	. 40—50 . 50—60		18,— 22,50
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,			=	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 60—70 . 70 – 80		27,50 35,—
. , ,	. 190-21		-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	80-90 90 - 10	5,	45,— 55,—
" pungens, eine sehr schöne Tanne mit steif ab-	40-50	1,25	10,	11 13 N 13 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 100-11	0 7,-	60,—
stehenden Nadeln				,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	. 110—13 . 130—15		70,—
,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 90-11	0 3,25		,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	. 150—17		-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	. 200—22 . 220—24	0 12,-	=	" " erecta	. 30-40 - 40-50		9,-
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 240-26 . 260-28				50-60 60-70	1,50	12,50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 280-30	0 20,-		" " " 100 ", 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170	70-80	2,50	
,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,				" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 80—90 . 90—10		27.50
" " argentea (Silber-Blautanne) ist eine de				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 100-11	0 4,-	35,—
schönsten Tannen mit leuchtend blauweisser Trieben, sie hält die strengsten Winter ohn	e 60—70	7,-	67,50	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 120-13	6,-	45,—
Schutz aus		9-1 00 $12,-$	10	9 9 9	. 140-15	8,—	60,—
n n n n		20 15-	18 —))	. 150-16	0 10,—	_
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	. 150-17	70 25,-	- / -	" " " "	. 180-20	00 15,-	-
" " " " " · · · · · · · · · · · · · · ·	. 180-20	$\begin{array}{c c} 00 & 30 - \\ 20 & 35, - \\ \end{array}$. 230 -25		=
91 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9				160—180 cm b	120	15,-	
19 19 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	. 320-2			", ", ",	r. 120 180—19	0 25	



Taxus bacc. fastigiata aurea, goldbunter Säulen-Taxus.

																					1			
Ta	37446	· (F	Tib.	60																		Höhe	1 St.	10 St.
1 a	xus) (T	יטוב	C	۰																	gin cing	.16	16
	h = a a	-4-	600	410		+0		10	10	,		7		- 1								10 50	1 50	1.4
19	bacc	ata	las	LIE	lá	lla		(3)	au	lei	7	ıa.	хи	S)	٠	٠		٠	٠	٠		40-50	1,50	14,—
23	22	19							٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠		٠				50-60	2,	18,—
99	39	, 29					٠			٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠		60-70	2,50	22,50
19	19	99						٠		٠	٠	٠	٠		٠.	٠			٠	٠		70-80	3,—	27,50
12	12	,,,																	٠			80-90	3,50	32,—
11	12	99													٠	٠	٠					90-100	4,—	35,
22	99	11																				100-110		45,
22	99	11																				110-120	6,	_
n	"	11																				120-130	7,—	-
11	12	"																				130 - 140	8,—	-
"	"	19																				150-200	9-16	- 1
	"	"																				220-230	18,	-
19	"	"																				230-240	20,-	
**	"	19																						
22	,,,	"	nov	va,	- 11	vint	eri	rai	rt			٠							٠	٠	٠	50-60	2,—	18,—
29	22	22	99																	٠		t0 - 70	2,50	
22	11	22	19																			70-80	3,—	27,50
•9	**	22	39																			8090	3,50	
			2110			,					0	**		- 7								40 50	1.50	
"	***	99	aur	C	1	(go	lat)UI	ue	r	30	2111	еп	- 1	an	сиз	SI		٠	٠	٠	40-50		_
19	1)	33		٠						٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		50-t-0	2,—	
19	29	99								٠			٠					٠				70-90	3,50	_
79	w	22																				90-100	4,50	
22	22	99												٠			٠					100-120	5,50	-

Taxus (Eibe).	Höhe in cm	1 St.	10 St.
" baccata fastigiata aurea	120-130	7,—	
99 99 99 19	130—140	8 50 10,—	_
n ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	150—160 160—170	15,— 16,—	
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	210—230	27,50	-
" semper aurea goldgelb, dichtzweigig	50-70	4-5	
1) 9) 1) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70—90 90—100	6,50 - 8	
" " "	100 - 110 $110 - 130$		
" " Washingtoni	40-50	2.50	22,50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	50-60	3,	27,50
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	80-90	4,—	35,—
,, ,, ,,	90 - 120 130150	6-7	
bacc. Washingtoni 240 cm breit	120	30,—	_
n n ,	170 170	30,— 40,—	_
" " Dovastoni	20-40	2,—	no. 0
,, ,, ,,	40 60 60 - 80	3,	_
y y y y	120-140	4,— 10.—	_
" " " 210 cm breit	140—160 190	12,—	_
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,			
Thuya (Lebensbaum).			
	10 00	1 75	1/
" gigantea, von kräftigem Wuchse	40—90 80—100	1,75	16,—
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	100-120	2,50	22,50
99 99 98 19 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120—140 140—160	3,— 4,—	27,50 35,—
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	160—170 280—300	5,— 18,—	=
" " aurescens	80-100	2.—	18,—
" " " "	100-120	2,50	22,50
" occidentalis(Abendländ, Lebensbaum) 100 St. M 80,— " " 100,— Pflanzen für " " " 100,—	60—80 80—100	1,—	9,— 11,—
" " Hecken geeignet! " " "130,-	100-120	1.50	14,
"	120—140 180—200	1,75 2,75	16,— 26,—
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	280—350 380—400	7.50-10 15,—	=
" aurea, prachty, goldgelbe Spielart 100 St. M 80 —	4060	1,—	9.—
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	60—80 80—100	1,25 1,75	11,— 16,—
", ",	110—130 130—180	3,-	27,50 35—45
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	180-200	6,-	55,—
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	200—220 220—240	8,—	_
, , ,	240 — 260 260 — 280		_
" " Bodmerii	40-60	1,	_
9 99 99	60—80 140—160	1,50	! =
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	160-180	5,50	=
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	180-200		11
" " Columbia	60—80 80—100		11,—
" " "	100—120		24,—
" " elegantissima	300-320		0
" " Ellwangeriana 100 St. M 80,— " " " " , 100,—	5060	1,-	9, 11,
" " " extra breite Exemplare	210-230 240-250	6,-	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	250—270 300—330	8,	=
" " Rheingold	30-40	2.—	18,
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	40—50 50—60	2,50	22,50 27,50
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	60-70	4,	35,-
" " fastigiata	70-80 210-230	5,-	-
, , , ,	240-260	8,—	=
, ,, ,,	260—280 '80—300	10,-	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	300 - 330		9,-
" Froebell, Zwergform	20—30 30—40	1,—	7,
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	40-60	3,-	
" globosa Viridis, rund kugelige Form	-	1,50	
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,		2,—	-
" " " · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	5,	-

	Höhe	1 St.	10 St.	Tours (Hamlockstanne) Höhe 1 St. # 10 St. #
Thuya	in cm	.16	.46	Tsuga (Hemlockstanne), Flore in cm 1 St. A 10 St. A
" occidentalis Hoveyi,	20 - 30 30 - 40 130 - 150 150 - 170 180 - 200	0,60 0,80 3,— 4,— 5,—	5,— 7,— 27,50 —	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
" pendula, mit straff herunterhängenden Trauer- zweigen " pumila	170—180 220—250		9,— 12,50	" " 180—200 6,— 200—220 7,— 230—250 8,— 240—250 27,50 —
" " "		2,—	18,	Thuyopsis (Hiba-Lebensbaum).
" " recurva nana 15—20 cm breit 20—30 cm breit 30—40 cm breit 30—40 cm breit recurvata	25 25 20—30 130—150 150—170 60—70 80—100 100—120		14,— 18,— — — — 22,50 35,—	
Wareana, cine schr kurzgedrungene Pyramidenform mit dunkelgrüner Belaubung	80—100 120—140 180—200 240—260 260—320 80—100 130—140 140—150 150—190 200—220	2,50 5,50 8,50 9-12 2,- 3,-	14,— 22,50 50,— — — 18,— — —	gigantea, in Drahtkörben

Koniferen (Nadelhölzer).

Prachtvolle, mehrmals verpflanzte Ware.

Wie bei den Stauden und Ziersträuchern, so setzen wir auch bei den Koniferen Auswahlen zusammen nach unserer Wahl und bemerken ausdrücklich, dass wir darin nur gut entwickelte, kräftige Exemplare liefern.

Auswahl zu Gruppenpflanzungen

in guter Sortenwahl:

50-80 cm hoch .								25	99	22	12,— 27,50 100,—
80—150 cm hoch								25	99	22	22,50 55,— 200,—

Beste Auswahl zu Gruppen

mit wenigstens 1/	5 feinster	Konifere	n zur	Einzelpf	ilanzung.
50-80 cm hoch				10	St. M 18,-
					" " 40,—
00 150 1 1				100	" " 150,—
80—150 cm hoch .				10	" " 30,—
					" " 70,— " " 270,—
150-200 cm hoch .					
200 cm noch .					, , 125,—
					" " 450,—
Desgl. in gemischter	Grösse v.	50-150	cm h		
				25	,, 57,50
				100	225,—

5 wertvolle, winterharte Koniferen in ausgesuchten Exemplaren zur Einzelpflanzung in 5 Sorten, 50-150 cm hoch, M. 30,-

Sämtliches Bildmaterial ist unsern eigenen Kulturen entnommen.

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die von Ihnen bezogenen und in hiesigen Anlagen gepflanzten Koniferen in bezug auf Form, Färbung und Wuchs meinen steten Beifall fanden. Nicht nur diese genannten Vorzüge derselben, sondern die Widerstandsfähigkeit und die kräftige Ballenbildung der von Ihnen bezogenen Koniferen trugen zum schnelleren Anwachsen ein Bedeutendes bei, und hatte ich auch bei grösseren und älteren Pflanzen bei der Anpflanzung fast keinen Ausfall zu verzeichnen.

Hochachtend Schröder, Städt. Gartendirektor.

Rosen.

Eine Auswahl bestbewährter Sorten.

Line Auswani besi	covamiter sortem					
Tee= und Teehybriden.	Tee- und Teehybriden (Fortsetzung).					
Weiss:	Rot:					
TH Kaiserin Auguste Viktoria.	T Blumenschmidt.					
TH Mad. Jos. Combet.	TH Dean Hole. 1 St. M 2,—					
	TH Etoile de France. TH Friedrichsruh.					
Gelb und Orange:	TH Gruss an Teplitz.					
T Belle Lyonnaise.	TH Johanna Sebus.					
* TH Betty TH Edu Mayer.	TH Reine Marie Henriette.					
TH Franz Deegen.	TH Richmond.					
T Franziska Krüger.	Remontant=Rosen.					
T Gloire de Dijon.	Remontant = Rosen.					
TH Goldelse. TH Gustav Regis.	Weiss:					
TH Hofgartendirektor Gräbner.	Frau Karl Druschki.					
T Mad. Bérard.	_					
T " Julius Graveraux. TH " Ravary	Rosa:					
T Perle des Jardins.	Captain Christy, Mad. Gabriel Luizet.					
1 Telle des barants	Mrs. John Laing.					
Rosa:						
TH Belle Siebrecht.	Rot:					
TH Farbenkönigin.	Alfred Colomb. General Jacqueminot.					
T Grace Darling.	Jean Liabaud.					
TH Gustav Grünerwald TH Königin Carola	Mad. Victor Verdier.					
TH Kronprinzessin Cecilie	Marie Baumann.					
TH La France.	Oberhofgärtner Singer.					
TH La Tosca.	Rote Captain Christy. Ulrich Brunner fils.					
TH Lohengrin. TH Lyon Rose. 1 St. M 2,—						
TH Mad. Abel Chatenay.	Dunkelrot:					
TH Caroline Testout.	Baron de Bonstetten.					
7H " Edmée Metz. TH " Jules Grolez.	Eugène Fürst. Fisher & Holmes.					
TH ", Jules Groiez. TH Oberbürgermeister Dr. Tröndlin.	Prince Camille de Rohan.					
TH Pharisäer.	Princesse de Béarn.					
TH Prince de Bulgarie.	Ruhm der Gartenwelt.					
TH Souvenir de Président Carnot.	Van Houtte.					
D A Too	d Taskyhuidan					
Remontant, Tee	und Teehybriden.					
Hochstämme von 0,90-1,20 m Höhe	1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—					
,, 1,20—1,50 ,, ,,						
manustamme ,, 0,00-0,90 ,, ,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Tuation	440.004					
	rrosen.					
Hohe Hochstämme mit rankenden Trieben, die auch zu	gleich in Schirmform gezogen werden können in Sorten:					
Maréchal Niel, Crimson Rambler, Lady Gay, Tausendschön. 1 St. M 2,50, 10 St. M 24,—						
Zusammenstellungen von Rosen-Hochstämmen.						
Die Auswahlen sind aus den besten Sorten von Remontant-, Tee- und Tee-Hybriden zusammengestellt.						
Hachetämme in 12 Serton						
25						
50						
Unsere Rosen-Hochstämme sind vorzüglich bewurzelte,	gesunde Stämme mit kräftigen Kronen in einer Ausiese					
bestbewährter Sorten.						

Niedere Remontant=Rosen 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Niedere Tee=Rosen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,-

25 50

Niedere Tee=Hybriden

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,—

Schlingrosen-Neuheiten.



Schlingrosen-Laubengang aus unseren Anlagen.

Neuheiten für 1911.

"Sodenia" (Wichuraiana). Diese üppig wachsende Schlingrosen-Neuheit bringt locker gestellte Dolden rein Odenia (Wichuralana). leuchtend karmin- bis scharlachroter Blumen, eine Farbe, wie sie noch nicht unter den Wichuralana-Sorten vertreten ist. Abgeschnittene Blumen halten die Farbe acht Tage ohne sie zu ver-

Casimir Moullé. In Trauben von 20–50 Blumen mittlerer Grösse zusammenstehend, sind diese gut gefüllt und zeigen lebhaft purpurrosa Färbung. Die Rückseite der Petalen ist silbrigrosa.

Obige 3 Sorten kosten: 1 St. M 1.50, 10 St. M 14,—

Schlingrosen-Neuheiten von 1910.

American Pillar. Die einfachen 6–10 cm im Durchmesser haltenden Blumen bilden mächtige Sträusse von herrlich zartrosa Färbung mit gelben Staubfäden. Sehr hart und reichblühend 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—
Coquina. Blüte einfach, zartes Porzellanrosa mit gelben Staubf. | Newport Fairy. | Aehnlich der bekannten schönen Sorte

Coquina. Blüte einfach, zartes Porzellanrosa mit gelben Staubf.

Désiré Bergéra. Starkwachsend und reichblühend. Die gut gefüllten mittelgrossen Blumen sind von schön kupferrosa Farbe. Inneres hellkupferrot. Ganz neue Farbe unter den Schlingrosen.

Frl. Octavia Hesse. Starkwüchsiger Strauch, Jahrestriebe bis 3 m lang. Blütezeit Juni-August. Blumen für die Wichuraiana-Klasse gross, weisslichgelb mit dunkelgelber spitzer Mitte.

"Leuchtstern", jedoch noch edler. Aehnlich der bekannten Crimson

Queen Alexandra. Seagull. In überschwenglicher Fülle bedecken die reinweissen Blüten, gehoben durch die leuchtend goldgelben Staubfäden. die starken Jahrestriebe, für den herrschenden Geschmack am natürlich Einfachen, eine besonders empfehlenswerte Sorte. Obige 6 Sorten: 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-

Dauernd blühende Kletter- u. Halb-Kletterrosen (Neuheiten v. 1910).

Exzellenz Kuntze. An den langen biegsamen Trieben bilden sich ganze Büschel kleiner gefüllter rahm- bis schwefelgelber Blüten. Knospe chromgelb, rund, gut remontierend und duftend.

Exzellenz von Schubert. Blumen von der Grösse und dem Bau der Gloire des Polyanthas, dunkelkarminrosa, gut gefüllt, zu 5-20 in dichten Trauben am Ende jedes Triebes.

Geheimrat Dr. Mittweg. Die grossen, locker gestellten, aufrechten und rundgebauten Trauben sind dichtgefüllt, polyanthaartig; Blumen rosarot mit gelber Mitte.

Kommerzienrat W. Rautenstrauch. Der von Juni bis November blühende, starkwachsende Strauch bringt Blumen, polyanthaähnlich zart lachsrosa, Mitte hellgelb.

Obige 4 Sorten kosten: 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Schlingrosen.

Schlingrosen von 1907 und 1908.

Delight. Die karmesinfarbenen Blumen sind weiss am Grunde. Diabolo. Die schwärzlich purpur- und feuerroten Blumen sind halbgefüllt in grossen Trauben blühend.
Evangeline (Wichur). Blüht in grossen Trauben einfach zart pfirsich-

rosa mit weissem Grunde über bronzefarbenem Laub.

Goldfinch. Mit dunkelgelben Knospen, in der halbgefüllten Blume in orange übergehend, die gelben Staubfäden zeigend.

Remontierende immerblühende Crimson Rambler. Eine hervorragende Säulen- und Spalierrose. Blüht so reich und andauernd wie Mme. Norbert Levavasseur, treibt aber höher und wird buschiger.

Snowstorm. Busch halbrankend, blüht während des Sommers bis Herbst beständig. Die reinweissen Blumen erscheinen in dichten Büscheln und bedecken zuweilen die ganze Pflanze.

Veilchenblau. Die Blumen erscheinen in grossen Dolden, halbgefüllt, im Aufblühen teils rötlichlila, teils rosalila, dann in Amethyst übergehend und im Verblühen stahlblau auf glänzend grünem Laube.

White Dorothy. Reinweisser Sport der berühmten Rankrose Dorothy Perkins.

Obige Sorten kosten: 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Drei hervorragende einfachblühende Schlingrosen.

Wir machen hiermit besonders auf diese drei einfachblühenden Schlingrosen aufmerksam. Sie sind ausserordentlich reichblühend und gewähren zur Zeit der Blüte einen herrlichen Anblick, wenn die goldgelben Staubfäden aus den einfachen Schalenblüten herausleuchten. Für die heutige Geschmacksrichtung wie geschaffen.

Carmine Pillar. Leuchtend karminrot.

Joseph Billard. Der goldgelbe Mittelstern wird von einer karminroten Schale umgeben.

Yersey Beauty. Die lichtgelben einfachen Blumen stehen in grossen lockeren Trauben und sind stark duftend.

Vorstehende 3 Sorten: 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Aeltere bewährte Schlingrosen.

Alberic Barbier. Halbgefüllt, milchweiss mit gelber Mitte. Alexandre Trimoullet. Gefüllt, weiss mit leicht rosa und lachs-

farbig in der Mitte.

Alice Garnier (Wichur). Frischrosa mit hellgelb.

Augenschein. Milchweiss, stark duftend, von sehr starkem Wuchs.

Crimson Rambler. Die bekannte reichblühende dichtgefüllt karmesinrote Sorte.

Dorothy Perkins. Grosse Dolden gefüllter, rein rosafarbener Blumen überschütten die Pflanze.

Lady Gay. Ist eine prächtige Ergänzung zu "Dorothy Perkins", noch grossblütiger und schärfer in rosa als letztere.

Edmond Proust. Fleischfarbigrosa mit kupfriger Mitte.

Ferdinand Roussel. Gefüllt, weinrot.

Gerbe rose. Schalenförmig gefüllt, von schöner rosa Farbe.

Hiawatha. Karmesinrote einfache Blüten mit weissem Mittelring und goldenem Staubfädenbündel.

La Perle. Milchweiss gefüllt, von regelmässiger Form.

Leontine Gervais. Gefüllt, karmin- und lachsrot mit lebhaft gelber Mitte.

Minnehaha. Dunkelrosa, grossblumig, kräftige Dolden bildend. Mrs. F. W. Flight. Rosa, halbgefüllt, die Blüten zu grossen Dolden vereinigt.

René André. Goldgelb mit orange gestreift.

Rubin. Blumen grösser als Crimson Rambler, leuchtend rubinrot. Stella. Einfach karminrot.

Tausendschön. Lockere Dolden sehr grosser balsaminenartiger Blüten von zartrosa in karminrosa übergehend.

The Farquhar Rose. Lachsrosa in weiss übergehend.

Obige Sorten kosten: 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Neue Polyantha=Rosen für 1911 und von 1910.

Erna Teschendorff. Eine prächtige neue Rose; das beste und schönste, was bis jetzt in leuchtend roten Polyantha-Rosen existiert. Die Farbe ist leuchtend karmoisinrot und infolge ihrer Schärfe ausserordentlich wirkungsvoll. Erna Teschendorff — ein Sport von Mad. Norb. Levavasseur — besitzt dieselben guten Eigenschaften, wie kräftigen Wuchs, gesundes Laub und Reichblütigkeit. Nur 40-50 cm hoch werdend, eignet sich diese Neuheit vorzüglich für Gruppen Kräftige Landpflanzen 1 St. M 5,-, 10 St. M 37,50 und zur Einfassung.

Atropurpurea. Ebenso stark wachsend wie Mme. Norb. Levavasseur, von gleichem Laubwerk und gleicher Blütezeit. Farbe: tief purpurrot 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Eilleen Low. Im Wuchse wie die vorige, zeigt diese Neuheit die überreiche Blühwilligkeit der vorjährigen Orléans-Rose. Farbe: chinesisch-rosa, am Grunde der Petalen cremeweiss 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Yvonne Rabier. Blüht in grossen Trauben von guter Haltung, Blüte: reinweiss mit leichtem schwefelgelben Anflug. Völlig winterhart, mit leuchtend grünem Blattwerk.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Jessie. Ueber dem saftiggrünen Laub, das völlig mehltaufrei ist, stehen in lockeren Trauben die glänzend kirschzinnoberroten Blumen. Der Blütenflor dauert von Juni ab bis Frost eintritt. Die Pflanze wird kaum 40 cm hoch.

Jeanne d'Arc. Die Blühwilligkeit ist die gleiche wie bei Mad. Levavasseur; die Blumen sind rein milchweiss.

Orléans Rose. Die ungemein reichblühende Rose hat die Haltung der bekannten Mrs. W. Cutbush. Die Blüten stehen in riesigen Dolden frei über dem glänzendgrünen Laube, sind geranienrotu.verblassen nicht im Verblühen. Vorz. Gruppensorte. Vorgenannte 3 Sorten: 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-.

König Eduard VII. Der Bau, das Laub und die Blühwilligkeit sind die gleichen wie bei Mme. Norb. Levayasseur. Die Farbe der Blumen ist ein wunderbares zartes Pfirsichrosa. Die Blumen, namentlich von getriebenen Pilanzen, sind dicht gefüllt, wie die Blüten der Prunus triloba.

1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Aeltere Polyantha-Rosen.

Mad. Norbert Levavasseur Blüht in niederen Büschen ununter-brochen von Juni bis Herbst in leuchtendroter Farbe.

Maman Levavasseur. An den niederen, gedrungenen Pflanzen erscheinen die leuchtend rosaroten Blüten, ununterbrochen von Juni bis Herbst in reicher Fülle. Mrs. Wm. H. Cutbush. Ein Sport von Mad. Levavasseur mit

hellrosafarbenen Rispen.

Obige Sorten kosten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Alphabetisches Register der im Katalog enthaltenen Gattungsnamen.

			S-it- 1	Seite
Seite	Seite	Seite	Seite	
Abies 112, 113	Canna 10, 64, 65	Fraxinus 94, 95, 96, 97, 104	Maulbeere s. Morus.	Saponaria 53
Ables 112, 113	Caprifolium 79	Fuchsia 29	Megasea 39	Saxifraga 8, 54
Acanthus 13			Mehlbeere 94, 107	Scabiosa 53
Acer 94, 95, 96, 97, 101	Caragana 96, 97, 102, 111	Funkia 28		Schaupflanzen 93
Achillea 13	Carlina 19	Gaillardia 29	Melica 59	Schlingpflanzen . 76 – 80
Aconitum 13	Carpinus 102, 111	Califful and .	Mertensia 39	
Acorus 63	Caryopteris 102		Mimulus 39, 63	Schlingrosen 120, 121
Acorus		Gentiana 30	Mirabellensorten 88	Schmuck - Halbhoch-
Adiantum 60	Catalpa 96, 102	Geranium 30	Mispeln 90	stämmchen . 97, 98
Adonis 3	Ceanothus 102	Geum 30	Mispelli	Schneeball 98, 109
Aepfelsorten 85, 86	Cedrus		Monarda 39	
Aesculus 95, 96	Centaurea 20		Morus 94, 100, 105	Scolopendrium . 60, 61
Acsculus	Cephalaria 20	Gladiolen 70	Myosotis 63	Sedum 53
Agapanthus 13		Glyceria 59, 63		Seerosen 62, 63
Ahorn 94, 95, 96, 97, 101	Cephalotaxus 113	Glycinen 80	Nelken 4, 25, 26	Sempervivum 55
Ailanthus 95, 96	Cercis 102	Gunnera 30, 63	Nuphar 63	Senecio 55
Akazien 95, 96, 98	Chamaecyparis 113, 114	Gynerium 58	Nymphaea 62, 63	
Akebia 80	Chelone 20		O bstbäume 83—90	Sidalcea 55, 63
Allega	Chor-Nelken . 4, 25, 26	Gypsophila 30		Silene 55
Alleebäume 96		Halimodendron97,104,111	Oenothera 39	Soldanella 55
Alnus 101	Chrysanthemum 21, 22, 63		Omphalodes 39	Solidago 55, 63
Althaea 13	Cimicifuga 23	Harpalium 31	Onoclea 60	
Alyssum 13	Cirsium 27	Haselnüsse 92	Onopordon : . 27	Sonnenblumen-Arten 31
Amorpha 101	Clematis . 10, 23, 76, 77	Hedera 79		Sorbus . 94, 96, 107, 111
Amorpha		Hedysarum 104	Opuntien 39	Spiraea 55, 63, 100, 107, 111
Ampelopsis 78	Clerodendron 102		Orobus 39	Stachelbeeren 92
Amygdalus 97, 101	Colutea 102, 111	Heidekräuter 59	Osmunda 60	Staphylea 109, 111
Anchusa · 3, 15	Coniferen 112—118	Helenium 30	Paeonia 7, 8, 40—44	
Androsace 15	Coreopsis 23	Helianthemum 30		Statice
	Cornus . 97, 102, 111	Helianthus 31	Papaver 45, 46	Stauden - Zusammen-
Anemone 10, 14, 15		Heliopsis 30	Pappeln 96, 106	stellungen u. Blüten-
Anthemis 15	Corylus 94, 97, 102, 111	Hellohoma	Paulownia 105	Kalender 11, 12, 71-75
Antennaria 15	Cotoneaster 103, 111	Helleborus 30	Pavia 105	Struthiopteris 60
Anthericum 15	Crambe 23	Hemerocallis 31	l and the second	
Aprikosen 89	Crataegus 96, 97, 102, 111	Hepatica 32	Periploca 80	Stenanthium 55
	Cyclamen 23	Heracleum 32	Pflaumensorten 88	Stephanandra 107
Aquilegia 15	Cyclamen 20	Hesperis 32	Pfirsichsorten 89	Symphoricarpus 109, 111
Arabis 16	Cydonia 102, 111		Pfingstrosens. Paeonia	Syringa 94, 98, 108
Aralia 16, 63	Cyperus 58, 63	Heuchera 8, 31	Phalaris 59	
Arenaria 16	Cypripedium 23	Hibiscus 63, 97, 104		T amarix 109
Aristolochia 80	Cyrtomium 60	Hieracium 32	Philadelphus 100, 105, 111	Taxus 116, 117
		Himbeeren 91	Phlox 9, 46—48	Telekia 55
Armeria 16	Cystopteris 60	Hamilion 22	Physalis 49	Thalictrum 8, 55, 63
Artemisia 16	Cytisus 102	Horminum 32	Physostegia 49	Thuya 117, 118
Arundo 58, 63	D aboecia 59	Houstonia 32		
Asclepias 16	Dahlien 66—70	Hydrangea . 97, 99, 104	Picea 115, 116	Thuyopsis 118
Aspidium 60, 61	Delphinium . 4, 23, 24	Hypericum 32	Pinus 116	Thymus 55
Asperula 16		Japanische Weinbeere 90	Pirus 97, 106, 111,	Tilia . 94, 95, 96, 109
	Desmodium 104		Platanus 95	Tradescantia 55
Asphodelus 16	Deutzia 100, 103, 104, 111	Jasmin 105	Plumbago 49	Trauerbäume 95
Asplenium 60	Dianthus 4, 25, 26	Iberis 32	Polemonium 49	Trillium 55
Astern . 3, 16, 17, 18	Dictamnus 27	Imperata 59	Polygonum . 49, 63, 80	Tritoma 55, 63
Astilbe 3, 19, 63	Dielytra 27	Incarvillea 32	Polypodium 60, 61	Tropaeolum 57
Astrantia 19	Digitalis 27	Inula 32	Populus 96, 106	
Athyrium 60, 61	Dimorphanthus 104	Johannisbeeren 92		Trollius 8, 56, 63
Aubrietia 19		Iris 5, 6, 33—37, 63	Potentilla 49, 106	Tsuga
	Diplostephium 27	1115	Primula 8, 49, 50, 63	Typha 63
Aucuba 101	Doronicum 27	Juneus 63	Prunus 96, 98, 100, 106,111	Ulmus 94, 95, 96, 98, 109
Azalea 101	Echinops 27	Juniperus 115	Ptelea 106	Veratrum 57
B ambusa 58	Edeldisteln 27	Kerria 104	Pteris 60	
		Kirschensorten 90		Verbascum 57
Begonia 70	Edelreiser 92		Pulmonaria 49	Veronica 57
Bellis 19	Efeu 79	Koelreuteria 104	Pyrethrum 9, 51, 52	Viburnum 98, 100, 109, 111
Berberis 101, 111	Elaeagnus 104, 111	Koniferen 112—118	Q uitten 90	Villarsia 63
Betonica 19	Epilobium 27	Kugeldisteln 27		Vinca 57
Betula . 94, 95, 96, 101	Epimedium 27	Laburnum 96, 104	Ranunculus 52, 63	Viola 57
Dimenia . 94, 95, 90, 101	1 22		Reineclauden 88	
Bignonia 80	Eremurus 28	Larix	Rhabarber 52	Vitis 78
Birken . 94, 95, 96, 101	Erica 59	Lathyrus 32		Vogelschutzgehölze 111
Birnensorten 87, 88	Erigeron 28	Leontopodium 32	Rhamnus 106, 111	Wahlenbergia 57
Blechnum 60, 61	Erlen 101	Liatris 32	Rheum 52	Walnüsse 90
Bocconia 19	Eryngium 27		Rhododendron 106	Wasserpflanzen . 62, 63
Drambearan 01	1 5 6	Libocedrus 115	Rhodotypus 106, 111	
Brombeeren 91	Erysimum 27	Ligularia . 32, 63, 111	Rhus 100, 106, 111	Weigelia 100, 110
Brousscnetia 101	Eschen 94, 95, 96, 97, 104	Ligustrum 97, 104	D't 106, 111	Weissdorn . 96, 97, 102
Buchen 94, 95, 96	Eulalia 58	Lilium 38	Ribes 106, 111	Wellingtonia 118
Buddleia 99	Eupatorium 28, 63	Linaria 32	Robinia 95, 96, 98	Xanthoceras 110
Butomus 63	Euphorbia 28	Linden 94, 95, 96	Rosen 119, 120, 121	V11000
Buxus 97, 113	Evonymus 104, 111	Linum 32	Rosskastanien . 95, 96	Tiorinfol 106
	l Hyochorda 104	Lininday June 04 104	Rotdorn 96, 97, 102	Micrapier 100
C acteen 39		1 1 -0 00 108 111	Rubus . 100, 107, 111	2101 Daumic 90, 90
Calamintha 19	Fagus 94, 95, 96, 97	Lonicera 79, 99, 105, 111	Rudbeckia 53	Ziergehölze 99—111
Calla 63	Farne 60, 61	Lupinus	Rüster s. Ulme	Ziergraser 58, 59
Callung	Feder-Nelken 26	1 1	Ruster 3. Office	Zierkirschen 98
Calluna 59			S agina 53	
Calophaca 97	Festuca 59		Sagittaria 63	
Caltha 19, 63	Feuerdorn 103			
Calycanthus 102	Flieder 94, 98, 108	Malva 39	Salix 96, 107	
Campanula . 4, 20, 21	Forsythia 94, 97, 104, 111	Marrubium 39	Sambucus 107, 111	Zwetschensorten 88
•				

